


1974

Staudengärtnerei
Gräfin von Zeppelin
Laufen in Baden



STAUDENGÄRTNEREI *Gräfin von Zeppelin*

IN HABERIN FRAU HELENE VON STEIN-ZEPPELIN

D 7841 LAUFEN/BADEN

Post Müllheim - Bahnstation Staufen/Breisgau

Telefon Sulzburg (oder Heitersheim) (07634) 716

Drahtanschrift: Zepelin Laufenbaden

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Freiburg i. Br. Nr. 05/33836

Sparkasse Markgräflerland Müllheim (Baden) Nr. 494

Raiffeisenbank Ehebachtal Laufen Nr. 4022718

Postscheckkonto: Karlsruhe Nr. 38470



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden“. Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.

Der Katalog 1974 ist aus Ersparnisgründen ein Kompromiß, bei dem nur ein Teil der Stauden sowie das Hemerocallis- und Iris-Sortiment neu überarbeitet ist. Darum ist das Staudensortiment in zwei Teilen. In der Preisliste ist aber alles in einem Alphabet zusammengefaßt.

Die Preisgestaltung hat uns ziemliches Kopfzerbrechen gemacht. Nachdem Löhne und alle Nebenkosten steigen, mußten wir auch verschiedene Preise anheben. Auf der anderen Seite sind die Preise der neuen Hemerocallis und Iris meistens erheblich gesenkt.

Ein weiteres Problem sind die steigenden Kosten von Post und Bahn, die oft in keinem Verhältnis zu den Pflanzen stehen. Wir werden bei allen Sendungen sehr sorgfältig prüfen, was die billigste Versandart ist und größere Sendungen möglichst per Fracht aufgeben. Bei fortgeschrittener Jahreszeit oder heißem Wetter wird man trotzdem manches per Expreß schicken müssen. Bitte geben Sie immer an, ob Sie Selbstabholer bei der Bahn sind, da damit die hohen Zustellgebühren gespart werden.

Wir bitten bei Interesse einen neuen Katalog anzufordern, da wir aus Kostengründen nicht an alle unsere Kunden laufend den Katalog verschicken, da manchmal gar kein Bedarf mehr besteht.

So sind es kleine und große Probleme, die immer wieder gelöst werden müssen. Aber wir finden nach wie vor, daß das Gärtnern der schönste Beruf ist und wir haben selbst soviel Freude an unserer Arbeit, daß wir hoffen alle Schwierigkeiten zu überwinden. Es ist eine große Befriedigung für uns, zu wissen, daß unsere Pflanzen in anderen Gärten auch Freude bringen und gerade das Gebiet der Stauden ist so reich und groß, daß seine Fülle nie erschöpft sein wird. Jedes Jahr begeistern uns wieder Neuheiten und so versuchen wir auch Sie, an dieser Schönheit teilhaben zu lassen.

Wir wünschen Ihnen viele echte Gartenfreuden!

L. v. Koenig - J. v. Koenig

Acaena, Stachelnüsschen, ROSACEAE, 5—10 cm, VI—VII,

○—●, ☞.

Hell-bräunlichgrüne Polster, die eng an den Boden geschmiegt, auch noch trockene Plätze überwachsen. Aus unscheinbaren Blüten erwachsen jene Nüsschen, die der Pflanze ihr besonderes Aussehen und ihren Namen geben.

- △ **buchananii**, kleine, graugrüne, rosenartige B, mäßig wuchernd.
- △ **glaucophylla**, in den Wuchereigenschaften zwischen *buchananii* und *microphylla* mit hübschen, blaugrünen B.
- △ **microphylla**, wie vorige, B aber braungrün, schneller und stärker wachsend.

Acanthus, Bärenklau, ACANTHACEAE, 100 cm, VI—VIII,

○, ☞.

longifolius, dekorative Pflanze aus dem östl. Mittelmeergebiet, deren B das Vorbild für die Kapitelle der griechischen Säulen lieferten. Weißlich-rosa Bl in Ähren.

spinus, 50 cm, tief eingeschnittene, dornig gezähnte dunkelgrüne B, weißliche Bl an 70 cm hohen Stielen. Sehr dekorativ.

Achillea, Schafgarbe, COMPOSITAE, ○.

Neuere Züchtungen ließen *Achillea* bereits zum Dauerblüher werden. Daneben machen Anspruchslosigkeit, Gesundheit und Lebensdauer sie zum erfreulichsten Gartengut.

- △ **ageratifolia var serbica**, 20 cm, V—VII, ○, ☞. Silbergrünes Laub, weiße Bl.
- △ **conjuncta**, 20 cm, VI, ☞. Kleine, silbergraue B und ziemlich große, weiße Bl.

filipendulina 'Coronation Gold', 80 cm, VI—IX, ✕. Wertvoller Dauerblüher, liches Gelb über grau-silbernem Laub.

— **'Parkers Varietät'**, 120 cm, VII—X, ✕. Unverwüstliche Sorte, große, gelbe Bl-Teller, zum trocknen geeignet. N: *Eryngium*, *Nepeta*, *Helenium*, *Delphinium*.

Hybride 'Moonshine', 60 cm, VI—IX, ✕. Auf verzweigten Stielen schwefelgelbe Dolden mit besonders großen Einzelblüten. Schönes Silberlaub.

millefolium 'Cerise Queen', 50 cm, VI—VII, ✕. Kirschrot blühende Sorte unserer heimischen Schafgarbe.

- △ **petraea**, 20 cm, IV, ☞. Polsterbildende Silbergarbe mit graugrünen B und weißen Bl in Dolden.

ptarmica 'The Pearl', 70 cm, VI—VIII, ☼. Dichtgefüllte, weiße Bl in Dolden auf straffen Stielen, stark wachsend.

taygetea, 40 cm, VI—IX, graulaubig mit schwefelgelben Bl.

Aconitum, Eisenhut, RANUNCULACEAE, ○—●, ☼.

Wenn er nicht unter Wurzeldruck steht, wird der Eisenhut auch im dichtesten Schatten nicht versagen. Er bildet dort starke Horste, deren Blühwilligkeit auch nach Jahren nicht nachläßt.

lycoctonum var. pyrenaicum, 100 cm, VI—VII. Die hellgelben Blüten haben einen eigenen Reiz. Hübsch für Wildpflanzungen.

napellus, 120 cm, VII—VIII, verlässlichste Art, in tiefem, stumpfem Blau.

N: Juli- und Augustsilberkerzen, Japananemone, grösere Schattengräser.

— **'Bicolor'** 120 cm, VII—VIII, blau mit weiß.

— **'Bressingham Spire'**, 100 cm, VII—VIII, violettblaue, gedungen wachsende, englische Züchtung.

— **'Sparks Varietät'** 150 cm, VII—VIII, lockere, tiefviolette Bl-Rispen.

wilsonii, 150 cm, VIII—X, lichtblaue Blütenstände und die spätere Blütezeit machen die Art besonders wertvoll.

Aethionema, Steintäschel, CRUCIFERAE, 20 cm, IV—VI, ○, ☼.

△T **grandiflora 'Warley Rose'**, kleines Halbsträuchlein mit nadelartigen, blaugrünen B und leuchtendrosa Bl. Verlangt sandigen, durchlässigen Boden.

Agapanthus, Schmucklilie, LILIACEAE, 80 cm, VII—IX,

○, ☼, ☼.

'Headbourne Hybride'.

Diese Art der bekannten Kübelpflanze ist an geschützten Stellen weitgehend winterhart, d. h. sie zieht das Laub vollkommen ein, und muß im Herbst mit Laub und Reisig gedeckt werden. Die schönen blauen Bl-Dolden sind eine große Bereicherung für das Staudenbeet, wo um diese Jahreszeit wenig blau zu finden ist. Nur Frühjahrs-pflanzung.

Ajuga, Günsel, LABIATAE, 15 cm, IV—VI, ○—●, ☼.

In lichten Schattenlagen als rasch schließende Boden-decke nicht zu entbehren, soll jedoch von Anbeginn mit seinen Begleitpflanzen, den Waldschattengräsern, Vinca, Lamium, Tiarella u. a. durchpflanzt werden.

△ **reptans 'Atropurpurea'**. Rotlaubig, blaue Blütenkerzen.

Alchemilla, Frauenmantel, ROSACEAE, VI, ●—●, ☼.

△ **erythropoda**, eine kleine Form des Frauenmantels, wird nur 10 cm hoch, daher interessanter Bodenbedecker.

mollis, 30—50 cm. Noch viel zu wenig verwendeter, nie versagender Bodenbegrüner für Schatten und Halbschatten. Grüngelbe Blütenschleier, die auch sehr hübsch in Sträußen sind.

N: Farne und Schattengräser.

Althaea, Stockrose, MALVACEAE, VII—IX, ○.

Alle Stockrosen sind zweijährig-staudig, wünschen einen nährhaften Boden. Verwendung in ländlichen Gärten und an Mauern und Zäunen.

rosea 'Pleniflora', 180—200 cm. Gefüllte Spielarten. Farbenmischung.

Sortiert in den Farben Gelb, Rosa, Rot oder Weiß.

Alyssum, Steinkraut, CRUCIFERAE, ○, ☞.

Das in Überfülle erblühende Gelb ist im April und Mai gartenbeherrschend. Trockensonniger Standort und durchlässiger Boden sind Voraussetzung für Dauerwachstum.

N: Blaukissen, Schleifenblume, Teppichphlox, Gänsekresse, rote Tulpen.

- △ **montanum 'Berggold'**, 15 cm, V—VI, Bergsteinkraut mit niederliegenden Stengeln und gelben Bl.
- △ **murale (argenteum)**, 30—40 cm, VI—VII, Sommersteinrich. Große Dolden über kleinen, graugrünen B.
N: Santolina, Scutellaria baicalensis.
- △ **saxatile 'Citrinum'**, 30 cm, IV—V. Hellzitronengelbes Felsensteinkraut.
- △ — **'Compactum'**, 25 cm, IV—V. Etwas niedriger und goldgelb.
- △ — **'Plenum'**, 25 cm, V—VI. Dichtgefüllte, goldgelbe Bl.

Anaphalis, Staudenimortelle, COMPOSITAE, VII—IX, ○, ✕, ☞.

margaritacea, 50 cm. Stark kriechende Art für größere Flächen. Graufilzige B und weiße, kleine Strohlumen, welche sehr lange schön sind und sich auch zum Trocknen eignen. Ist noch mit den ärmsten Böden zufrieden.
N: Liatris, Salven, Inula, Festuca, Eryngium.

- △ **triplinervis**, 25 cm. Kleinere und nicht wuchernde Art.

Anchusa, Ochsenzunge, BORAGINACEAE, V—VII, ○, ✕.

Kräftig wachsende, blaublühende Pflanzen, mit rauhhaarigen B. Liebt tiefgründigen Boden. Nicht überall winterhart aber unersetzlich durch die einzigartige Farbe.

italica 'Loddon Royalist', 100 cm. Großblumig, leuchtend blau.

- **'Royal Blue'**, 80 cm, großblumig, enzianblau, durch kompakten Wuchs wertvoll.

Androsace, Mannsschild, PRIMULACEAE, ○—●, ☞.

Aus kleinen Blattrosetten erheben sich Blütenstände „klein wie Puppenphlox“ (Foerster). Erst recht schön, wenn es teppichspinnend aus Mauerfugen heraus wachsen darf.

- △ **sarmentosa**, 15 cm, V—VI. Wollseidige Blattrosetten und rosa Blütendolden.
- **chumbyi**, 15 cm, V—VI. Die Dolden sind etwas kleiner und kräftiger in der Farbe als bei den Arten, rosarot.
- △T **sempervivoides**, 5 cm, V. Zwergmannsschild vom Himalaja. „Ein Puppenzwerg vom größten Gebirge der Welt“ (Foerster).

Anemone, Anemone, RANUNCULACEAE.

Die Anemonen sind sehr vielgestaltig und die Kulturansprüche dementsprechend unterschiedlich.

Die **Waldanemonen** wollen lockeren Humusboden und Laubgehölzschatten, die **Gebirgsanemonen** lieben Sonne, die **Herbstanemonen** einen geschützten, nicht zu naßkalten Boden in Sonne und Halbschatten.

Waldanemonen: ●, ☞.

hepatica, siehe **Hepatica nobilis**.

sylvestris, 30 cm, V—VI. Frühlingswaldanemone mit weissen Blütenschalen. Liebt kalkhaltigen Boden.

Gebirgsanemonen: ○, ☞.

△ **pulsatilla**, 25 cm, III—V. Bekannte violette Küchenschelle. Die Fruchstängel bilden auch eine Zierde (Teufelsbart).

△ — **'Weißer Schwan'**, weiße Pelzanemone.

Herbstanemonen: VIII—X, ●, ✕, ☞.

hupehensis 'Septembercharm', 60 cm. Rosa Bl von besonderem Zauber.

japonica 'Honorine Jobert', 80 cm. Reinweiße, einfache Schalenbl.

— **'Königin Charlotte'**, 100 cm. Seidenrosa, große Bl. Schönste und empfindlichste Sorte.

— **'Rotkäppchen'**, 60 cm. Rosarot, halbgefüllt.

vitifolia 'Robustissima', 100 cm. Wüchsige, rosa Sorte.

Antennaria, Katzenpfötchen, COMPOSITAE, 15 cm, V—VI, ○, ☞.

Ein silbergrauer Teppich, der es selbst auf mageren Böden noch an den sonnigsten Stellen aushält. Darüber schieben sich im Mai die strohblumenähnlichen Blütenbüschel.

△ **dioica 'Rubra'**, feines, silberweißes Laub, rote Blüten.

Anthemis, Kamille, COMPOSITAE, ○, ☞.

biebersteiniana, 25 cm, V—VI. Um von Dauer zu sein, braucht die Bergkamille einen vor stauender Nässe geschützten Standort. Über feinem Silberfiligran leuchten während des Sommers goldene Korbblüten.

N: Veronica, Sedum 'Purpurteppich', Sempervivum.

tinctoria 'Grallagh Gold', 60 cm, VI—VII ✕. Ein unerschöpflicher Lieferant goldgelber Margaritenblumen,

die auch gut zum Schnitt sind. Im August stark zurückschneiden, damit er mit frischen Bodentrieben in den Winter geht.

Antirrhinum, Löwenmaul, SCROPHULARIACEAE, 15 cm, V—X, ○, ☞.

△ **asarina**, Löwenmaul mit langen, kriechenden Trieben, gegenständigen B und hellgelben Bl, deren Lippen dunkler und die Fahne rosa gestrichelt ist.

△T **glutinosum**. Dieses kleine Pyrenäenlöwenmaul hat graue B und weißgelbe Bl. Für warme, geschützte Plätze. Dort den ganzen Sommer blühend.

Aquilegia, Akelei, RANUNCULACEAE, ○—●, ✕.

Vorzüglich zur Verwendung im lichten Schatten geeignet, besonders die reinen Arten. Die schönfarbigen Hybriden lassen sich aber auch in voller Sonne pflanzen.

alpina 'Superba', 70 cm, V—VI. Blaue, lichten Schatten bevorzugende Alpenakelei.

caerulea 'Crimson Star', 60 cm, VI—VII, Rot mit weißer Glocke.

— **'Dragon Fly'**, 40 cm, VI—VII. Reiches Farbenspiel dieser ausgesprochen niedrigen Akelei.

— **'Helenae'**, 50 cm, VI—VII, blau mit weiß.

— **'Mc Kana Hybrids'**, 60 cm, VI—VII. Sehr großblumig, langspornig in vielen Farben.

Arabis, Gänsekresse, CRUCIFERAE, IV—V, ○, ☞.

Eine für den Frühlingsgarten wichtige Gattung, deren frühes, unermüdliches Blühen ebenso gefällt wie die

Anspruchslosigkeit und Lebensdauer. Für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.
N: Alyssum, Aubrieta, Teppichphlox, Zwergiris und Hornveilchen.

- △ **x arendsii 'Rosabella'**, 20 cm, rosa.
- △ **caucasica 'Plena'**, 20 cm, %. Weiß gefüllt, lange blühend.
- △ — **'Schneehaube'**, 15 cm, bildet gedrungene Polster mit einfachen weißen Bl.
- △ **procurrens**, 10 cm, II—IV. Zur Unterpflanzung, bis in den Halbschatten hinein, ganz vorzüglich. Die dunkelgrünen Ausläufer bilden einen dichten Rasen, über dem wie Schaumwolken die weißen Bl stehen.

Aralia, Aralie, ARALIACEAE, 150 cm, VII—VIII, ●.

racemosa, weiße Traubenblüten, schwarzpurpur Beeren. Dekorative Solitärpflanze.

Armeria, Grasnelke, PLUMBAGINACEAE, V—VII, ○, ☐.

Das grasartige, immergrüne Polster gab der Gattung ihren deutschen Namen. Es sind anspruchslose Pflänzchen, deren straffgestielte Bl in wahrer Fülle jedes Polster überziehen.

- △T **caespitosa**, 5 cm, V, rosa Blütenköpfe dicht über dem festen Polster, reizende Steingartenpflanze, die sandigen, durchlässigen Boden verlangt und vor Winternässe geschützt werden sollte.
- △ **maritima 'Alba'**, 20 cm, weiß, besonders hübsch mit blauen Alpenastern.
- △ — **'Düsseldorfer Stolz'**, 15 cm, tiefkarminrote Neuheit von großer Leuchtkraft.
- △ — **'Splendens Perfecta'**, 20 cm, rot.

Artemisia, Edelraute, COMPOSITAE, ○, ☐.

Eine Gattung, die an trockenen, heißen Stellen ausgezeichnete Dienste tut. Sie stellt an den Boden keinen anderen Anspruch, als den der Durchlässigkeit, da sie gegen Winterfeuchte empfindlich ist.

- △ **schmidtii 'Nana'**, 25 cm, feinlaubig, breitwachsende Silberdecke, Blüten unscheinbar.
- △ **stelleriana**, 30 cm, weißfilzige Edelraute.

Arum, Aronstab, ARACEAE, 50 cm, V, ●—●, ☐.

italicum, callalähnliche Bl im Frühjahr und pfeilartige, große B mit schöner heller Aderung. Winterschutz. Sehr interessante Pflanze für etwas feuchte, schattige Stellen. Leuchtend rote Fruchtstände.

Aruncus, Geissbart, ROSACEAE, VI—VII, ●—●, %.

Diese auch in unseren Gegenden heimische Pflanze, liebt schattige Plätze. Die unzähligen, kleinen weißen Bl sind zu großen Rispen vereinigt.

N: Waldgräser, Fingerhut, Hosta, Waldglockenblumen.

sylvester, bis 200 cm.

- **var. sinensis 'Zweiweltenkind'**, 170 cm, eine Kreuzung von sylvester und sinensis, die in Bornim entstand, mit braunem Laubaustrieb und späterer Blütezeit.

Asarum, Haselwurz, ARISTOLOCHIACEAE, 10 cm, ●—●, ☐.

- △ **europaeum**, wertvoller Bodenbedecker mit nierenförmigen, lederartigen B. Auch für tiefen Schatten unter Laubbäumen. Bl unscheinbar.

Asclepias, Seidenpflanze, ASCLEPIADACEAE, VII—IX, 50 cm, ○, %.

tuberosa, durch die auffallenden, orangefarbenen Bl-Dol-
den eine aparte Schnittblume. Die silbrigen Fäden
haben den Namen gegeben.

Asparagus, Zierspargel, LILIACEAE, 60—80 cm, ○, ✕, ▢.

verticillatus, das feine Laub ist im Gartenzierend und als
Schnittgrün brauchbar, goldene Herbstfärbung.

Asphodeline, Junkerlilie, LILIACEAE, V—VI, ○.

Diese aus dem Mittelmeergebiet stammenden Pflan-
zen verlangen sonnige, durchlässige, aber nährhafte
Böden.

N: Avena, Festuca, Kentranthus, Nepeta, Linum, La-
vendel.

liburnica, 60 cm, dreikantige, lauchige B bilden eine Ro-
sette, aus der sich ein verzweigter Blütenstand mit
gelben Bl erhebt.

lutea, 100 cm, Blütenstand unverzweigt, dichte Trauben
bildend, gelb.

Aster, Aster, COMPOSITAE.

Um der Reichhaltigkeit und Formfülle dieser Gattung
überhaupt Herr zu werden, unterteilen wir sie in Früh-
lings-, Sommer- und Herbstastern. Es braucht im Übri-
gen kaum besonderer Begeisterungsfähigkeit, um
Aster als eine Gartennotwendigkeit anzuerkennen.

Frühjahrsastern, V—VI, ○, ✕, ▢.

△ **alpinus**, 20 cm. Alpenaster, blüht zur Zeit des großen
Steingartenflors, blau.

△ — **'Albus'**, 20 cm, weiß.

tongolensis 'Leuchtenburg', 40 cm, amethystviolett mit
orangefarbenem Kopf. Schöne **Neuheit**.

yunnanensis 'Elfriede', 40 cm, wüchsige Verbesserung,
Neuheit!

— **'Napsbury'**, 50 cm, heliotropfarbene Bl mit goldgelber
Mitte.

Sommerastern, VII—IX, ○, ✕.

Die Bergaster liebt sonnige, warme Gartenplätze. Es
gibt verschiedene Farbtöne, Blütezeiten und Wuchs-
höhen. Frühjahrspflanzung ist vorzuziehen.

N: Sorten untereinander mischen, Avena, Pennisetum,
Coreopsis, Phlox, Heliopsis.

amellus 'Blütendecke', 50 cm, silberblau.

— **'Hermann Löns'**, 60 cm. Wohl die großblumigste der
Bergastern, lavendelblau.

— **'Kobold'**, 40 cm, violettblau.

— **'Kugelwolke'**, 60 cm, violett.

— **'Lady Hindlip'**, 60 cm. Rosa Sorte mit großen Einzel-
blüten.

— **'Sternkugel'**, 50 cm. Standfeste, wüchsige Sorte von
unübertroffener Blühwilligkeit. Feinstrahlig lavendel.

— **'Stettin'**, 60 cm, frühblühende, lila Sorte.

— **'Veilchenkönigin'**, 40 cm, spät und lang blühend in
leuchtendem Dunkelviolett.

frikartii 'Wunder von Stäfa', 80 cm, VIII—IX, große hell-
blaue Bl.

Herbastern, IX—XI, ○,

f = früh-, m = mittel-, s = spätblühend.

cordifolius 'Ideal', 120 cm, ✕. Lavendelblaue Schleieraster
in großen Rispen, s.

dumosus. Kissenastern gibt es in vielen Sorten, in ver-
schiedenen Höhen und Blütezeiten. Sie sind geeignet
für Steingärten, Rabatten und als Einfassung.

- △ — **'Dandy'**, 30 cm, purpurrot, sehr f.
- △ — **'Diana'**, 30 cm, rosa, m.
- **'Herbstgruß von Bresserhof'**, 50 cm, höhere leuchtend rosa Sorte, f.
- △T — **'Herbstpurzel'**, 15 cm, niedrigste in lavendelblau, m.
- △ — **'Kassel' (Waldenburg)**, 30 cm, dichte, kugelige Büsche mit halbgefüllten, roten Bl. bedeckt. **Neuheit!** m.
- △ — **'Lady in Blue'**, 35 cm, blau, halbgefüllt, f.
- △T — **'Nesthäkchen'**, 15 cm, karminrote, sehr niedrige Sorte, m.
- △ — **'Pacific Amarant'**, 30 cm, dunkles Violettblau, m.
- △ — **'Professor Kippenberg'**, 40 cm, leuchtend dunkelblau, starkwachsend, m.
- △ — **'Rosemarie Sallmann'**, 40 cm, kräftig karminrosa, m-s.
- △ — **'Schneekissen'**, 30 cm, weiß, m—s.
- △ — **'Silberblaukissen'**, 30 cm, hellblau, halbgef., m.
- △ — **'Wachsenburg'**, 50 cm, etwas höher werdende Kissenaster von geschlossenem Wuchs und schöner rosa Farbe. **Neuheit!** s

ericoides, Erikaaster, X—XI, X. Die feinblättrigen Stengel tragen viele kleine Bl. Unentbehrlich f. Herbststräube.

- **'Alsterlust'**, 60 cm, rosa.
- **'Erlkönig'**, 120 cm, lila Blüten.
- **'Schneetanne'**, 120 cm, weiß.

novae-angliae, Rauhblattaster, IX—X. Standfest anspruchslos, nichtwuchernd und nicht mehltauanfällig. Die neuen Sorten bringen rosa und rote auffallende Farbtöne in das Asternsortiment, die es bisher nicht gab.

- — **'Alma Pötschke'**, 80 cm, sehr auffallende leuchtend rosarote **Neuheit**, f.

- — **'Andenken an Paul Gerber'**, 140 cm, karminrot, m.
- — **'Barr's Blue'**, 150 cm, dunkelblau, s.
- — **'Harrington Pink'**, 150 cm, schön. lachsrosa, f-m.
- — **'Rosa Sieger'**, 130 cm, lachsrosa, großblumige **Neuheit**, m.
- — **'Rubinschatz'**, 150 cm, rubinrot, m.
- — **'Rudelsburg'**, 120 cm, eine auffallende Steigerung der Sorte 'Harrington Pink'. Sehr leuchtende **Neuheit!** m.
- — **'W. Bowman'**, 150 cm, violett, s.

novi-belgii, Glattblattaster, VIII—IX. Sie spielen eine große Rolle im herbstlichen Garten! Sie brauchen recht nahrhaften Gartenboden und sollten möglichst jedes zweite Frühjahr umgepflanzt werden.

- — **'Blandie'**, 120 cm, elfenbeinweiß, halbgefüllt, m.
- — **'Blaue Nachhut'**, 120 cm, spätblühende, hellblaue Sorte, s.
- — **'Crimson Brocade'**, 80 cm, rot halbgefüllt, m.
- — **'Dauerblau'**, 120 cm, lang blühende Sorte in schönem Blau, s.
- — **'Erica'**, 80 cm, purpur, sehr leuchtend, f.
- — **'Eventide'**, 120 cm, dunkelviolett gefüllt, großblumig, m.
- — **'Fellowship'**, 80 cm, reines, überzeugendes Rosa, gut gefüllt, m.
- — **'Lassie'**, 100 cm, zartrosa, m.
- — **'Marie Ballard'**, 90 cm, großblumig, hellblau, gefüllt, m.
- — **'Oktoberdawn'**, 110 cm, schönes Mittelblau, s.
- — **'Patricia Ballard'**, 120 cm, gefüllte orchideenrosa Bl, s.

- — **'Rosenhügel'**, 130 cm, hübsches Rosa, m.
- — **'Royal Blue'**, 100 cm, mittelblau, f—m.
- — **'Schöne von Dietlikon'**, 100 cm, dunkelblau m. großer gelber Mitte, m-s.
- — **'Twinkle'**, 90 cm, cyclamenrot, f—m.

Astilbe, Prachtspiere, SAXIFRAGACEAE, ♂—●, ✕.

An Schattenplätzen übertrifft keine andere Staude an Leuchtkraft und Farbigkeit die fedrigen Blütenrispen der Astilben. Bei genügend hoher Luftfeuchtigkeit und bindigem Boden gedeihen Astilben jedoch durchaus auch in voller Sonne.

f = früh-, m = mittel-, s = spätblühend.

N: Hosta, Schattengräser, Silberkerzen, Aconitum, Bergenia, Farne.

- x **arendsii 'Brautschleier'**, 70 cm, weiß, überhängend, f.
- **'Cattleya'**, 100 cm, cattleyenrosa, auf kräftigen Stielen, s.
- **'Feuer'**, 80 cm, lachsrot, s.
- **'Finale'**, 60 cm, hellrosa, s.
- **'Glut'**, 80 cm, leuchtend rot, mit dunklem Laub, s.
- **'Hyazinth'**, 100 cm, lilarosa, m.
- △ — **'Serenade'**, 40 cm, rosarot, besonders späte Gruppensorte.
- **'Spinell'**, 80 cm, lockere, himbeerrote Blütenrispen, f.
- △ **chinensis var. pumila**, 20 cm. Zwergastilbe, welche ausnahmsweise auch Sonne und Trockenheit verträgt. Durch ihren kriechenden Wuchs bildet sie Teppiche mit lila Blütenrispen. s
- japonica-Hybride**, frühblühende Sorten, die sich auch gut zum Treiben eignen.

- — **'Deutschland'**, 50 cm, schneeweiße Rispen auf kräftigen Stielen. f
- — **'Federsee'**, 60 cm, dunkelkarminrot. f
- — **'Koblenz'**, 50 cm, lachskarmin. f
- — **'Mainz'**, 50 cm, kräftig lilarosa. f

simplicifolia-Hybride

- — **'Aphrodite'**, 35 cm, sehr schönes, lachsiges Rot, was sich gut von dem dunklen Laub abhebt. **Neuheit!** s
- △ — — **'Atrorosea'**, 40 cm, graziös überhängende rosa Blütenrispen. m

thunbergii-Hybride

- — **'Straußenfeder'**, 100 cm, lachsrosa Bl in überhängenden Rispen. s

Aubrieta, Blaukissen, CRUCIFERAE, 10 cm, IV—V, ○, ♀.

Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten und auf keiner Trockenmauer fehlen.

- △ **Hybride 'Bressingham Pink'**, sehr großblumig, halbgefüllt, reines Rosa.
- △ — **'Carnival'**, dunkelviolet
- △ — **'Dr. Mules'**, violett
- △ — **'Feuervogel'**, magentarot
- △ — **'Hubert'**, dunkelveilchenblau, meist halbgefüllt. **Neuheit!**
- △ — **'Neuling'**, lavendelblau, sehr wüchsig
- △ — **'Rosenteppich'**, auffallendes Rosa über graugrünem Teppich
- **'Rotkäppchen'**, leuchtend rote Sorte.
- △ — **'Schloß Eckberg'**, leuchtend blauviolett

△ — '**Tauricola**', 5 cm, mittelblau, niedrigste und härteste Sorte. Eignet sich besonders auf Mauern.

Azorella, Rosettenpolster, UMBELLIFERAE, 5 cm, V—VI, ○, ☐.

△ **trifurcata**, stacheliges, dunkelgrünes Polster, grünlichgelbe Blüten.

Baptisia, Indigolupine, LEGUMINOSAE, 100 cm, VI—VIII, ○, ☐.

australis, hellblaue, lupinenartige Bl. Laub hält sich bis in den Herbst.

Bergenia, Bergenie, SAXIFRAGACEAE, ○—●.

Sie fallen auf durch ihre großen, lederartigen, immergrünen B. Sehr genügsame, robuste Pflanzen. Das ganze Jahr wirkungsvoll.

△ **cordifolia**, 40 cm, III, rosa blühend, mit den Jahren starke Horste bildend.

△ **Hybride 'Abendglut'**, 30 cm, III—IV, purpurrote Bl, B im Herbst braun verfärbend.

△ — '**Admiral**', 30 cm, IV—V, große, dunkelgrüne B, die sich im Winter rot färben, rote Bl an kräftigen Stielen. **Neuheit!**

△ — '**Glockenturm**', 30 cm, IV—V, große, rosarote Blütenstände machen diese **Neuheit** wertvoll.

△ — '**Morgenröte**', 40 cm, IV—V, aufrechte, breite, dunkelgrüne B mit leicht gewellten Rändern. Rosa Bl. Remontiert. Leuchtende Laubfarbe.

△ — '**Silberlicht**', 40 cm, III—IV, Bl weiß mit rosa Schein, stark wachsend.

△ **ligulata**, 30 cm, III—IV, große, sommergrüne B mit weißer Behaarung, die im Herbst erfrieren. Der Austrieb der B und zartrosa Bl erfolgt sehr zeitig im Frühjahr.

stracheyi, 50 cm, III—IV, eiförmige, lederige B und reichverzweigte Blütenstände mit nickenden, weißlich-rosa Bl.

Boltonia, Scheinaster, COMPOSITAE, 180 cm, IX—X, ○, ✕.

latisquama. Karl Foerster gab dieser Pflanze den Namen „Sternwolkenaster“ — einen treffenderen gibt es nicht. Unzählige, weiße Bl bilden wahre Wolken! Anspruchlos.

N: Herbststern, Helianthus salicifolius, Rudbeckia 'Herbstsonne'.

Brunnera, Kaukasusvergißmeinnicht, BORAGINACEAE, 30—50 cm, IV—V, ○—●, ☐

macrophylla. Schon im sehr zeitigen Frühjahr werden die herzförmigen, rauen Blätter von Sträuben strahlend blauer Vergißmeinnichtblüten überwachsen.

N: Dicentra, Doronicum, Euphorbia, Narzissen.

Buphtalmum, Ochsenauge, COMPOSITAE, 50 cm, IV—IX, ○, ✕.

salicifolium. Unglaublich reich- und die ganze zweite Sommerhälfte hindurch blühende Goldmargarite. Ohne alle Ansprüche.

Caltha, Sumpfdotterblume, RANUNCULACEAE, 30 cm, IV—VI, ○—●

palustris 'Multiplex' ('Flore-Pleno'). Die gefüllt-blühende Sorte braucht wie die Art sehr feuchten Standort. Die dottergelben Blüten halten sehr lange.

Campanula, Glockenblume, CAMPANULACEAE.

Glockenblumen sind sehr vielgestaltig. Es gibt Zwergformen und hohe Rabattenpflanzen. Das Blau reicht

vom hellsten Wasserblau bis Tiefviolett und es gibt reines Weiß. Auch die Form variiert von spitzen Glocken bis flachen Schalenblüten.

alliariaefolia, 70 cm, VI—VIII, milchweiße, nickende Glocken an langen Trieben.

carpatica, Karpatenglockenblume, 15—30 cm, VI—IX, ○, alle ☞. Buschiger Wuchs und große Glocken machen sie wertvoll für Steingärten, Trockenmauern und Vorpflanzung.

- △ — **'Blaue Clips'**, 20 cm, aus Samen gezogene Pflanzen, die aber sehr einheitlich ausfallen, hellblau
- △ — **'Chewton Joy'**, 20 cm, zartblaue Schalen
- △ — **'Delfter Blau'**, 20 cm, hellblaue Glocken, grau behaartes Laub
- △T — **'Hannah'**, 15 cm, reizende, weiße Glöckchen
- △ — **'Jewel'**, 20 cm, mittelblau
- △ — **'Karpatenkrone'**, 20 cm, silberblaue Schalen
- △ — **'Kobaltglocke'**, 25 cm, dunkelviolette Glocken
- △ — **'Spechtmeise'**, 20 cm, dunkellila Glocken
- △ — **'Weiße Clips'**, weißer Partner der Blauen Clips
- △ — **'White Star'**, 30 cm, Blütenglocken groß, weiß
- △ **cochliariifolia (pusilla)**, 10 cm, VI—VIII, ○, ☞. Zwergglockenblume m. zierlichen nickenden Glöckchen, reizend, wenn sie in and. niedr. Polster, z. B. Thymian, wächst.
- △ — **'Alba'**, weißblühende Sorte
- △T **garganica**, 15 cm, V—VI, ○, ☞. Sternpolsterglocke mit lila Blütensternen.
- △ **glomerata 'Acaulis'**, 40 cm, VII—VIII, ○, ☞. Einheimische, violette Knäuelglockenblume in nicht wuchernder Form.
- △ — **'Schneekissen'**, 40 cm, weiße Form

grandis, 100 cm, VI, ○, ✕. Hellblaue, flache Glocken dicht am Stiel.

lactiflora 'Prichards Variety', 60 cm, VII—VIII, ○, ✕. Lavendelblaue Bl-Glocken.

latifolia 'Alba', 100 cm, VI—VII, ○—●. Sehr wirkungsvolle, weiße Waldglockenblume.

— **var. macrantha**, 100 cm, VI—VII, tief violette Waldglocke
N: Aruncus, Digitalis, Hosta.

persicifolia 'Grandiflora Alba', 80 cm, VI—VII, ○—●, ✕. Weiße Form der pfirsichblättrigen Glockenblume.

— **'Grandiflora Coerulea'**, lichtblaue Glocken.
N: Schafgarben, Gräser, Chrysanth. cocc.

△T **portenschlagiana**, 15 cm, VI—VII und IX, ○, ☞. Teppichglocke, violettblaue Glöckchen an aufrechten Stielen. Gut für Steingärten und Einfassungen, läuft in den Mauerfugen weiter.

△ — **'Birch Hybrid'**. Blüten größer und dunkler, wüchsiger

△ **poscharskyana**, 20 cm, IV—VII, ○—●, ☞. Lange Triebe voller sterniger Bl. schmiegen sich dem Boden an. Lila.

△ — **'E. H. Frost'**, dieselbe in weiß

△ — **'Glandore'**, 20 cm, IV—VII. Die blauen Sternblüten haben ein weißes Auge.

△ — **'Stella'**, 15 cm, violett mit dunklen Stielen

sarmatica, 50 cm, VI—VII, ○, ☞. Glockenblume mit grau-filzigen B und hellblauen Bl. Schön zum Verwildern.

△T **turbinata 'Arends Form'**, 10 cm, VII, ○, ☞. Große, dunkelviolette Glocken, gedrungener Wuchs.

△ — **'G. F. Wilson'**, 15 cm, V—VIII, ○, ☞. Sehr kompakte Sorte von dunkelblauer Farbe, großblumig.

△ **Cardamine**, Schaumkraut, CRUCIFERAE, 15 cm, IV, ●—●, ☐
trifolia. Wintergrüner Bodenbedecker für feuchte, schat-
tige, humose Plätze. Weiße Blüten.

Carlina, Silberdistel, COMPOSITAE, 10—12 cm, VII—IX, ○, ☐.

△ **acaulis**. Unsere heimische Wetterdistel, die kalkhaltige Bö-
den in warmer und sonniger Lage liebt.

Centaurea, Flockenblume, COMPOSITAE, ○, ✕.

Flockenblumen sind wichtige und dekorative Vor-
sommerblüher des Staudengartens. Sie liefern außer-
dem Schnittblumen. Sie sind mit jedem Boden zufrie-
den und wachsen auch noch an trocken-heißen Stel-
len.

dealbata 'Steenbergii', 70 cm, VI—VII. Leuchtend purpur-
rote Bl über grünen B. Wuchert.

macrocephala, 120 cm, VII—IX. Gelbe, duftende Bl kom-
men aus großen, braunschuppigen Knospen hervor.
Schöne Solitärpflanze.

montana 'Grandiflora', 40 cm, V—VII. Großblütige Sorte
unserer europäischen Bergkornblume. Blau. Wuchert.

△ **simplicicaulis**, 20 cm, VI—VII, ☐. Büsche silbergraugrüner
B mit rosalia Blüten. Für trockene Steingartenplätze.

Cerastium, Hornkraut, CARYOPHYLLACEAE, 10 cm, V—VI
○, ☐.

Brauchbar, wenn man große, trockene Plätze oder
Mauern silberhell überwuchern lassen will.

△ **tomentosum var. columnae**, gedrungener Wuchs, nicht
stark wuchernd, weiße Bl.

Ceratostigma, Bleiwurz, PLUMBAGINACEAE, 20 cm, VIII—X,
○—●, ☐,

△ **plumbaginoides** ist ein wertvoller Bodenbedecker (Befesti-
ger) für trockene Lagen mit kalkhaltigem, durchlässi-
gem Boden. Enzianblaue Blüten und schöne Herbstfär-
bung im Spätherbst. Wirkungsvoller Ausklang im Stein-
garten.

N: *Oenothera missouriensis*, *Festuca glauca*.

Chelone, Schlangenkopf, SCROPHULARIACEAE, 70 cm, VII—X,
○—●, ✕.

obliqua. Eigenartige, kräftig rosa Rachenblüten. Bevorzugt
feuchte Lagen.

Chrysanthemum, Margarite und Gartenchrysantheme,
COMPOSITAE, ○, ✕.

Zu ihnen gehören sowohl die bunten Frühjahrmarga-
riten (Pyrethrum) wie auch die weißen Sommermarga-
riten und die allbekannten, herbstblühenden Garten-
chrysanthemen.

△ **arcticum**, 30 cm, IX—X, ○, ✕, ☐. Nordlandmargarite mit
weißen Bl über frischgrünen B.

— **'Roseum'**, 40 cm, dieselbe in rosa

— **'Schwefelglanz'**, 40 cm, schwefelgelb mit dunklen Stie-
len

N: Astern und Gehölze mit schöner Herbstfärbung.

coccineum (Pyrethrum), V—VII, ○, ✕. Die bunte Frühjahrs-
margarite mit ihren Gartensorten ist eine wichtige
Schnittblume.

— **'Brenda'**, 80 cm, ungefüllte, leuchtende kirschrote Bl

— **'Eileen May Robinson'**, 80 cm, einfache, reinrosa Bl,
straffe Stiele

— **'Pfingstgruß'**, 20 cm, karminrosa gefüllte Beetsorte

- **'Juwa Schnittwunder'**, Sämlinge in verschiedenen roten Tönen.
- **'Regent'**, 80 cm, leuchtend rote Blüten

indicum Hybriden, ○, ✕. Unsere Chrysanthemen sind das Ergebnis jahrhundertelanger Züchtung. Sie wollen einen möglichst trockenen Standort (vor allem keine stehende Winternässe) und nahrhaften Gartenboden. Die überreiche Blütenfülle zum Ausklang des Gartenjahres ist immer wieder ein Erlebnis. Die große Farbskala ist zum Schnitt unersetzlich und die Blumen halten sich lange.

f = Ende August bis Ende September, m = Ende September bis Mitte Oktober, s = Mitte Oktober bis November blühend.


- **'Anneliese Kock'**, 80 cm, weiß gefüllt, f
- **'Buntj'**, 50 cm, weiß mit braunrosa Mitte, Pomponblütig, lange Blütezeit, reizend, m—s
- **'Ceddie Masson'**, 80 cm, blutrot, einfach, m—s
- **'Citrus'**, 70 cm, zitronengelb, halbgefüllt, m
- **'Corinna'**, 80 cm, rosa einfach, hart, m
- **'Edelweiß'**, 70 cm, getöntes Weiß, anemonenblütig, m—s
- **'Fellbacher Wein'**, 60 cm, leuchtend rot, halbgefüllt, m
- **'Glarus'**, 60 cm, gefüllt, samtig weinrot, s
- **'Golden Orfe'**, 60 cm, tiefes, reines Goldgelb, ballförmige Bl, f.
- **'Goldmarienne'**, 80 cm, bronze mit goldgelb, halbgefüllt, hart f
- **'Hansa'**, lilarosa, gefüllt, f
- **'Herbströschchen'**, 80 cm, lilarosa mit dunklerer Mitte, pomponblütig, s

- **'Ida'**, 40 cm, halbgefüllt, warmbraun, niedrige Gruppensorte, m—s
- **'Isabellarosa'**, 70 cm, beige einfach, hart m—s
- **'L'Innocence'**, 70 cm, zartrosa bis weiß, einfach, sehr hart, f
- **'Nebelrose'**, 90 cm, silberrosa gefüllt, rötliches Laub, hart, sehr s
- **'Novembersonne'**, 80 cm, goldgelb gefüllt, sehr s
- **'Orchid Helen'**, 50 cm, gefüllt lilarosa, f
- **'Ordensstern'**, 80 cm, leuchtend broncebraun gefüllt ganz besonders lange Blütezeit, f—s
- **'Red Velvet'**, 70 cm, gefüllt, dunkelweinrot, m
- **'Rosennymph'**, 80 cm, rosa halb gef., m—s
- **'Schleswig-Holstein'**, 60 cm, goldgelb gefüllt, f
- **'Schwabenstolz'**, 60 cm, dunkelbraunrote gefüllte Blüten, m
- **'Schweizerland'**, 80 cm, schönes Rosa, gefüllt, m
- **'Schwyz'**, 60 cm, kräftig rostrot gefüllt, s
- **'Suse'**, 70 cm, gelb, einfach, m
- **'Vreneli'**, 90 cm, leuchtend braun, halbgefüllt, s
- **'White Bouquet'**, 50 cm, weiße Pompon mit beige Mitte, lange Blütezeit, sehr hart, m—s

maximum, VI—IX, ○, ✕. Die Gartenmargarite ist eine wertvolle Rabatten- und Schnittstaude. Sie will nahrhaften, aber nicht zu nassen Boden. Sie halten sich lange in der Vase.

N: Türkenmohn, Rittersporn, Lupinen.

- **'Gruppenstolz'**, 60 cm, kompakt wachsend, weiß, vorzüglich für Rabatten, m—s
- **'Harry Pötschke'**, 100 cm, weiße Riesenblumen auf straffen Stielen, m—s



Hemerocallis 'Frans Hals'

Hemerocallis 'Jake Russel'. Ähnlich in der Form aber heller ist
'Atlas'.



Hemerocallis 'Great Scott'



Hemerocallis 'War Eagle'. Andere rote Sorten von sterniger Form sind 'Crimson Pirate' und 'Shining Plumage'.

- **'Julischnee'**, 80 cm, halbgefüllte, weiße Bl auf kräftigen Stielen. Schnittsorte, s
- **'Schwabengruß'**, 90 cm, wohl die eleganteste unter den großblumig Gefüllten. Wertvolle Schnittsorte, s
- **'T. Killin'**, 80 cm, anemonenblütig, dicht gefüllte Mitte mit großem Strahlenkranz, m
- **'Wirral Supreme'**, 90 cm, stark gefüllt, auf festen Stielen, sehr bekannte Schnittsorte, f
- **'Polaris Strain'**, 80 cm, aus Samen gezogene Auslese. Ungefüllte, große, weiße Margariten.

serotinum, 150 cm, ○, ✕. Die weißblühende Oktobermargarite.
N: späte Herbstastern, *Helianthus salicifolius*

Cimicifuga, Silberkerze, RANUNCULACEAE, ●—●, ✕.

Alle Silberkerzen sind sehr dauerhafte Schattenpflanzen, welche humosen, frischen Boden lieben. Aus dem dekorativen Blattwerk erheben sich Blütenstände mit weißen Kerzen. Schön vor Gehölzen.
N: Eisenhut, Waldgräser, Farne, Astilben, Herbstanemonen, Fuchsien.

acerina, 80 cm, VII—IX. Niedrigste Silberkerze, wenig verzweigt, straffe Blütenstände.

cordifolia, 200 cm, VIII—X. Lanzensilberkerze. Straff aufrechte Bl-stände mit gelblich-weißen Kerzen. Verträgt auch Sonne und Trockenheit.

racemosa, 200 cm, VII. Julisilberkerze mit wenig verzweigten Bl-ständen, die leicht überhängen.

ramosa, über 200 cm, IX—X. Septembersilberkerze, lange cremeweiße Blütenkerze, duftend!

simplex 'Armleuchter', 140 cm, IX—X. Besonders schöne Sorte der Oktobersilberkerze mit stark verzweigten, leicht überhängenden, reinweißen Rispen.

Clematis, Waldrebe, RANUNCULACEAE, ○, ✕, ▢.

Die nicht schlingenden Staudenclematis sind besonders vor und zwischen Gehölzen sehr wirkungsvoll und sehr hübsch in Sträußen.

integrifolia, 60 cm, VII—VIII, eiförmige B und nickende blaue Bl. Hübsche Fruchtstände.

recta 'Grandiflora', 100 cm, VI—VII. Rahmweiße, große Blüten dolden.

Coreopsis, Mädchenauge, COMPOSITAE, ○, ✕.

Sind Sommerblüher von großer Wirkung und langer Blütezeit.

grandiflora 'Badengold', 80 cm, VI—IX. Große, goldgelbe Bl auf langen Stielen. Dankbare Schnittblume. Im September kräftig zurückschneiden, da sonst Gefahr des Auswinterns.

N: Delphinium.

lanceolata 'Rotkehlchen', 30 cm, VII—X. Die ordentlichen Büsche sind viele Wochen bedeckt mit gelben Blumen, die braun geäugt sind. Reizend auch als Einfassung.

— **'Sonnenkind'**, 40 cm, V—IX. Viele goldgelbe Blüten bedecken die Pflanzen, für Gruppenpflanzung und Beete besonders geeignet.

verticillata 'Grandiflora', 40 cm, IV—IX. Lichtes Goldgelb über zierlichem Laubfiligran. Versorgt fast einen ganzen Sommer lang den Garten mit seiner Farbe.

N: *Salvia* Ostfriesland, größere *Geranium*.

Corydalis, Lerchensporn, PAPAVERACEAE, 30 cm, IV—IX,

●—●, ▢.

lutea. Der Allerweltsbehelf für schwierige Gartenplätze in Sonne und Schatten. Feingefiederte Blätter und gelbe Bl den ganzen Sommer. Sät sich selbst aus und wandert in Mauerfugen weiter.

N: Akeleien, Kaukasusvergißmeinnicht, Narzissen.

Cotula, Fiederpolster, COMPOSITAE, 5 cm, ○—●, ☞.

Bilden dichte Teppiche mit ihrem flachen, kriechenden Wuchs, aus denen man u. a. robuste Zwiebelgewächse hervorwachsen lassen kann. Für durchlässige, nicht zu trockene Böden ein ausgezeichnete Rasenersatz.

△ **squalida**, farnähnliche, gefiederte, etwas bräunliche B

Cyclamen, Alpenveilchen, PRIMULACEAE, ●, ☞.

Wildalpenveilchen verlangen halbschattige Lage unter Laubgehölzen, zwischen Waldbodendeckern in frischer, aber nicht feuchter, kalkhaltiger, humoser Erde. Die Knollen müssen ca. 15 cm mit Erde bedeckt sein.

△T **coum**, 10 cm, II—IV, nierenförmige B, leuchtend karminrote Bl

△T **neapolitanum**, 15 cm, IX—X, efeuartige, wintergrüne B, rosa Bl.

△T — **'Album'**, 15 cm, VIII—IX. Stark wachsende, reinweiß blühende Form.

Cynoglossum, Hundszunge, BORAGINACEAE, 60 cm, VI—VII, ○—●, ✕.

nervosum. Leuchtend enzianblaue Bl. Anspruchslos und reichblühend. Sollte mehr gepflanzt werden.

N: Im Halbschatten *Primula sikkimensis* oder frühe Taglilien.

Delosperma, Staudenmittagsblume, AIZOACEAE, 15 cm, VI—X, ○, ☞.

△ **cooperi**, mesembrianthemumartige, dickfleischige B, leuchtend karminrosa Strahlenbl. mit weißer Mitte. Für heiße, sonnige Lagen und leichte Böden. Verlangt Winterschutz.

Delphinium, Rittersporn, RANUNCULACEAE, ○, ✕.

Sie geheißen in jedem normalen, nährhaften Boden und blühen ein zweites Mal, wenn man sie sofort nach der Blüte bis auf 10 cm zurückschneidet. Düngung im Frühjahr und nach dem Rückschnitt. Austrieb vor Schneckenfraß schützen! Man kann nie genug Blau im Garten haben. Die klassischen Partner sind Rosen und Madonnenlilien.

Belladonna-Gruppe. Diese erreichen eine Höhe von 1 m bis 1,20 m. Sie sind im Aufbau locker, im Laub feiner, von großer Blühwilligkeit und Neigung zum Remontieren. Ausgezeichnete Schnittblumen.

— — **'Capri'**, hellblau mit weißem Auge

— — **'Casa Blanca'**, der lockere Aufbau der schneeweißen Bl ist auch zum Schnitt sehr reizvoll

— — **'Connecticut Yankee'**, 80 cm, niedrige Neuzüchtung mit verschiedenen hell- und dunkelblauen Tönungen der großen Blüten

— — **'Kleine Nachtmusik'**, 70 cm, dunkelviolet, lockere Rispen. **Neuheit!**

— — **'Völkerfrieden'**, leuchtend enzianblaue Sorte von langer Blühdauer

Cultorum-Gruppe. Dichte, lange Rispen auf starken Stielen, VI—VII und IX—X.

— — **'Abgesang'**, 180 cm, leuchtend azurblaue, gefüllte und spätblühende Sorte

— — **'Amorspeer'**, 180 cm, hellblau mit bräunlichem Auge

— — **'Blauwal'**, 200 cm, mittelblau, früh blühend

— — **'Bully'**, 130 cm, hellblau mit dunklem Auge. Besonders niedrig und standfest

— — **'Fernzünder'**, 130 cm, leuchtend blau, weißes Auge

- — **'Finsteraarhorn'**, 170 cm, tief enzianblau, mit schwarzem Auge
- — **'Glasturm'**, 160 cm, hellblau
- — **'Jubelruf'**, 180 cm, leuchtendes Mittelblau, weiß geäugt, halbgefüllt
- — **'Junior'**, 160 cm, mittelblau, schwarzes Auge
- — **'Ouverture'**, 130 cm, mittelblau mit rosa Tönen, schwarzes Auge, sehr früh blühend
- — **'Perlmutterbaum'**, 180 cm, hellblau, rosa getönt, mit schwarzem Auge
- — **'Rosenquarz'**, 150 cm, hellblau, rosa getönt weisses Auge
- — **'Sommernachtstraum'**, 150 cm, enzianblau, mit schwarzem Auge, früh blühend
- — **'Sternennacht'**, 150 cm, tiefenzianblau, nach innen heller, weißes Auge.
- — **'Tempelgong'**, 180 cm, nachtblau mit purpur, halbgefüllt
- — **'Traumulus'**, 180 cm, mittelblau, mit weißem Auge

Pacific-Gruppe. Diese in Kalifornien entwickelten Gruppen werden aus Samen gezogen, darum muß immer mit leichten Farbabweichungen gerechnet werden. Sie haben besonders große Einzelblüten, die oft doppelt sind. Die eindrucksvollen, langen Rispen sind für grosse Sträusse unersetzliche Schnittblumen. Bei windigem Standort empfiehlt es sich, ihnen bei Zeiten Stäbe zu geben.

- — **'Black Knight'**, dunkelviolet mit schwarzem Auge
- — **'Blue Bird'**, mittelblau mit weißem Auge
- — **'King Arthur'**, dunkelviolet mit weißem Auge
- — **'Ordensritter'**, weiß mit schwarzem Auge

- — **'Rosa Sensation'**, lilarosa Farbtöne, sehr besonders
- — **'Summer Skies'**, hellblau mit weißem Auge
- — **'Weißer Herkules'**, reinweiß
- — **'Tafelrunde'**, Mischung dieser Sorten

△ **grandiflorum 'Blauer Zwerg'**, 50 cm, VI—VII. Auf locker verzweigten Stielen leuchtend blaue Blüten. Wunder schön, aber leider nicht sehr langlebig.

Dianthus, Nelke, CARIOPHYLLACEAE, ○, ▢.

Da fast alle Nelken sehr viel Sonne und durchlässigen Boden mögen, finden sie ihren besten Platz in Steingärten und auf Trockenmauern. Bei den meisten schmückt schon das grüne oder grau-grüne Polster.

gratianopolis (caesius)

- △ — **'Blaureif'**, 15 cm, auf silberblauem Laub rosa Bl.
- △ — **'Feuerhexe'**, 15 cm, V—VI und IX. Purpurrote Bl, ungefüllt auf grauem Polster, reich remontierend.
- △ — **'Julia'**, 15 cm, größere, runde, warmrosa Bl mit auffallend dunkelrotem Ring.
- △T — **'Nordsternen'**, 15 cm, V—VI. Dichte Polster bildende Sorte mit rosaroten, ungefüllten Bl. Besonders widerstandsfähig.
- △ **cruentus**, 50 cm, VII, kugelige Köpfchen mit leuchtend blutroten Blüten.
- △ **deltoides 'Brillant'**, 15 cm, VI—VII. Die Heidenelke mit dunkelroten Bl über grünem Polster.
- △ — **'Splendens'**, 15 cm, VI—VII, dunkelbraunrotes Blattpolster, karminrote Bl.
- △T **hybridus 'Pink Jewel'**, 10 cm, V—VI, winzige, rosa gefüllte Nelkchen auf festem Polster. Reizend!

- △ **knappii**, 40 cm, VI—VII. Schwefelnelke. Über grasartigen B erheben sich die zu doldigen Bl-ständen zusammengefaßten, gelben Bl.
- △ **petraeus**, 15 cm, V—VI. Geröllnelke, grüne, weiche Polster bildend, weiß und fein gefranst.
- △ **plumarius 'Delicata'**, 20—30 cm, V—VI. Zartrosa gefüllte Federnelke für Rabatte und Einfassungen. Alle Federnelken sind ausgezeichnete Schnittblumen.
- △ — **'Diamant'**, 30 cm, V—VI, weiß gefüllt
- △ — **'Heidi'**, 20 cm, V—VI, leuchtend blutrote Bl über besonders grauem Laub, schöne Neuheit

Dicentra, Herzblume, PAPAVERACEAE, ○—●.

- △ **eximia**, 25 cm, V—IX. Zwergherzblume mit farnartigen, zierlichen B und rosa Bl. Gedeiht flächig oder mit Gräsern und Farnen zusammen gepflanzt gut im Halbschatten.
N: Epimedium, Primeln.
- △ — **'Alba'**, dieselbe in Weiß.
- spectabilis**, 80 cm, V—VI. Das Tränende Herz, eine der beliebtesten Gartenpflanzen.
N: Kaukasusvergißmeinnicht.

Dictamnus, Diptam, RUTACEAE, 80 cm, VI—VIII, ○—●, ☐.

albus, der „Brennende Busch“ Moses! Eine langlebige Staude, die kalkhaltige Böden bevorzugt. Liebt Wärme, Sonne und Trockenheit. Blätter und Fruchtstände enthalten ätherische Öle, die an windstillen Tagen entzündet werden können, ohne zu verbrennen. Hellrosa Bl.

Digitalis, Fingerhut, SCROPHULARIACEAE, ●—●.

Fingerhut ist eine wunderschöne Pflanze zur Verwil-

derung und neben **Aruncus** und **Waidgiöckenblumen** auch in halbschattigen Rabatten. Das zweijährige Leben kann durch sofortigen Rückschnitt nach der Blüte verlängert werden, oder man läßt den Samen ausfallen.

ferruginea 'Gigantea', 180 cm, VII—VIII. Bl mattes Gelb, braun geadert auf wintergrünen, dekorativen Blattrosetten.

grandiflora (ambigua), 80 cm, VI—VIII. Der in unseren Gebirgen heimische, gelbe Fingerhut ist eine langlebige Wildstaude für den Garten.

x mertonensis, 60 cm, V—VI, große, lachsrosa Bl, sehr besondere Farbe.

purpurea 'Dropmore Yellow', 120 cm, VI—VII, hellgelb.

— **'Excelsior Hybriden'**, 100—150 cm, VI—VII. Mischung von weißen, rosa und roten Farben mit dunklen Flecken. Die Bl hängen nicht wie bei der Wildart, sondern stehen ab.

Dodecatheon, Götterblume, PRIMULACEAE, 50 cm, V—VI, ○—●, ☐.

meadia, lilarosa am Grunde weiße Bl, die Alpenveilchen gleichen.

Doronicum, Gemswurz, COMPOSITAE, ○—●, ✕.

Eine der bekanntesten Frühjahrsblüher und frühesten Schnittblumen.

N: Kaukasusvergißmeinnicht, Tränendes Herz, Primeln und Tulpen.

caucasicum 'Frühlingspracht', 50 cm, IV—V, mit goldgelb gefüllten Bl

△ — **'Goldzwerg'**, IV—V, niedrigste Gemswurz

- '**Magnificum**', 40 cm, IV—V, große, gelbe Margaritenblüten
- △ — '**Riedels Goldkranz**', 25 cm, IV—V, doppelte Blütenblätter. Kompakter Wuchs, für Gruppen und Einfassungen geeignet.
- plantagineum 'Excelsum'**, 80 cm, V—VI. Höchstes Doronicum mit großen Bl., besonders zum Schnitt.

Draba, Hungerblümchen, CRUCIFERAE, 5 cm, III, ○, ☐.

- △T **brunifolia**, moosartige Polster mit gelben Bl. Anspruchslos, kleine Gartenschätze für durchlässige, vollsonnige Lagen, neben nicht starkwachsenden Pflanzen.
- N: Teppichveronica, Kleine Glockenblumen, Sempervivum.

Dracocephalum, Drachenkopf, LABIATAE, 30 cm, VI—VIII, ○—●, ☐.

- △ **ruyschiana**, schmale B und stahlblaue Lippenblüten, schöner Sommerblüher im Steingarten.

Dryas, Silberwurz, ROSACEAE, 15 cm, V—VI, ○, ☐.

- △ **x suendermannii**, derbe, lederartige B, die feste Teppiche bilden. Anemonenartige, elfenbeinweiße Bl und sehr hübsche federige Samenstände. Für sonnige Lagen u. kalkhaltige Böden.

Echinops, Kugeldistel, COMPOSITAE, 120 cm, VII—VIII. ○, ✕.

ritro 'Veitchs Blue', stahlblaue, leuchtende Kugelköpfe auf dekorativem, grauem Laub. Wichtig für Schnitt.

Epimedium, Elfenblume, BERBERIDACEAE, ●—●, ☐.

Die zierlichen Blumen tragen ihren Namen mit Recht.

Schön für jede Schattenpflanzung, das Laub ziert auch durch seine Herbstfärbung und hält den ganzen Winter.

N: Omphalodes, Astilben, Tiarella, Primeln.

- △ **grandiflorum (macranthum)**, 25 cm, IV—V, weiße, langgespornte Bl
- △ — '**Rose Queen**', 25 cm, IV—V, große, langgespornte Bl in Rosa.
- △ **pinnatum 'Elegans'**, 20—30 cm, IV—V, wintergrüne, leuchtend gelb blühende Art
- △ **x rubrum**, 30 cm, IV—V, rote Blumen, innen gelblich-weiß, stark wachsend
- △ **x versicolor 'Sulphureum'**, 35 cm, IV—V, schwefelgelbe Bl, stark wachsend
- △ **x youngianum 'Niveum'**, 20 cm, IV—V, reinweiße Bl, schwächer wachsend
- △ — '**Lilacinum**', wie vorige, aber in rosigem Lila
- △ **x warleyense**, 30 cm, IV—V, auffallende, starkwüchsige Art, mit orangefarbigen Blüten.

Eremurus, Lilienschweif, Steppenkerze, LILIACEAE, ○, ✕.

Sehr wirkungsvolle Solitärstaude. Die seesternartigen Wurzelstöcke werden 15 cm tief gelegt und benötigen einen guten Wasserabzug (3—5 cm dicke Sandschicht, darunter in schweren Böden in 25 cm Tiefe eine Schotterschicht). Pflanzung nur im Herbst.

robustus, 250 cm, V—VI, zartrosa Riesensteppenkerze

stenophyllus var. bungei, 100 cm, VI—VII, gelbe Blütenkerze

Erica, Schneeheide, ERICACEAE, ○—●.

Diese Zwergsträucher lieben humusreichen, lockeren Boden und sind kalkverträglich. Aufbereitung des

Bodens mit Torf. Die Glöckchenheide blüht je nach Witterung schon ab XII, sonst II—III.

- △T **carnea 'Vivellii'**, 25 cm, karminrot, braunrot belaubt.
△T — **'Winter Beauty'**, 25 cm, frühe Sorte in kräftig Rosa.

Erigeron, Feinstrahl, COMPOSITAE, ○, ✕.

An Asten erinnernde, dankbare Stauden für Rabatten und Schnitt. Für jeden guten, nicht zu nassen Boden in sonniger Lage. Nach der Blüte schneide man zurück, sie treiben dann eine zweite Bl, VI—VII und VIII—IX.

N: Rudbeckia, Helenium, Heliopsis zu den blauen Sorten; Gypsophila.

- △ **aurantiacus**, 25 cm, orangeblühende Art für Steingärten in nicht zu rauhem Klima

Hybride 'Adria', 60 cm, leuchtend violettblau, halbgefüllt, großbl.

- **'Blaue Grotte'**, 60 cm, halbgefüllt, tiefviolett.
- **'Foersters Liebling'**, 40 cm, karminrosa, halbgefüllt
- **'Gartenmeister Walther'**, 50 cm, leuchtend rosa, halbgefüllt
- **'Lilofee'**, 70 cm, lila, halbgefüllt, straffstielig, Dauerblüher
- △ — **'Mrs. E. M. Beale'**, 40 cm, helles Lila, dankbare Dauerstaude
- **'Rote Schönheit'**, 60 cm, dunkelrosa, halbgefüllt, remontiert stark
- **'Sommerneuschnee'**, 60 cm, rosa getöntes Weiß, remontiert.
- **'Strahlenmeer'**, 60 cm, violett, sehr feinstrahlig

Erinus, Leberbalsam, SCROPHULARIACEAE, 10 cm, V—VIII.
○, ☐.

- △T **alpinus 'Albus'**. Kleine Polsterstaude von rührender Blühwilligkeit. Sie ist wochen- und monatelang überdeckt von den zierlichsten, weißen Blütentrauben

△T **'Dr. Hähnle'**, dieselbe in leuchtend karminrot.

Eryngium, Edeldistel, UMBELLIFERAE, ○, ✕.

Begehrte Schnittblume zum Trocknen geeignet. Für Naturgärten und Rabatte.

N: Solidago caesia, Helenium, Rudbeckia, Anaphalis, Gypsophila.

planum 'Blauer Zwerg', 60 cm, VI—IX, blaue Blütenköpfe auf locker verzweigten Stielen.

tripartitum, 70 cm, kleine dunkelblaue Blütenköpfe, von unten stark verzweigt

- △ **variifolium**, 40 cm, VIII. Sehr interessante weiße Zeichnung auf den Bl, gedrungener Wuchs, graue Bl

x zabelii 'Juwel', 60 cm, VI—VII. Tief stahlblaue Bl-köpfe und eben solche schwachgeschlitzte Hüllblätter.

Eupatorium, Wasserdost, COMPOSITAE, 100 cm, VII—IX, ○-☐.

rugosum, flockige, weiße Bl in lockeren Blütenständen. Schön an Teichrändern zu Thalictrum, Tradescantia, Ligularia.

Euphorbia, Wolfsmilch, EUPHORBIACEAE, ○, ☐.

Die auffallende Wirkung haben bei diesen Pflanzen Hochblätter übernommen, die Bl sind klein und unscheinbar.

griffithii 'Fireglow', 60 cm, V—VI. Auffallend orangerote Hochblätter, schöne Herbstfärbung.

△ **mysrinites**, 20 cm, VI—VII, Walzenwolfsmilch. Liegende Stengel walzenförmig, die blaugrün beblättert sind. Auch im Winter schön.

△ **polychroma**, 40 cm, IV—V, Goldwolfsmilch mit gelben Hochblättern an aufrechten Stielen, weithin leuchtende Frühlingsstaude und schöne Herbstfärbung.
N: Frühjahrsblüher, Geum, Tulpen, Zwergiris und Muscari.

Filipendula, Spierstaude, ROSACEAE, ○—●.

Dekorative Stauden, die an leicht schattigen, feuchten Stellen ihren Standort haben sollten.

hexapetala 'Plena', 30 cm, VI—VII. Diese Art sollte nicht zu feucht stehen. Wintergrüne, farnartige B und gefüllte rahmweiße Bl.

rubra 'Venusta Magnifica', 120 cm, VI—VII, leuchtend rosa Blüten

Fuchsia, Fuchsie, ONAGRACEAE, ●—●, ☞.

Reizende, langblühende Sträucher, die leider viel zu wenig bekannt sind. Die angebotenen Arten sind bei Laubdecke winterhart. Wenn sie auch bis zum Boden zurückfrieren, so treiben sie doch nach Rückschnitt kräftig wieder aus. Auch als Kübelpflanzen geeignet.
N: Cimicifuga, Funkien, Weiße Japananemonen.

magellanica 'Alba', 170 cm, Bl zartrosa, fast weiß

— **'Gracilis'**, 80 cm, feines Laub, sehr zierliche rote Bl

— **'Mme. Cornelissen'**, 80 cm, große Blüten außen rot, innen weiß

— **'Mrs. Popple'**, 80 cm, Blüten außen rot, innen blau, großblumiger als 'Riccartonii'. Bewährte englische Sorte

— **'Riccartonii'**, 170 cm, bildet große Büsche, rot und blau, reichblühend

△ **thymifolia**, 50 cm, Zwergfuchsie, viele winzige, rote Blüten.

Gaillardia, Kokardenblume, COMPOSITAE, ○, ✕.

Als Dauerblüher voll sommerlicher Farbe sind sie im Garten von hohem Wert, als Schnittblumen in Sommersträußen begehrt. Gegen Ende des Sommers muß man dem fortwährenden Blühen aber durch scharfen Rückschnitt ein Ende machen, wenn man die Pflanzen gut durch den Winter bringen will.

x **grandiflora 'Burgunder'**, 50 cm, VII—IX. Stumpf braunrote Bl

— **'Kobold'**, 25 cm, VI—IX, gedrungen wachsende Beet-sorte in Rot mit Gelb

— **'Mandarin'**, 60 cm, VI—IX, orangerot. Diese vegetativ vermehrte Sorte hat sehr feste Stiele und ist ausgezeichnet zum Schnitt

— **'Rossdorfer Hybriden'**, 50—60 cm, VI—IX. Eine Mischung roter und gelber Farbtöne, die sich auch gut zum Schnitt eignet.

Gaura, Gaura, ONAGRACEAE, 80 cm, VIII—X, ○—●, ✕, ☞.

lindheimeri, graziöse, rosige Bl an langen Rispen, lange Blütezeit.

Gentiana, Enzian, GENTIANACEAE, ☞.

Der Wunsch jedes leidenschaftlichen Steingärtners! Jede Art stellt andere Ansprüche, am heikelsten ist

der Alpenenzian, am einfachsten zu ziehen der Sommerenzian.

△T **acaulis**, 10 cm, V—VIII, ○. Der stengellose Alpenenzian mit tiefblauen Trichterblüten.

asclepiadea, 50 cm, VIII, ●. Schwalbenschwanzenzian mit dunkelblauen Bl an langem Stengel.

△ **dahurica**, 40 cm, VIII—IX, ○. Kleine Blüten, tiefblau, die in Büscheln zusammensitzen.

△ **septemfida** var. **lagodechiana**, 30 cm, VII—VIII, ○. Sommerenzian mit vielen leuchtend blauen Bl an niederliegenden Stielen.

Geranium, Storchschnabel, GERANIACEAE, ○—●, ☐, ☐.

Die storchschnabelähnlichen Samenstände gaben dieser Gattung den Namen. Alle Vertreter sind dauerhaft, vertragen sehr gut Trockenheit und wirken ausser durch die Bl auch mit dem schönen Blattwerk, welches sich im Herbst auffallend verfärbt. Die niedrigen Arten eignen sich für flächige Pflanzungen bis in den Schatten.

△T **cinereum** '**Ballerina**', 15 cm, VI—IX. Reizende Sorte mit lilarosa Bl, die dunkelrote Adern haben. Besonders lange blühend.

△T **dalmaticum**, 15 cm, VI—VII. Storchschnabel mit weiß-rosa Bl

△ **endressii** '**Wargrave Pink**', 30 cm, VII—VIII, fünflappige Blätter, hübsche, lachsige rosa Bl.

grandiflorum '**Johnsons Variety**', 40 cm, VI—VII, violett-blaue, purpurgeäugte Bl

macrorrhizum '**Spessart**', 30 cm, VI—VII, ●—●. Wintergrüner Bodenbedecker für Halbschatten, rosa Bl.

platypetalum, 60 cm, VI—VII. Kaukasusgeranium mit grossen violettblauen Bl und prächtiger Herbstfärbung. Vor Gehölzen zusammen mit Goldfelberich und in Staudenrabatten.

△ **sanguineum**, 30 cm, V—IX. Bildet durch die niederliegenden Triebe große Büsche. Bl karminrot, besonders hübsches Laub. Gut für Böschungen.

△ — '**Album**', dieselbe in Reinweiß

△ **subcaulescens** '**Splendens**', 15 cm, VII—VIII. Bl tief karminrot, reichblühend.

△ — '**Lancastriense**', 15 cm, VII—VIII. Hellrosa Bl.

△ **stapfianum** '**Roseum**', 20 cm, V—VI, sehr hübsches Laub als Bodenbedecker, kräftig rosa Bl.

△ **wallichianum** '**Buxtons Blue**', 30 cm, VIII—IX, blau, dunkler geäugt, reizend, auch für Halbschatten.

Geum, Nelkwurz, ROSACEAE, ○—●, ✕, ☐.

Verschiedene Blütezeiten der Sorten und Remontieren lassen die Geumblüte eigentlich den ganzen Sommer über nicht abreißen. Nicht zu trockener Standort.

△ **coccineum** '**Borisii**', 30 cm, V—VII. Hübsches, mennigrot blühendes Geum für Steingärten.

△ — '**Feuermeer**', 30 cm, V—VII, orangerot, remontiert.

Hybride '**Feuerball**', 50 cm, VI—VII, leuchtend rot halbgefüllt

△ — '**Georgenberg**', 30 cm, IV—VI, orangegelb

— '**Goldball**', 50 cm, VI—VIII, goldgelb, halbgefüllt.

Gillenia, Dreiblattspiere, ROSACEAE, 80 cm, VI—VII, ●—●, ☐.

trifoliata, dreiteilige B, lockere Rispen mit weißen Bl auf roten Kelchblättern. Herbstfärbung!

Globularia, Kugelblümchen, GLOBULARIACEAE, ○—●, ☐.

△T **cordifolia**, 10 cm, VII. Eine reizende Kleinstauden, die immergrüne Blattrosetten bildet mit blauen Blütenköpfchen, liebt kalkhaltigen Boden.

△ **trichosantha**, 20 cm, V—VI. In allen Teilen etwas größer. Sehr dankbare Pflanze, deren immergrüne Blattpolster ein guter Bodenbedecker ist. Hübsche, leuchtend blaue Bl.

Gypsophila, Schleierkraut, CARIOPHYLLACEAE, ○.

Schleierkräuter gehören in jeden Garten. Die langblühenden kleinen in Steingärten und auf Trockenmauern, die großen in die Rabatte. Sehr hübsch in Sommersträußen.

paniculata 'Bristol Fairy', 100 cm, VII—VIII, ✕. Großblumig, gefüllt, weiß

— **'Schneeflocke'**, 70 cm, VII—IX, ✕. Kleine, weiße Bl.
N: Alle Rabattenstauden und Rosen.

△ **repens 'Letchworth Variety'**, 10 cm, V—VIII, ☐. Einfache rosa Bl. Hängt in großen Polstern über Trockenmauern.

△ — **'Pink Star'**, 40 cm, VI—IX, ☐, ✕. Kräftig wachsend mit gefüllten, rosa Bl.
N: Steingartenglockenblumen.

△ — **'Rosenschleier'**, 30 cm, VI—IX, ☐. Etwas zierlichere Sorte, ebenfalls rosa gefüllte Blüten

Hedera, Efeu, ARALIACEAE, ●—●, ☐.

△T **helix 'Conglomerata'**, 30 cm. Zwerg efeu mit gebogenen Trieben und gewellten B

△T — **'Minima'**, 40 cm, aufrechter Zwerg efeu mit hübschen Blattleitern

△ **ovata**, 20—30 cm, kleinbleibend. Die ovale Blattform gibt der Pflanze einen besonderen Reiz. Schöner Bodenbedecker für Schatten.

Helenium, Sonnenbraut, COMPOSITAE, ○, ✕.

Eine der dankbarsten Sommerstauden. Unter den neuen, zum Teil niedrigeren Sorten, sind alle Schattierungen vom schönen Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun, oft zweifarbig.

N: Man mische die herrlichen Sonnenbrautfarben untereinander, indem man z. B. niedrige braune vor hohe gelbe Sorten pflanzt. Gelb verlangt nach braunen und blauen Farben! Blaue Astern, Rudbeckia, Delphinium.

bigelowii 'Superbum', 70 cm, VI—VII, gelbe Bl mit brauner Mitte

x **hybridum**, VII—IX

f = früh-, m = mittel-, s = spätblühend.

— **'Baudirektor Linne'**, 120 cm, braunrot, m—s

— **'Feuersiegel'**, 160 cm, auffallende Sorte mit großen, goldbraunen Bl, die leuchtend rot durchstrahlt sind, s

— **'Flammenrad'**, 150 cm, goldgelb, kupfern geflammt, m

— **'Goldlackzwerg'**, 80 cm, rotbraun mit gelber Zeichnung, m

— **'Golddrausch'**, 150 cm, goldgelb mit brauner Mitte, s

— **'Kanaria'**, 120 cm, gelb mit gelber Mitte, m

— **'Karneol'**, 120—150 cm, warmes, bräunliches Rot, erhielt Wertzeugnis, m

— **'Königstiger'**, 120 cm, Mitte goldgelb zum Rand rotbraun, m—s.

— **'Kupfersprudel'**, 120 cm, kupferbraun, f

— **'Moerheim Beauty'**, 80 cm, braunrot, f

— **'Rotkäppchen'**, 80 cm, leuchtend braunrot, m

— **'Sonnenwunder'**, 140 cm, hellgelb mit gelber Mitte, m

— **'Waltraud'**, 100 cm, kupferfarben und gelb, großblumig, f

- **'Zimbelstern'**, 150 cm, altgoldfarben mit gewellten Rändern, m

Helianthemum, Sonnenröschen, CYSTACEAE, ○, ☐.

Wintergrüne Zwergsträucher mit kleinen rosenartigen Bl. Werden die Büsche unordentlich, so hilft ein Rückschnitt nach der Blüte. Verwendung in sonnigen Lagen, z. B. Steingärten und trockenen Böschungen.

N: Zwerggehölze, Kleingräser, Veronica latifolia, Inula ensifolia. Auch als Einfassung oder Vorpflanzung hübsch.

- △T **alpestre 'Serpyllifolium'**, 8 cm, VI—VIII, die feinen flachen Polster sind übersät mit goldgelben Blütchen. Schön in Trockenmauern.
- △ **Hybride 'Ben Alder'**, 20 cm, leuchtend orangerot, einfach
- △ — **'Braungold'**, 15 cm, einfach, goldgelb, braun geäugt.
- △ — **'Cerise Queen'**, 20 cm, kirschrot, gefüllt
- △ — **'Firebrand'**, 20 cm, feuerrot, einfach
- △ — **'Frau M. Bachthaler'**, 20 cm, blaugraue B und karminrote einfache Bl.
- △ — **'Gelbe Perle'**, 20 cm, hellgelb gefüllt
- △ — **'Golden Queen'**, 20 cm, goldgelb, einfach
- △ — **'Lawrenson's Pink'**, 20 cm, einfach rosa, orange Mitte
- △ — **'Pink Double'**, 20 cm, gefüllte rosa Bl.
- △ — **'Praecox'**, 20 cm, einfache, gelbe Bl auf besonders grauem Laub.
- △ — **'Rosakönigin'**, 30 cm, rosa, einfach, graulaubig
- △ — **'Rubin'**, 20 cm, rot, gefüllt
- △ — **'Ruth'**, 30 cm, einfach, braunrot, graulaubig, stark wüchsig

- △ — **'Sterntaler'**, 20 cm, B auffallend dunkelgrün, goldgelbe Bl, flacher Wuchs.
- △ — **'Wisley Primrose'**, 30 cm, schwefelgelb, einfach, graulaubig

Helianthus, Staudensonnenblume, COMPOSITAE, ○, ✕.

Die Staudensonnenblumen sind kleiner in der Bl als die einjährigen. In der Rabatte brauchen sie viel Platz. Ideal um Komposthaufen, Zäune oder Gartenwinkel abzudecken. Begehrte Schnittblumen.

- atrorubens 'Monarch'**, 180 cm, VIII—IX, große, goldgelbe Sonnenblume.
- decapetalus 'Morgensonne'**, 150 cm. Die Bl haben einen großen, gelben Kranz und sind innen gefüllt.
- **'Grandiplenus'**, 150 cm, dicht gefüllt, goldgelb
- microcephalus**, 170 cm, IX—X. Bildet standfeste, langblühende Büsche mit kleinen, reizenden Blüten. Nicht wuchernd.
- salicifolius**, bis 250 cm, IX—X. Weidenblättrige Sonnenblume. Wuchs und Laub sind durch ihre Linie eindrucksvoll. Kommen vor Hauswänden gut zur Geltung. Erst im Oktober erscheinen an den Triebenden Bündel kleiner Sonnenblumenblüten.

Heliopsis, Sonnenauge, COMPOSITAE, VII—IX, ○, ✕.

Vorzügliche Rabatten- und Schnittstauden mit sehr haltbaren Bl. Lange Blütezeit. Für jeden durchlässigen Boden. Vertragen große Trockenheit.

N: Rittersporn, Phlox, höhere Gräser, Veronica Blauriesin, Salvia Ostfriesland.

- scabra 'Goldgefieder'**, 125 cm, gefüllte, goldgelbe Bl
- **'Goldgrünherz'**, 100 cm, dicht gefüllte, gelbe Bl mit grünem Herz

- **'Hohlspiegel'**, 125 cm, konkave halbgefüllte, tiefgelbe Bl
- **'Karat'**, 120 cm, ungefüllte, goldgelbe Bl
- **'Sonnenschild'**, 120 cm, gefüllt, goldgelbe, große Bl
- **'Spitzentänzerin'**, 130 cm, halbgefüllte, goldgelbe Bl

Heliosperma, Strahlensame, CARIOPHYLLACEAE, 15 cm, VI—VIII, ○—●, ☐.

△T **alpestre**, reizende Pflanze, bildet grüne Polster mit weißen Bl. Für nicht zu heiße, trockene Plätze.
N: Veronica prostrata

Helleborus, Christrose, RANUNCULACEAE, ●.

niger, 30 cm, XI—IV, ☐. Die weiße Christrose verlangt frischen, humosen, lehmhaltigen Boden. Sie wächst langsam und kann, wenn sie sich einmal wohl fühlt, jahrzehntelang unverpflanzt stehen bleiben. Da sie Halbschatten liebt, pflanzt man sie in die Nähe von Gehölzen, mit Leberblümchen, Farnen, Schattengräsern, Lungenkraut, Erica.

Helichrysum, Strohblume, COMPOSITAE, ○, ✕, ☐.

Hybride 'Schwefellicht', 30 cm, VII—IX, schwefelgelbe Bl auf silbrigen B-Polstern. Für durchlässige Böden. Durch den kompakten Wuchs und die lange Blütezeit wertvoll.
N: Aster amellus, Eryngium, Salvia.

Hemerocallis, Taglilie, LILIACEAE

ist eine unserer Spezialitäten. Das große Sortiment finden Sie am Ende des Kataloges.

Hepatica, Leberblümchen, RANUNCULACEAE, 15 cm, II—IV, ●—●, ☐.

nobilis (triloba). Unser Leberblümchen stammt aus den Laubwäldern Europas. Zwischen den dreilappigen B erscheinen die blauen Bl.

Heracleum, Herkulesstaude, UMBELLIFERAE, VI—VII, ○

lanatum, 150—250 cm. Zwischen großen, eingeschnittenen B erheben sich weiße Schirmdolden, auf denen viele Insekten „weiden“. Riesige Solitärstaude, schön einzeln in Rasenflächen.

Herniaria, Bruchkraut, CARIOPHYLLACEAE, 5 cm, ○, ☐.

△ **glabra**. Diese Pflanze mit ihren kleinen B und unscheinbaren Bl bildet grüne, flache Polster. Zuverlässiger Bodenbedecker auf durchlässigen, sandigen Böden. Sehr brauchbar für Platten und Treppenfugen.

Heuchera, Purpurglöckchen, SAXIFRAGACEAE, 50—60 cm, V—VIII, ○—●, ✕.

Zierliche, rote Glöckchen in Rispen an straffen Stielen. Der Boden soll frisch und humos sein. Geeignet für Staudenrabatten, Einfassungen, Naturgärten. Hübsches wintergrünes Laub. Tief pflanzen!

Hybride 'Bressingham Sämlinge'. Die Glöckchen sind in vielen Tönungen von rosa und rot.

- **'Oakington Jewel'**, korallenrot, hübsche B mit broncefarbener Zone
- **'Red Spangles'**, frühblühende Sorte mit leuchtend scharlachroten Rispen
- **'Titania'**, rosa mit lachsigem Schimmer, großblumig

- '**Pruhoniciana**', 50 cm, die dichten Blütenrispen sind rosa und verfärben sich rot. Besonders haltbares, dunkelgrünes Laub.

sanguinea 'Splendens', leuchtend rot

Hosta, Funkie oder Herzlilie, LILIACEAE, ○—●.

Für Schattenpflanzungen immer noch nicht genug verwendet. Die Fülle der Arten und Formen, dieser nicht umzubringenden Gattung ist groß. Sie wirken vor allem durch ihr schönes Laub. Funkien gedeihen in jedem guten Gartenboden, sogar unter Bäumen und an Stellen, wo nie die Sonne scheint.

N: Astilben, Silberkerzen, Gräser, Farne.

aureomarginata, 50 cm, VIII. B grün, gelb gerandet, lila Bl.

fortunei 'Aurea', 50 cm, VIII. Frühlingsgoldfunkie mit beim Austrieb gelblichen, später grünen B und hellvioletten Bl.

Hybride. In den Vereinigten Staaten bemühen sich eine Reihe Züchter um Hosta, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Ich biete hier einige Kreuzungen an, die sowohl was die Blätter anbetrifft, wie die Blüten zeigen, wieviele Möglichkeiten hier noch sind.

- '**Betsy King**', 60 cm, VIII—IX. Mittelgroße, hellgrüne Blätter, aus denen sich die Stiele mit den violetten Blüten erheben, die innen einige weiße Streifen haben.
- '**Honeybells**', 80 cm, VIII. Diese Neuzüchtung hat hellgrüne B und duftende, lavendellila Bl an festen, hohen Stielen.
- '**Susy**', 70 cm, VIII—IX. Mittelgroße B und violettblaue Glocken mit langer Blütezeit.

lancifolia, 50 cm, VIII—IX. Lanzenfunkie mit glänzend grünen lanzettlichen B und violetten Bl.

- △ — '**Alba**', 40 cm, reizende, weiße Glöckchen.

plantaginea 'Grandiflora', 60 cm, VIII—IX. Lilienfunkie mit großen, hellgrünen B und duftenden, weißen Lilienbl. Spät austreibend.

rectifolia, 50 cm, VIII. Mattgrüne B, violettgestreifte Bl.

sieboldiana 'Elegans', 60 cm, VI—VII. Blaublattfunkie mit herzförmigen, graugrünen B und hellila Bl.

undulata 'Univittata', 40 cm, VIII—IX. Schneefederfunkie mit gewellten, weiß gezeichneten B u. hellvioletten Bl.

ventricosa, 60 cm, VIII. Glänzend grüne B. An einem Meter hohen Stielen hängen die glockenartigen, violetten Bl.

Hypericum, Johanniskraut, HYPERICACEAE

calycinum, 30 cm, VII—IX, ○—●, ☞. Schattenhartheu mit großen, goldgelben Bl aus denen die Staubgefäße herausragen. Immergrüne B (in strengen, schneelosen Wintern zurückfrierend, aber nach Rückschnitt im Frühjahr frisch austreibend). Ausläufertreibender Bodenbedecker für große Flächen. Gute Befestigung für steile Böschungen. Geringer Pflegeaufwand.

- △ **polyphyllum**, 15 cm, V—VI, ○, ☞. Zwerghartheu, welches kleine, wintergrüne Büsche bildet. Die gelben Bl mit den vielen Staubfäden sind bis zu 5 cm groß. Anspruchslose Pflanzen für Steingärten und Trockenmauern.

- △ — '**Sulphureum**', 15 cm, V—VI, wie das Vorige, aber in Schwefelgelb.

Iberis, Schleifenblume, CRUCIFERAE, ○, ☞.

Eine der unentbehrlichsten, niedrigen, immergrünen Stauden, für Einfassungen, in Steingärten und auf

Mauern. In nahrhaftem Gartenboden werden die starkwüchsigen Arten in einigen Jahren quadratmetergroß und bilden wahre schneeweiße Blütenkissen. Wenn sie unordentlich werden, kann man sie zurückschneiden.

N: Steinkraut, Blaukissen, Polsterphlox, Zwergiris.

△ **corifolia**, 20 cm, breite, dunkelgrüne B, große, weiße Bl.

△T **saxatilis**, 10 cm, Vorfrühlingsschleifenblume von kriechendem Wuchs.

△ **sempervirens 'Elfenreigen'**, 30 cm, stark wüchsige Sorte, große Bl

△ — **'Findel'**, 25 cm, großblumig

△ — **'Gracilis Superba'**, 25 cm. Die Büsche haben schmale, spitze B und kleinere Bl

△T — **'Little Queen'**, 15 cm, ganz gedrunken wachsende Sorte, die kugelige Büsche bildet

△ — **'Weißer Zwerg'**, 15 cm, kompakte Form, kleinere Bl

△ — **'Zwergschneeflocke'**, 20 cm, zierliche Form

Incarvillea, Freilandgloxinie, BIGNONIACEAE, 60 cm, V—VII, ○.

△ **delavayi**. Eine erstaunliche Gartenpflanze mit tiefrosenroten, großen Trompetenblüten üb. fiederteiligem Laub. Zieht im Spätsommer ein. Mindestens 8 cm tief setzen und vor Mäusefraß schützen.

Inula, Alant, COMPOSITAE, ○.

Sommerblühende Staude mit gelben Korbb Blüten, dankbar und anspruchslos, viel Trockenheit vertragend.

△ **ensifolia 'Compacta'**, 25 cm, VII—IX, ☐. Zwergalant, dessen Kugelbüsche wochenlang übersät sind mit gelben

Bl. Einer der wenigen Sommer-Herbstblüher im Steingarten.

N: Helmkraut, Karpatenglockenblume.

hookeri, 70 cm, VII—VIII. Schöne, hellgelbe Strahlenblüten in lockeren Dolden. Wirkungsvolle Rabattenstaude.

magnifica, 200 cm, VII—VIII. Riesenalant mit sehr großen, breitelyptischen B, die unterseits filzig sind, und goldgelben Bl. Imposante Solitärstaude.

orientalis (glandulosa), 60 cm, VI—VII, ✕. Tieforange Bl.

royleana, 50 cm, VII. Eiförmige B. Aus schwarzbraunen Knospen entwickeln sich große, goldgelbe Margarithenbl.

Iris, Schwertlilie, IRIDACEAE, ○, ✕.

aurea (crocea), 120 cm, VII. Tiefgelbe Steppeniris von eleganter Form

foliosa, 50 cm, VI. Feuchtigkeitsliebende Iris mit schönen, leuchtend blauen Bl, die leider im Laub sitzen.

fulva x foliosa 'Dorothea K. Williamson', 70 cm, VI. Flache Bl von 15 cm Durchmesser, roter Purpur von großer Schönheit, liebt feuchten Standort.

— **germanica (Barbata-Elatior-Gruppe)**. Hohe Bartiris. Diese meine Spezialität, finden Sie a. Schluß d. Katalogs.

— **germanica (Barbata-Media-Gruppe)**. Mittelhohe Bartiris.

— **germanica (Barbata-Nana-Gruppe)**. Niedrige Bartiris. Beide ebenfalls am Ende des Kataloges.

graminea, 40 cm, VI. Duftende Pflaumeniris, stark geadert, violette Blüten im Laub.

halophila, 70 cm, VI—VII, eine Iris aus der spuria-Familie mit weißlichgelben Bl.

kaempferi, VI—VII, 80—100 cm. Japanische Schwertlilien wollen im Sommer möglichst feuchten Standort und kalkfreien Boden. Die herrlichen großen Bl sind waagrecht. Bei den Einfachen sind die drei Domblätter ganz klein und nach oben gerichtet, die drei breiten Hängeblätter stehen waagrecht. Bei den sogen. Doppelten sind die Domblätter breiter und stehen waagrecht im Kranz mit den Hängeblättern.

- **'Biedermeierzeit'**, samtig dunkelviolett, doppelt.
- **'Blaue Stunde'**, kräftig blaulila, doppelt.
- **'Bordeaux Princess'**, samtig rotlila, doppelt.
- **'Care Royal'**, lilablau, weißer Hof, einfach.
- **'Laughing Lion'**, samtig purpurrot, doppelt, gelbes Saftmal auf allen Bl-Blättern.
- **'Loyalty'**, doppelte dunkelblaue Bl mit gelbem Saftmal.
- **'Morning Joy'**, einfach, weißer Grund, ganz durchzogen von rötlichen Adern. Kleine dunkle Domblätter.
- **'Ruby King'**, einfach violett.
- **'Sturmwind'**, einfach weiß, violettblaue Adern und Punkte, hoch.
- **'Träumerei'**, doppelt, blaue Mitte auf Lila, hoch.
- **'Tropennacht'**, dunkel, rötlich violett, doppelt.
- **'Windjammer'**, doppelt, dunkel lila, stahlblaue Mitte.

Sämlinge in verschiedenen Farben.

x monspur, (GB Foster 1890), 70 cm, VI. Zierlicher im Laub und Blütengröße, etwas früher blühend als die spuria-Sorten, mittelblau, gelbes Saftmal, helle Adern.

ochroleuca 'Gigantea', 100 cm, VI. Weiße D und weiße H m. großem, goldgelbem Fleck. Dekorative Steppeniris, die auch Feuchtigkeit verträgt.

- **Sämlinge**, 100 cm, VI. Leuchtend gelb mit gewellten Rändern.

pseudacorus, 90 cm, VI—VII. Unsere heimische, gelbe Wild-iris für feuchten Standort, starkwachsend.

- **'Golden Queen'**, die goldgelben Bl sind ohne Zeichnung.

- **'Bastardii'**, die zitronengelbe Art ist sehr reizvoll.

sanguinea (orientalis), 60 cm, V—VI, hübsche, violette Bl

- **'Snow Queen'**, 60 cm, V—VI, dieselbe in Weiß mit grünem Schlund.

sibirica, 80—100 cm, V—VI. Die an feuchten Standorten heimische Schwertlilie, ist in der Kultur sehr anspruchslos und blüht viele Jahre auch an ungünstigen und trockenen Stellen. Sie wirkt nicht nur durch die kleinen, wie Schmetterlinge gezeichneten Bl. sondern auch der Laubbusch ist eine Zierde bis in den späten Herbst. Geeignet zum Verwildern und an Teichrändern.

N: Geum, bunte und weiße Margeriten, Trollius, Hemerocallis.

- **'Blue Moon'**, (USA Scheffy 1952), 70 cm. Große violettblaue Bl, bei denen die Domblätter waagrecht sind, wodurch sie einer Iris kaempferi gleichen. Zwei Bl am Stiel.
- **'Caesars Brother'**, (C Morgan 1932). Schönstes Nachtblau. Ganz glatte, ruhige Form, ohne Adern.
- **'Möve'**, 100 cm. Bis zu sieben weißen, kleinen, zum Schlund gelblichen Bl an jedem Stiel.
- **'Mountain Pool'** (USA Cleveland 1932), 80 cm. Ganz helles Lavendelblau.
- **'Mrs. Rowe'**, (GB Perry), 80 cm. Silberweiß mit rosig-lavendel
- **'My Love'** (USA Scheffy 1949), 90 cm. Kräftig hellblau mit feiner Zeichnung auf den H. Frühblühende, ausgezeichnete Sorte.
- **'Phosphorflamme'**, 120 cm, (D Steffen 1935). Violett mit leuchtend grünblauer Mitte.

- **'Placid Waters'** (USA Cassebeer 1963), 80 cm. Großblumig, lange, hell- bis mittelblaue Bl mit sehr hellen Stempelblättern. Eine Neuzüchtung, die anders ist.
 - **'Sea Shadows'** (GB Brumitt 1965), 75 cm. D breit hellblau, H zur Mitte dunkler werdend. Großblumig von waagrecht Form. Spätblühend. Sehr schöne englische Neuzüchtung.
 - **'Superba'**, 90 cm, leuchtend dunkelblau mit getiegetem Schlund
 - **'Tropic Night'**, (C Morgan 1937), 70 cm, Großblumig, von schönstem Dunkelblau mit ganz wenig Weiß auf den Hängeblättern.
 - **'Tunkhannock'**, 80 cm, (USA Scheffy 1945). Großblumig, weiße Sorte von bester Substanz
- spuria var. alba**, 70 cm, VI. Schmale, straffe B und spitze, bläulichweiße Bl
- **'Cambridge Blue'**, (GB Barr 1910), 120 cm, VI. Leuchtend hellmittelblau, gelbes Saftmal und weiße Adern. Fünf Bl je Stiel.
 - **'Cherokee Chief'** (USA Nies 1952), 110 cm. Unter den älteren Züchtungen ist dies die beste braune mit samtiger Substanz.
 - **'Dutch Defiance'**, 110 cm, (USA Nies 1943), VI. Schönes Hellblau mit großem gelbem Fleck auf den H
 - **'Première'** (GB Barr 1899), 100 cm. Violetter D und stark geaderte helle H, gelbes Saftmal.
 - **'Thrush Song'** (USA Ferguson 1955), 100 cm. Dunkelviolett purpur. Auf den H gelbes, braun umrandetes Saftmal. Nies Award 1964.
- versicolor**, 70 cm, VI. Rötlich violette Bl in verschiedenen Schattierungen mit waagerechten H und hübscher Schlundzeichnung. Für feuchten Standort, gedeihen aber auch in jedem Gartenboden.

△ **Jasione**, Sandglöckchen, CAMPANULACEAE, VII—VIII.

perennis 'Blaulich', auf 40 cm hohen Stielen leuchtend blaue, kugelige B. **Neuheit!**

Kentranthus, Spornblume, VALERIANACEAE, 75 cm, VI—VIII, ○, ✕.

ruber 'Coccineus'. Wertvoller Langblüher mit himbeerroten Blütenrispen, der sich auch mit sehr trockenen Lagen zufrieden gibt.
Vielseitige Verwendung, Rabatte, Großer Steingarten, Trockenmauer, auch zum Verwildern.

Kirengeshoma, Wachsglocke, SAXIFRAGACEAE, 60 cm, VIII-IX, ○, □.

palmata. Wachsartige, hellgelbe Blütenglocken. Graziöse und auffallend schöne Halbschattenstaude für den Herbst.

Kniphofia (Tritoma), Fackellilie, LILIACEAE, VII—IX, ○, ✕.

Sehr dekorative Stauden, welche bei uns etwas Winterschutz brauchen. Aus einem Horst lauchartiger B erhebt sich ein Blütenkolben in lebhaften Farben von gelb-rot. Der Boden soll gehaltvoll und durchlässig sein.

N: Delphinium, Rudbeckia, Heliopsis.

Hybride 'Express', 90 cm, leuchtend orange, früh

- **'Mondfeuer'**, 80 cm. Die Blütendolden sind zierlicher und von eigenartigem Rahmgelb mit rötlichen Knospen. Sehr ansprechende **Neuheit**.
- **'Royal Standard'**, 100 cm, Bl-Kolben gelb mit scharlach, gut zum Schnitt.
- **'Safranvogel'**, 80 cm. Eine weitere, sehr aparte **Neuheit**, deren elegante Blütenkolben lachsrosa sind.
- **Sämlinge**, in verschiedenen gelb-orange Tönungen.

Lamium, Goldnessel, LABIATAE, V—VI, ●, ☐.

galeobdolon 'Florentinum', 20 cm. Silbrig gefleckte B und gelbe Nesselbl. Anspruchslose, ausläufertreibende Schattenpflanze, die auch unter Bäumen nicht versagt. Unentbehrlicher Bodenbedecker für größere Flächen.

Lathyrus, Wicke, LEGUMINOSAE.

latifolius 'Rosa Perle', VII—IX, ○, ✕, ☐. Bis zu 2 m hoch kletternde Staudenwicke, rosa Bl. Geeignet zum Beranken von Zäunen.

— **'Weiße Perle'**, dieselbe mit weißen Blüten.

△ **vernus (Orobis)**, 30 cm, IV—V, ●—●, ☐. Schöne Frühlingsstaude mit violetten bis türkisblauen Bl.
N: Primeln, Epimedium, Narzissen.

△ — **'Alboreus'**, wie Vorige, aber weiß-rosa Bl.

Lavandula, Lavendel, LABIATAE, VII—VIII, ○, ✕, ☐.

Lavendel sind Kinder des Südens und wollen daher viel Sonne, um sich entwickeln, und duften und blühen zu können. Sie eignen sich vorzüglich für heckenartige Einfassungen, sind aber auch im Steingarten und in Verbindung mit Rosen schön. Einige Zweige im Wäscheschrank geben der Wäsche herrlichen Duft und sollen Motten vertreiben helfen.
Durch Rückschnitt nach der Blüte kann man verhindern, daß die Büsche zu sparrig werden.

△ **angustifolia 'Hidcote Blue'**, 50 cm, tiefviolette Blütenähren über grauem Laub.

△ — **'Munstead'**, 40 cm, helleres Blau, gedungen wachsend

Lavatera, Buschmalve, MALVACEAE, 180 cm, VI—IX, ○—●, ✕.
olbia. Graufilzige B, purpurrosa, ca. 7 cm große Bl, lange blühend, Winterschutz.

Leontopodium, Edelweiß, COMPOSITAE, VI—IX, ○, ☐.

△ **alpinum**, bis 20 cm. Alpenedelweiß mit mehr oder weniger graufilzigen B und den bekannten Edelweißbl. Sie werden allerdings nicht so schön wie im Hochgebirge, aber durch hungrigen Standort zwischen Geröll läßt sich die Farbe verbessern. Nicht düngen!

△T — **'Mignon'**, 10 cm. Ist eine vegetativ vermehrte Sorte von polsterartigem Wuchs mit silberweißen Bl.

Liatris, Prachtscharte, COMPOSITAE, 70 cm, VII—X, ○, ✕, ☐.
Aus grasartigen B-Schöpfen erheben sich ährige Bl-Stände, an denen besonders interessant ist, daß sie von oben nach unten aufblühen. Die Knollen werden gerne von Wühlmäusen gefressen. Für jeden nicht zu nassen Gartenboden.

N: Glockenblumen, Aster amellus, als Unterpflanzung graue Poister.

scariosa 'Snow White', 70 cm. Große Blütenstände mit reinweißen Blüten. **Neueinführung!**

spicata. Dichtbesetzte Blütenstände, rötlich violett

— **'Callilepis'**. Fedrige Blütenköpfchen, violettrot.

Ligularia (Senecio), Kreuzkraut, COMPOSITAE, ○—●.


Ornamentale Blattschmuckstaude zur Verwendung an Teichen und Wasserbecken, aber auch zur Einzelstellung. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden.

clivorum 'Desdemona', 100 cm, VIII—IX. Prächtig orangefarbene Bl über dunkelpurpurnem Laub.

x hessel, 150—180 cm, VIII—IX. Lange, lichtgelbe, kolbenartige Blütenstände.

przewalskii, 100—150 cm, VII—VIII. In Erscheinung leichter und eleganter als alle anderen. Feingeschlitztes Laub und hellgelbe, schlanke Blütenkerzen.

Hemerocallis 'Green Eyed Giant'. Ähnliche bebanderte Sorten sind 'Marionette' und die dunkleren 'Wideyed' und 'Spectacular'.



Hemerocallis 'Burning Daylight' die Spitzensorte der orangefarbenen Taglilien. 'Azor', 'Aten' und 'Toro' sind glatter in der Substanz.



Hemerocallis 'Luxury Lace'. Eine liebenswerte lang- und reichblühende Sorte.

Hemerocallis 'Daafu'. In gleichem überraschendem Rosa ist die runde Sorte 'Neyron Rose'.



wilsoniana, bis 200 cm, VIII—IX. Große, rundliche Blätter und lange, goldgelbe Bl-ähren.

Limonium (Statice), Strandflieder, PLUMBAGINACEAE, ○, ✕. Schöne ledrige Blattrosetten und zarte, schleierkraut-ähnliche Bl-Stände.

N: Eryngium, Nepeta, Festuca.

latifolium, 60 cm, V—VI. Die kleinen, violetten Blüten bilden zarte Schleier, hübsch in Sträußen.

tataricum (incana), 30 cm, VII—IX. Bekannt durch die Verwendung in der Trockenbinderei, weiße, schirmartige Bl-Stände.

Linaria, Leinkraut, SCROPHULARIACEAE, 80 cm, VII—IX, ○, ✕.

purpurea 'Canon Want'. Mediterrane Staude mit hübschen graugrünen B und kleinen, löwenmäulchenartigen, rosa Blütenkerzen. Wertvoller Langblüher.

Linum, Lein, LINACEAE, ○, ▢.

Verwandt mit dem bekannten Flachs. Für durchlässige Böden in Steingärten und Rabatten.

△ **arboresum**, 25 cm, V—VII. Der immergrüne Strauch aus Kreta hat sich hier seit vielen Jahren als hart erwiesen, sollte aber wohl Winterschutz erhalten. Die hellgelben Bl sind sehr ähnlich dem Linum flavum und heben sich gut von dem auch im Winter wirkungsvollen grauen Laub ab.

△ **flavum**, 30 cm, VI—VIII. Goldflachs mit blaugrünen B und großen, gelben Bl.

N: Campanula carpatica, Scutellaria.

△ **narbonense**, 50 cm, VI—VIII. Blauer Lein, Dauerblüher. Täglich öffnen sich neue Bl in großer Fülle an zart verzweigten, überhängenden Stielen.

N: Sonnenröschen, weiße Karpatenglockenblume, Purpurgünsel, und zur Auflockerung in Rabatten zu gelben Iris und späten Tulpen.

Lithospermum, Steinsame, BORAGINACEAE, 30 cm, IV—VI

○—●, ▢.

purpureo caeruleum. Bl rötlich, später enzianblau, wuchernder Bodenbedecker im Schatten, auch unter Bäumen, wo er sich durch niederliegende, wurzelnde Triebe verbreitet. Für nicht zu schwere und nasse Böden.

N: Funkien, Digitalis, Bergenien.

Lobelia, Lobelie, CAMPANULACEAE, 60 cm, VII—IX, ○, ✕.

syphilitica. Lobelie mit ährigen Bl-Ständen. Die Bl haben verschiedene reinblaue Tönungen. Standort: humoser, feuchter Boden.

x vedariensis, 60 cm, VIII—IX. Purpur bis violette Bl. Schön zum Schnitt.

Lupinus, Lupine, LEGUMINOSAE, 80—120 cm, V—VII, ○—●, ✕

Lupinen gehören zu den am meisten verbreiteten Stauden. Sie wünschen tiefgründigen, nicht zu nassen, kalkfreien Boden. Am besten wirken sie in bunten Gruppen gepflanzt. Nach der Blüte zurückschneiden, worauf sie frisch austreiben.

Aus Samen vermehrte Sorten, bei denen Farbabweichungen vorkommen:

'Edelknabe', karminrote Farbtöne

'Kastellan', blaue Farbtöne mit weißer Fahne

'Kronleuchter', verschiedene gelbe Töne

'Mein Schloß', ziegelrot bis rote Töne

'Schloßfrau', rosa mit weißer Fahne

polyphyllus-Hybriden. Sämlinge in bunter Farbmischung, weniger kalkempfindlich.

— **Niedrige Auslese.** Etwas niedriger wachsende Lupinen in vielen Farben.

Lychnis, Lichtnelke, CARYOPHYLLACEAE, ○.

chalcadonica, 100 cm, VI—VII. Auch als „Brennende Liebe“ bekannte Pflanze. Auf straffen Stielen leuchtend rote Bl. Rabattenstaude für humose, nicht zu nasse Böden.

N: Salbei, Rittersporn, Margeriten, Goldgarben.

viscaria 'Plena', 40 cm, V—VII, ✕. Leuchtend karminrote Klebnelke.

Lysimachia, Felberich, Münzkraut, PRIMULACEAE, ○—●.

Pflanzen, die sich besonders für Naturgärten, aber auch für Rabatten eignen.

clethroides, 80 cm, VII—IX. Schneefelberich auf dessen weißen Bl-ähren sich gerne Schmetterlinge tummeln. Für nicht zu schwere, frische Böden.

N: Lythrum.

punctata, 90 cm, VI—VIII. Der Goldfelberich eignet sich gut zum Verwildern vor Gebüsch und an Bachläufen. Sternförmige, gelbe Bl an langen Rispen. Reizvolle Wildstaude, die etwas wuchert.

Lythrum, Weiderich, LYTHRACEAE, VII—IX, ○.

Schmucke, aufrechte Staude mit schlanken, rötlichen Bl-Rispen. Feuchte Böden (am Bachlauf) werden bevorzugt, aber sie wachsen auch im normalen Gartenboden. Die Bl werden gerne von Schmetterlingen besucht.

N: Iris sibirica, Gräser.

salicaria 'Feuerkerze', 80 cm, leuchtend rot

virgatum 'Rose Queen', 60 cm, zierlicher im Aufbau und unermüdlich blühend, rosa

— **'The Rocket'**, 120 cm, tiefes Rosa

Macleaya, Fiedermohn, PAPAVERACEAE, bis 300 cm, VII—VIII, ○—●.

cordata. Sehr dekorative Staude, die lange ungestört stehen will. Die ganze Pflanze ist bläulich bereift. Feigenartige B. Die kleinen, beigen Bl sitzen in Massen an den großen Rispen. Das Wachstum dämme man mit Dachpappstreifen ein, die senkrecht in die Erde um die Pflanze einzulassen sind. Herrlich vor Mauern oder Gehölzen.

Malva, Malve, MALVACEAE, 60 cm, VI—IX, ○.

moschata. Die Moschusmalve mit ihren rosa Bl ist ein Langblüher für Naturgärten und Rabatten. Nach der Bl zurückschneiden.

— **'Alba'**, weißblühende Form.

Mentha Minze, LABIATAE, 2 cm, ○—●, ☞.

△T **requienii.** Die Polsterminze mit ihren winzigen, flach dem Boden anliegenden B stammt aus Korsika. Reizendes Duftpolster.

Mimulus, Gauklerblume, SCROPHULARIACEAE, 20 cm, VI—IX, ○—●, ☞.

tigrinus 'Grandiflorus'. Große gelbe, rotgefleckte Trichterblüten in verschiedenen Schattierungen, die sich besonders für Teiche und Uferländer eignet.

Minuartia, Hainkraut, Miere, CARIOPHYLLACEAE, 10 cm,
VII—VIII, ○, ☐.

△ **T. laricifolia**. Die Granitmiere hat niederliegende Stengel mit nadelförmigen B und vielen weißen Bl. Für Steingärten und als Rasenersatz.
N: Karpatenglockenblumen.

Moltkia, Moltkie, BORAGINACEAE, 30 cm, VI—VIII, ○, ☐.

△ **suffruticosa**. Längliche, graugrüne B. Das Enzianblau der nickenden Bl ist viele Wochen eine Freude. Halbstrauch für trockene, geschützte Lagen.

Monarda, Indianernessel, LABIATAE, VI—VIII, ○—●, ✕.

Große Büsche bildende Staude, deren Bl in mehreren Quirlen übereinander an straffen Stielen sitzen. Die lebhaften, sommerlichen Farben bringen willkommene Abwechslung in die Staudenrabatte. Indianernesseln stellen keine besonderen Bodenansprüche. Sie breiten sich stark aus. Sehr haltbare Schnittblume.
N: Gräser, gelbe Taglilien, Rudbeckia Goldsturm, Rittersporn, Schleierkraut.

Hybride 'Adam', 100 cm, johannisbeerrot

- **'Cambridge Scarlet'**, 100 cm, scharlachrot
- **'Croftway Pink'**, 120 cm, lachsrosa
- **'Praeriebrand'**, 120 cm, tieflachsrot
- **'Praerienacht'**, 150 cm, purpurfarben
- **'Schneewittchen'**, 100 cm, weiß

Morina, Kardendistel, DIPSACACEAE, 80 cm, VII—VIII,
○, ☐, ✕.

longifolia. Die langen, dornigen B sind wintergrün und sehr dekorativ. Weiß-rosa Bl in Quirlen. Etwas Besonderes für trockene Stellen.

Myosotis, Vergißmeinnicht, BORRAGINACEAE, 30 cm, V—VIII,
○—●, ☐.

palustris 'Thüringen'. Das Sumpfvergissmeinnicht eignet sich für alle feuchten Gartenplätze, besonders für Teich- und Bachränder, hellblau.

Nepeta, Katzenminze, LABIATAE, 30 cm, V—IX, ○, ☐.

Wertvolle und vielseitig zu verwendende Staude. Nepeta verträgt viel Trockenheit, eignet sich also vorzüglich für trockene Hänge, Steingärten, auf Trockenmauern, Naturgärten und als Einfassung. Hübsch als Nachbarschaft von Rosen. Durch Rückschnitt nach der Bl folgt ein reich. Nachflor. Schmetterlingsmagnet.

△ **x faassenii**. Über graugrünem Laub lavendelblaue Lippenblüten.

Oenothera, Nachtkerze, ONAGRACEAE, ○.

In niedrigen und hohen Arten hervorragende Steingarten- und Rabattenstauden, deren große, gelbe Blütenschalen fast einen ganzen Sommer hindurch blühen.

△ **missouriensis**, 20 cm, V—X. Missourinachtkerze mit niederliegenden Trieben, und großen gelben Bl. Interessant sind die geflügelten Früchte. Über Mauern herunterhängen lassen. Wichtiger Sommer- und Herbstblüher für den Steingarten.

N: Blaue Gräser, niedrige Glockenblumen, Bleiwurz.

tetragona 'Fyrverkeri', 40 cm, V—IX, ☐. Die Knospen dieser Sorte sind rot und passen gut zu den goldgelben Bl.

N: Veronica incana, Campanula glomerata.

— **'Hohes Licht'**, 60 cm, V—IX, ☐. Höher werdende, reichblühende Sorte mit leuchtend gelben Bl.
N: Veronica Blauriesin, Scutellaria baicalensis.

Omphalodes, Gedenkemein, BORAGINACEAE, ○—●, ☐.

cappadocica, 20 cm, IV—VI. Das nicht wuchernde Gedenkemein bildet Büsche, bedeckt mit leuchtend blauen Vergißmeinnichtblüten.

△ **verna**, 15 cm, III—IV. Liebenswerter Schattengrüner, der auch noch in sehr dunkles Unterholz hineinwächst. Vergißmeinnichtblau.

N: Primeln, Frühlingswaldwicke, Elfenblume, Waldsteinie, Schaumblüte.

△ — '**Alba**', dieselbe mit reinweißen Bl.

Origanum, Dost, Heidegünsel, LABIATAE, ○, ☐.

△ **laevigatum**, 40 cm, VII—IX. Schmale, graublaue B und purpurrosa Bl an zierlichen Rispen.

△ **vulgare 'Compactum'**, 20 cm, VII—IX. Niedrige Form des Staudenmajorans, eignet sich sehr gut für trockene, sonnige Lagen in Stein- und Heidegärten. Aus den wintergrünen Polstern kommen lilarosa Bl-Stände, welche Schmetterlinge anlocken. Die ganz Pflanze duftet aromatisch.

N: Nepeta, Achillea.

Pachysandra, Ysander, BUXACEAE, 25 cm, IV—V, ●—●, ☐.

terminalis. Immergrüner Halbstrauch, der Ausläufer bildet und ein hervorragender Bodenbedecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter Bäumen ist. Verlangt humosen, frischen Boden und genügend Feuchtigkeit.

Paeonia, Pfingstrose RANUNCULACEAE, ○, ✕.

Die Edelpfingstrosen gehören zu den ältesten Kulturpflanzen und langlebigsten Stauden. Sie wollen im

Herbst gepflanzt werden und können dann ungestört viele Jahre stehen bleiben. Beim Pflanzen sollen die Augen höchstens 5 cm mit Erde bedeckt werden. Die gefüllten Sorten sind hervorragende Schnittstauden, die einfachen, mit den edlen Blütenschalen, noch viel zu wenig verwendete feine Gartenstauden. Beim Blumenschnitt lasse man wenigstens das untere Blatt stehen, und schneide die Bl knospig bis halboffen.

lactiflora (albiflora, chinensis), Edelpaeonien, 70—100 cm, V—VI. Zur besseren Übersicht teilen wir diese in einfache und gefüllt blühende Sorten.

f = früh-, m = mittel-, s = spätblühend.

Einfach blühende Sorten:

'**Dürer**', (D G & K 1910). Weiß in Büscheln blühend, m.

'**Hoffnung**' (D Steffen 1954). Scharfes Karminrosa, gelbe Staubfäden, glänzend hellgrünes Laub, sehr f.

'**Holbein**' (D G & K 1910). Hellseidenrosa mit gelben Staubbl., m.

'**Isani Gidui**' (Herkunft unbekannt). Sehr schöne japanische Sorte mit reinweißen, einfachen Bl, deren Staubgefäße gelblich-braun sind, m.

'**Kameno-Kegoromo**' „**Schildkrötengewand**“ (Herkunft unbekannt). Standfeste, niedrige, rosenrote Sorte mit gelben Staubfäden, s.

'**Kasane-Jishi**' „**Doppelter Löwe**“ (Herkunft unbekannt) Das Weiß ist rosa angehaucht. Breite bebänderte, lichtgelbe Staubblätter, s.

'**Meigetsuko**' (Japan ?) „**Mondstrahl**“, lilarosa mit gelben Staubblättern, s.

'**Murillo**' (D G & K 1910). Zartrosa, f.

'**O-Scho-Kun**', (Japan ?). Kräftig rosa mit hellgelben Staubgefäßen, s.

'**Petite Renée**' (F Dessert 1899). Knospe dunkler rosa im Erblühen heller werdend, bebänderte Staubfäden, s.

'Schwindt' (D G & K 1910). Karminrosa, gelbe Staubblätter, f.

'Thoma' (D G & K). Lilarosa, f.

'Whitleyi Major' (Herkunft unbekannt). Getönte, weiße Blüten in Büscheln, f.

Gefüllt blühende Sorten:

'Avalanche' (F Crousse 1886). Elfenbeinweiß, m—s.

'Better Times' (USA Franklin 1941). Kräftig karminrot. Die gefüllten Bl sind von flacher Form und zeigen gelbe Staubfäden. Standfest. Gute Garten- und Schnittsorte, m.

'Birket Foster' (GB Kelway 1909). Leuchtend Rot, m.

'Bunker Hill' (USA Hollis 1906). Kirschrote Bl mit goldenen Staubfäden. Standfest, s.

'Chocolate Soldier' (USA Auten 1939). Schwarzrot, einzelne gelbe Staubfäden sichtbar. Teils halb und teils ganz gefüllte Blumen, f.

'Dresden Pink' (USA Wild 1957). Schönes, richtiges Rosa mit seidigem Silberglanz. Ausgezeichnete standfeste Sorte, s.

'Festiva Maxima' (F Miellez 1851). Große, reinweiße Bl an langen Stielen, die durch einige rote Flecken belebt werden. Ausgezeichnete Schnittsorte, duftend, f.

'Florence Nicholls' (USA Nicholls 1938). Die schön geformten Bl sind zart fleischfarben in weiß übergehend. Haltbar und standfest, m.

'Fokker' (NL Ruys 1928). Niedrige, scharf karminrote bis violette Sorte von gutem Gartenwert. Flach gefüllt, s.

'General Bertrand', (F Guérin 1846). Rot gefüllt, m.

'Gene Wild' (USA Cooper 1956). Locker gefüllte Bl, die babyrosa, im Aufblühen beinahe weiß, sind und einige rote Streifen haben, standfest, m.

'Germaine Bigot' (F Dessert 1902). Zartfleischfarben, m.

'Guidon' (USA Nicholls 1941). Eine gute, standfeste und niedrige Gartensorte mit rosenrosa Bl, s.

'Highlight' (USA Wild 1952). Sehr schönes, dunkles warmes Rot, niedrig, standfest, m.

'Karl Rosenfield' (USA Rosenfield 1908). Dichtgefüllte, dunkelrote Bl. Hochbewertete Sorte, m.

'Königswinter' (D G & K 1912). Höhere, lachsrosa Sorte, gut zum Schnitt, s.

'Lady Anna', (F Calot 1856). Großblumig, seidig rosa, m.

'La Perle' (F Crousse 1886). Altrosa mit lila Schimmer, duftend, s.

'La Tulipe' (F Calot 1872). Zartes Fleischrosa, gute Schnittsorte, f—m.

'Lovell Thomas' (USA Rosenfield 1934). Halbgefüllt, dunkles Karminrot. Das schöne Laub fällt auf. Eine ausgezeichnete Sorte, m.

'Mme. Duce' (F Mechin 1880). Zart altrosa, m.

'Mme. Emile Debatène' (F Dessert-Doriat 1927). Lachsrosa, Rosentyp, m.

'Mme. Emile Gallé', (F Crousse 1881). Zartlilarosa mit rahmgelber Füllung, s.

'Mme. de Verneville' (F Crousse 1885). Creme m. fleischfarbenem Hauch, wundervoller Duft, f.

'Marquis C. Lagergren' (F Dessert 1911). Kirschrot mit violetter Schein, m.

'Miss Eckardt' (? 1928). Richtiges Rosa, hohe Stiele, s.

'Modeste Guérin' (F Guérin 1845). Lebhaft rosakarmin, Rosenduft, f.

'Mons. Charles Levêque' (F Calot 1861). Das Lachsrosa wird in der Tiefe der Bl dunkler. Hohe, leicht überhängende aber feste Stiele, Schnittsorte, m.

'Mons. Jules Elie' (F Crousse 1888). Lilärösa mit silbrigem Schein, f.

'Mrs. Edward Harding', (USA Shaylor 1918). Großblumig weiß mit vielen goldenen Staubfäden unter den Blütenblättern, starke Stiele, m.

'Neomie Demay' (F Calot 1867). Zartfleischfarben, f.

'Nick Shaylor' (USA Allison 1931). Gelblich und lachs getöntes Rosa mit gelegentlichen roten Flecken, schöne Form. Bewährte Sorte, s.

'Philomèle' (F Calot 1861). Schale frischrosa, Füllung chamois, duftend, m.

'Primevère' (F Lemoine 1907). Anemonenblütig, gelblich-weiß, f.

'Red Charm' (USA Glasscock 1944). Unter den neuen Kreuzungen mit officinalis sind viele ungefüllte und nur wenig gefüllte Sorten. Diese hat dicht gefüllte Bl in Bombenform von leuchtend warmroter Farbe an straffen, niedrigen Stielen. Eine der frühesten und vielgerühmten Sorten. Die riesigen Einzelblumen halten sehr lange.

'Red Giant' (USA Glasscock 1939). Hellkarminrote Bl v. kugelige Form, hohe Schnittsorte, m.

'Sarah Bernhardt', (F Lemoine 1906). Rosenrosa mit silbrigem Schein, hochbewertete Sorte, s.

'Solfatare' (F Calot 1861). Milchweiß mit schwefelgelber Füllung, f.

'The Mighty Mo' (USA Wild 1950). Samtiges, dunkles Rot und dazwischen goldgelbe Staubfäden. Eine sehr hohe, sehr eindrucksvolle Sorte, f.

'Walter Faxon' (USA Richardson 1904). Babyrosa zur Mitte hin dunkler, m.

officinalis 'Rubra Plena', 60 cm, V. bekannte Bauernpfingstrose mit roten, gefüllten Bl. 14 Tage vor den Edelpfingstrosen blühend.

— **'Rosea Plena'**, wie obige, aber rosa gefüllte Bl.

— **var. mollis**, 50 cm. Sehr früh blühende Art mit graugrünen B und rosa Schalenbl., deren Mitte dunkler ist.

peregrina 'Otto Froebel', 60 cm, V. Die einfachen, lackroten Bl sind sehr auffallend.

— **'Sunshine'**, ungefüllt, tieflachsorange.

suffruticosa, bis 120 cm, IV—V. Die aus China stammende Strauchpaeonie hat sehr große, gefüllte oder einfache Bl mit gelben Staubgefäßen. Die Farben sind verschiedene rosa und rote Tönungen und Weiß. Die Pflanzen werden mit Ballen geliefert und beim Pflanzen ist darauf zu achten, daß die Veredlungsstelle mindestens 5 cm in die Erde kommt.

tenuifolia, 50 cm, IV—V. Besondere und reizvolle Paeonia mit feingefiederten B. Jeder Stengel bringt eine einfache, rote Bl mit gelben Staubgefäßen. Die Ausläufer bildende Art eignet sich auch für große Steingärten.

— **'Plena'**. Gefüllte, blutrote Bl.

Papaver, Mohn, PAPAVERACEAE, ○, ✕.

Der Mohn hat so viele Varianten in Höhe und Farbe, daß jeder eine Sorte für seinen Garten findet. Die lebhaften Farben sind unersetzlich! Die Bl werden geschnitten, wenn die Knospe aufgeplatzt.

△ **nudicaule 'Kardinal'**, 30 cm, V—VIII, ☹. Leuchtend rote Bl.

△ — **'Kelmscott Riesen'**, 40 cm, V—VIII, ☹. Bunte Farbenmischung mit großen Bl an festen Stielen.

orientale, V—VII. Der bekannte Türkenmohn ist der König der Gartenmohne. An den Boden stellt er keine besonderen Ansprüche, nur verträgt er keine stauende Nässe. Nach der Blüte zieht er ein, um im Herbst neu auszutreiben. Trotz der kurzen Blütezeit ist der Rie-

senmohn ein Höhepunkt unter den früh blühenden Stauden. Auch als Schnittblume ist er haltbar, wenn die Knospe beim Aufplatzen geschnitten wird.

N: Anchusa, Delphinium, Iris sibirica und hohe Bartiris in passenden Farben, Margariten und weiße u. blaue Lupinen.

- **'Beauty of Livermere'**. Scharlachrote Bl mit gewellten Rändern. Aus Samen gezogen.
- **'Bonfire'**, 80 cm. Eine sehr auffallende Züchtung von Mrs. Fischer, USA, mit riesigen, scharlachroten Bl mit schwarzen Flecken am Grund.
- **'Feuerriese'**, 80 cm. Ziegelrote Bl auf sehr straffen Stielen.
- **'Mary Finan'**. Leuchtend scharlachrote Neuzüchtung aus USA. Die Bl-Blätter sind stark gefranst, wodurch eine neuartige Wirkung bei den Riesenblüten entsteht.
- **'Raspberry Queen'**, 70 cm. Auch eine amerikanische Züchtung in ganz ungewöhnlicher Farbe. Stumpfes Mahagonirot. Sehr große, edle Bl auf straffen Stielen, sollte leicht beschattet stehen um nicht zu verblassen, da die Einzelblüte mehrere Tage hält.
- **'Sturmfackel'**, 50 cm, feuerrote Bl auf straffen Stielen
- **'Wunderkind'**, 80 cm, karminrosa, eine Farbe, die zu vielen Farben paßt.

Hybride 'Curtis Fischer Strain', 60—80 cm. In verschiedenen Lachsfarben zum Teil mit roten u. schwarzen Flecken. Mit ausdrücklicher Erlaubnis von Mrs. Fischer, möchte ich dieses Jahr vier ausgewählte Sämlinge unter Namen herausgeben. Sie wurden aus vielen hundert ausgelesen und sind seitdem mehrere Jahre beobachtet und vegetativ vermehrt worden. Alle sind absolut standfest und die Bl von schöner, gewellter Form und fester Substanz.

- **'Catharina'**, 80—90 cm. Kräftiges Lachsrosa, innen schwarze Flecken. **Eigene Neuzüchtung 1970.**

- **'Corinna'**, 70 cm. Schönes Lachsrosa mit leuchtend roten Flecken, wodurch die Sorte eine besondere Note bekommt. **Eigene Neuzüchtung 1970.**

- **'Frührot'**, 80 cm. Ein sehr besonderes leuchtendes Rot, schwarze Flecken. Durch die frühe Blütezeit wertvoll. **Eigene Neuzüchtung 1970.**

Paronychia, Mauermiere, CARIOPHYLLACEAE, 3 cm, V—VII, ○, □.

Niedrige, rasenbildende Pflanze, welche sich als Bodendecker zum Übergrünen von Steinen und Böschungen eignet. Wollen sonnige Lage und durchlässigen Boden. Die silbrigen Bl-Köpfe sind eine Zierde.

△ **kapela**, blaugrüne, etwas höhere Art.

△ **serpyllifolia**. Dunkelgrüne Mauermiere, welche sich im Herbst oft rotbraun färbt. Man lasse aus den Polstern Blumenzwiebeln herausblühen.

Peltiphyllum, Schildblatt, SAXIFRAGACEAE, 80 cm, IV—V, ○—●.

peltatum. Große, schildförmige B. Die rosa Bl-Dolden von ca. 30 cm Durchmesser erscheinen vor den B. Sehr dekorative Staude für absonnige Lagen, die Feuchtigkeit liebt.

Penstemon, Bartfaden, SCROPHULARIACEAE, ○, ✕.

Sommerblüher m. verschiedenen Blütenfarben. Hübsch und lange blühend.

barbatus 'Praecox Nanus', 50 cm, VII—IX. Die schlanken Bl-Rispen tragen Rachenbl. in roter, rosa oder violetter Farbe.

△ **hirsutus 'Pygmaeus'**, 30 cm, IV—VII. Harter Bartfaden mit weißlich-lila Bl, schönes Winterlaub.

- x hybridus 'Andenken an Hahn'**, 60 cm, VI—IX, ☐. Lanzettliche B, große, scharlachrote Bl, verlangt Winterschutz oder in rauen Gegenden wie Dahlien überwintern.
- **'Zürblau'**, 50 cm, V—VII, ☐. Leuchtend enzianblaue Bl.

Perowskia, Perowskie, LABIATAE, 150 cm, VII—IX, ○, ☐.

abrotanoides. Halbstrauch mit graugrünen, aromatisch duftenden B und lavendelblauen Bl in langen, verzweigten Ähren. Für durchlässige Böden in vollsonniger Lage. Das Rückfrieren im Winter schadet nicht. Gute Nachbarschaftspflanze für viele Stauden und auch Rosen.

Phlomis, Goldquirl, LABIATAE, 120 cm, VI—VII, ○.

samia. Stattliche Staude mit behaarten B. Die gelben Lippenbl. sitzen in mehreren Quirlen übereinander. Die Pflanze sieht aus, wie eine große Taubnessel.

Phlox, Flammenblume, POLEMONIACEAE, ○.

Alle Phlox sind unersetzlich für jeden Garten durch ihre Blütenfülle und flammenden Farben.

Niedrige Arten:

- △ **'amoena'**, 15 cm, V—VI, ☐. Hübsche dunkel-karminrosa Bl.
- △ **'divaricata'**, 40 cm, V—VI, ☐. Reizender Frühlingsphlox mit lila Bl. In der Heimat wächst er in lichten Laubwäldern, er eignet sich also auch für Halbschatten. Hübsch in Frühlingssträußchen.

subulata, IV—V. Alle Teppichphloxe bilden im Steingarten und auf Trockenmauern schöne blütenübersäte Polster.

N: Zwergiris, Steinrich, Blaukissen, Schleifenblume. Alle ☐.

- △ — **'Atropurpurea'**, 10 cm, kräftig rosa Teppichphlox

- △ — **'Brightness'**, 10 cm, lachsrosa
- △ — **'G. F. Wilson'**, 15 cm, stark wachsend, wasserblau
- △ — **'Lindental'**, 10 cm, sehr wüchsige, rosa Sorte.
- △ — **'Schneeteppich'**, 10 cm. Weiße Sternchenblüten.
- △ — **'Temiscaming'**, 10 cm, purpurrot

Höhere Arten: Je nach Sorte VI—IX, ☐.

f = früh-, m = mittel-, s = spätblühend, A = Auge.


Sie dürfen mit ihrem großen Farbenspiel in keinem Garten fehlen. Die Blütezeit einer Sorte läßt sich verlängern, wenn ein Drittel der jungen Triebe im Juni gestutzt wird. Phlox hat gern nahrhaften, tiefgründigen und durchlässigen Boden.

N: Rittersporn, Sonnenbraut, Sonnenhut, Gräser.



paniculata 'Aida', 80 cm, amarantröt, f—m

- **'Bornimer Nachsommer'**, 90 cm, warm lachsrosa, s
- **'Dorffreude'**, 120 cm, rosalila mit rotem A, s
- **'Düsterlohe'**, 80—100 cm. Dunkel Rotviolett, wüchsige **Neuzüchtung** von Karl Foerster, f—m.
- **'Fesselballon'**, 100 cm, hellrosa mit dunklem A, f—m
- **'Frau A. von Mauthner'**, 70 cm, lachsrot m. rotem A, m
- **'Füllhorn'**, 100 cm. Leuchtend rosa, lange blühende **Neuheit** von Karl Foerster, f.
- **'Furioso'**, 100 cm, auffallend lilarot, kräft. Farbe, m
- **'Graf Zeppelin'**, 80 cm, schneeweiß m. kirschrot. A, m
- **'Jubal'**, 100 cm, warmrosa, f
- **'Kirchenfürst'**, 80 cm, setzt die Bl von Aida fort in ähnlicher Farbe, sehr auffallend m
- **'Kirmesländler'**, 120 cm, weiß mit rotem A, späteste Sorte, lang blühend
- **'Landhochzeit'**, 100 cm, frisches, warmes Rosa mit rotem A, m



- 'Le Mahdi', 70 cm, violettblau, m—s
- 'Orange', 80 cm, leuchtend orangerot, ungewöhnliche Farbe, m—s
- 'Pastorale', 90 cm, schönes Rosa, m—s
- 'Pax', 90 cm, reinweiß, s
- 'Schneehase', 60 cm, schneeweiß, s
- 'Silberlachs', 100 cm, rosiges Lila, m
- 'Sommerfreude', 80 cm. Sehr große, rosenrote Dolden, m—s.
- 'Sommerkleid', 90 cm, weiß mit rotem A, m
- 'Spätrot', 90 cm, scharlachrot, s
- 'Starfire', 90 cm, leuchtend rot m
- 'Sternhimmel', 80 cm, hellviolett, weißes A, m
- 'Violetta Gloriosa', 120 cm, lilaweiß, sehr wüchsig, s
- 'Wilhelm Kesselring', 80 cm, violett mit weißem A, f
- 'Württembergia', 70 cm, reines karminrosa, sehr verbreitet, f

Phygellus, Phygellus, SCROPHULARIACEAE, 90 cm, VII—IX, .

capensis. Südafrikanischer Halbstrauch, welcher am Ende seiner Stengel ca. 35 cm lange Rispen mit korallenroten Rachenblüten trägt. Im Weinbauklima winterhart, sonst Winterschutz nötig. Auch als Kübelpflanze sehr hübsch.

Physalis, Lampionblume, SOLANACEAE, bis 100 cm, VIII—IX, (Früchte), , .

franchettii. Japanische Lampionblume, beliebt wegen der im Herbst erscheinenden orangeroten Fruchthüllen, die sich auch gut für Trockensträuße eignen. Wuchert stark, daher an entsprechende Plätze pflanzen.


Physostegia, Gelenkblume, LABIATAE, VII—IX, , .

Die Blütenähren sind dicht zusammengesetzte Lippenblüten und erinnern von ferne an große Erica. Sie nehmen erste Nachtfröste nicht übel und sind begehrte, äußerst haltbare Schnittblumen. Die einzelnen Bl lassen sich nach rechts und links bewegen, als hätten sie Gelenke.

N: Wollziest, Gräser, Aster amellus.

virginiana 'Bouquet Rose', 70 cm, violettrosa



- 'Summer Snow', 90 cm, schneeweiß, frühblühend
- 'Summer Spire', 120 cm, violettrot
- 'Vivid', 60 cm, violettrosa

Platycodon, Ballonblume, CAMPANULACEAE, VII—IX, .

Ein Glockenblumengewächs mit bläulichgrünen B und großen, flachen Glocken. Die Knospen sind ballonartig aufgeblasen. Für durchlässigen Boden in Rabatten. Treibt spät aus, daher Pflanzstelle markieren. N: Potentilla recta 'Warrensii', Gypsophila 'Rosen-schleier'.

grandiflorum 'Album', 60 cm, weiße Glocken

- 'Mariesii', 60 cm, blaue Glocken.
- 'Perlmutteruschale', 60 cm, perlmutterrosa

Polemonium, Jakobsleiter, POLEMONIACEAE, , .

Diese Pflanzen mit ihren gefiederten B und meist bläulichen Bl wollen nicht zu trocken stehen. Etwa alle vier Jahre umpflanzen.

△ **reptans 'Blue Pearl'**, 30 cm, IV—V. Reizende, frühblühende hellblaue Sorte.

- x **richardsonii**, 40 cm, IV—V und VIII—IX, himmelblaue Bl
- 'Album', das gleiche in Weiß.

Polygonatum, Salomonssiegel, LILIACEAE, 60 cm, V—VI, ①—●
multiflorum, weiße Bl-Glocken an überhängenden Stielen.
Hübsche Staude für Schattenplätze.

Polygonum, Knöterich, POLYGONACEAE, ○—①, ⑦.

- △ **affine 'Superbum'**, 25 cm, V—IX. Ausgezeichneter Bodenbedecker für nicht zu trockene Lagen. Aus dem frischgrünen Blätterteppich erscheinen viele Lampenputzer, die im Aufblühen rosa, verblüht rot sind. Laubfärbung im Herbst.

N: Kleingräser, Polsterglockenblumen.

bistorta 'Superbum', 80 cm, V—VII. Der heimische Wiesenknöterich in nicht wuchernder Form. Seine Bl-Ähren eignen sich gut zum Schnitt. Für Naturgärten.

N: Iris sibirica, Campanula sarmatica.

Potentilla, Fingerkraut, ROSACEAE, ○, ⑦.

Stauden mit erdbeerartigen, gefiederten B, von denen die niedrigen für Steingärten, die höheren für Rabatten geeignet sind. Lange Blütezeit. Alle lieben volle Sonne und durchlässigen Boden.

- △ **argentea var. calabra**, 15 cm, V—VIII. 5—7teilige, silbergraue B und gelbe Bl. Sehr brauchbar und hübsch.

atrosanguinea 'Gibsons Scarlet', 40 cm, VI—VII. Dauerblühendes Scharlachfingerkraut.

N: Ballonglocken.

- △ **x hybrida 'Star of the North'**, 50 cm, VI—IX, halbgefüllte, leuchtend rote, große Bl innen gelb, sehr auffallend.
— — **'Wm. Rollison'**, 50 cm, VI—VIII, halbgefüllt, dunkelorange mit gelber Mitte

- △ **megalantha**, 20 cm, IV—VII. Behaarte Blätter und große, gelbe Schalenblüten.

nepalensis 'Miss Willmott', 40 cm, VI—IX. Lange blühendes Fingerkraut mit kirschrosa, dunkelgeäugten Bl.

— **'Roxana'**, 40 cm, VI—IX. Orangerosa mit rotem Auge.

recta 'Warrensi', 40 cm, VI—VIII. Kanariengelb blühendes Fingerkraut, lange blühend für Rabatten.

N: Platycodon, Salvia Ostfriesland.

- △ **x tonguei hort.**, 10 cm, VII—VIII. Diese Hybride hat aprikosenfarbige Bl mit rotem Auge.

- △ **vena 'Nana'**, 5 cm, IV—VI. Lange blühendes europäisches Fingerkraut, welches gute Polster bildet und ein sehr brauchbarer Bodenbedecker ist.

N: Iberis saxatilis, Sedum album 'Murale'.

Primula, Primel, PRIMULACEAE, ①—●.

Einige Primeln mit ihrem reichen Farbenspiel gehören zu den ersten Frühlingsboten. Es gibt auch sehr schöne sommerblühende Arten, deren Blütezeit sich bis in den August erstreckt. Wir haben sie nach der Wuchsform eingeteilt.

Kissenprimeln blühen in milden Wintern schon ab II. Sie verlangen humosen, frischen Boden und wollen über Sommer absonnig stehen.

- △ **acaulis**, 10 cm, ab II—IV. Beliebteste Frühlingsprimeln. In Farbmischung.

- △ — **in Einzelfarben**, wie rot, gelb, weiß, blau.

- △ **x pruhoniciana 'Mrs. Ferguson'**, 10 cm, III—IV. Purpurrot mit metallisch glänzendem, dunklem Laub.

Doldenprimeln: Aus einer Blattrosette erhebt sich ein Stengel mit einer vielblütigen Dolde.

Elatior-Hybride, 25 cm, IV—V, %. Doldenprimeln in verschiedenen Farben.

— — **blau**, verschiedene blaue Farbtöne

— — **rot**, rote Farben

— — **'Vierländer'**, goldgelb, duftend

— — **'Pacific Strain'**, 30 cm, %. Riesenblumige Dolden auf festen Stielen in neuen, unglaublichen Farben.

- △ **x pubescens**, 20 cm, IV—V, ○. Gartenaurikeln sind auf vielen alten Blumenbildern zu finden. Ihre gedeckten Farben sind auch heute noch sehr beliebt. Aurikeln vertragen volle Sonne.

rosea 'Grandiflora', 20 cm, III—IV. Die Rosenprimel hat leuchtend karminrosa Blüten und will sehr feuchten, humosen Boden. (An Wasserläufe pflanzen).

sieboldii, 30 cm, IV—V, ✕. Große, lilarosa Bl mit weißer Mitte. Das Laub verschwindet im Sommer, darum sollte sie neben Farne oder Epimedium gepflanzt werden.

Kugelprimeln oder **Ballprimeln** haben kugelige Bl-Stände.

- △ **denticulata 'Alba'**, 20—30 cm, III—IV, ✕. Herrliche, weißblühende Form der Kugelprimel

- △ — **'Rubin'**, karminrot-violette Töne

- △ — **'Grandiflora Hybriden'**, lilarosa und violette Töne

Etagenprimeln haben, wie der Name sagt, ihre Bl in mehreren Etagen übereinander. Sie eignen sich besonders für halbschattige Plätze zu Rhododendron, Farnen, Carex.

x bullesiana, 60—80 cm, VI—VII. Hybriden in orange, lachs oder karmin.

japonica, 60 cm, V—VI. Japanische Etagenprimel mit purpurroten Bl.

Glockenprimeln haben glockige, nickende Bl auf langen Stielen. Sie wachsen am schönsten an sehr feuchten Stellen im tiefen Schatten.

florindae, 80 cm, VI—VIII, ✕. Wundervolle Primel mit herzförmigen B und duftenden, hellgelben Bl.

Prunella, Braunelle, LABIATAE, 20 cm, VI—IX, ○, ☐.

Reich und lang blühende Bodenbedeckungspflanze für

jeden normalen Gartenboden. Lippenblütler mit dichten Blütenköpfen.

N: Karpatenglockenblume, Zwergalant, Rosenschleierkraut.

- △ **grandiflora 'Alba'**, reinweiß

- △ — **'Loveliness'**, lila

- △ **x webbiana**, veilchenblau

- △ — **'Rosea'**, karminrosa

Pulmonaria, Lungenkraut, BORAGINACEAE, III—IV, ○—●.

Unverwüsthche Vorfrühlingsstaude für Halbschatten.

N: Primeln, Epimedium, Waldsteinia.

angustifolia 'Azurea', 25 cm, leuchtend enzianblaue Bl
rubra, 30 cm, korallenrote Bl

saccharata 'Mrs. Moon', 30 cm, besonders schönes silbergeflecktes Laub, blau-rote Bl.

Ramonda, Felsenteller, GESNERIACEAE, 10 cm, VI—VII, ○, ☐.

△T **myconi**, dunkelgrüne, flache B-Rosetten. Bl violett, seltene Fugenpflanze für absonnige Stellen.

Ranunculus, Hahnenfuß, RANUNCULACEAE, 60 cm, V—VI, ○—●, ✕, ☐.

acris 'Multiplex'. Gefüllte Form unseres heimischen Wiesenhahnenfußes, der nicht wuchert. Reizende, dicht gefüllte Blütchen. Will nicht zu trockenen Standort.
N: Blaue Akeleien und Tradescantia, Iris sibirica.

Rheum, Zierrhabarber, POLYGONACEAE, V—VII, ○—●.

palmatum 'Tanguticum'. Sehr dekorative Pflanze. Die großen B sind tief eingeschnitten, die roten Bl-Stände werden bis zu 200 cm hoch.

Rodgersia, Schaublatt, SAXIFRAGACEAE, 100 cm, VI—VIII,



Sehr wirkungsvolle Pflanzen, auffällig durch ihre grossen, je nach Art verschieden gestalteten B und Bl-Stände. Volle Wirkung erst nach einigen Jahren. Verlangen humusreichen, kräftigen Boden und keinen zu trockenen Standort.

N: Farne, Waldglocke, Schattengräser, Silberkerzen.

aesculifolia, Roßkastanienblättern ähnlich, lockere weiße Blütenstände.

podophylla, 150 cm, VI—VII. Große, handförmige B mit tief eingesägten Rändern, broncefarbener Austrieb. Überhängende, gelblich-weiße Bl-Rispen.

purdomii, 100 cm, VI—VII. Die sechs- bis siebenteiligen B werden bis 75 cm im Durchmesser. Reinweiße, lockere Bl-Stände.

sambucifolia, 100 cm, VI—VII. Die holunderblättrige Rodgersie hat reinweiße Blütenstände und unterscheidet sich in der Blattform wesentlich von den anderen.

tabularis. Tafelblatt-Rodgersie, deren mächtige runde B einen Durchmesser bis zu einem halben Meter erreichen. Darüber zierliche weiße Blütenrispen.

Rosularia (Umbilicus), Dickröschen, CRASSULACEAE, 10 cm,



△T **pallida**, 15 cm, VI—VII. Die B sind dicht behaart, Bl rahmweiß in Trogdolden.

△T **persica**. Sempervivumartige, dickblättrige Rosetten mit roten Spitzen. Hübsch an sonnigen Stellen im Steingarten.

Rudbeckia, Sonnenhut, COMPOSITAE, ○, ✕.

Alle Rudbeckien sind sehr wirkungsvolle, meist gelbblühende Rabattenstauden für volle Sonne. Gute Schnittblumen.

fulgida 'Goldsturm', 60 cm, VI—IX. Eine der wichtigsten Sommerstauden mit langer Blütezeit. Goldgelbe Margaritenblüten mit schwarzem Knopf.

laciniata 'Goldkugel', 130—150 cm, VII—IX. Die aufrechte und standfeste neue Sorte mit gefüllten, goldgelben Blüten, macht die ältere, höhere Sorte 'Goldball' entbehrlich.

— **'Goldquelle'**, 80 cm, VII—IX. Gefüllte, heller gelbe Bl auf standfesten Stielen.

maxima, 200 cm, VIII—IX. Blaugrüne B und große, gelbe Bl mit schwarzem Knopf für feuchte Standorte. Dekorativ!

nitida 'Herbstsonne', 200 cm, VII—IX. Bildet Riesenbüsche gelber Bl mit grünem Knopf.

— **'Juligold'**, 200 cm, VI—VIII, früher blühende Schwester-sorte.

purpurea 'Abendsonne', 70 cm, VI—IX. Eigenartig schöne, karminrote Bl, bei denen die orangebraune Mitte einen auffallenden Kontrast bildet.

— **Hybriden**, 100 cm, VII—IX, karminrosa bis rot.

subtomentosa, 130 cm, VIII—IX, gelbe Margaritenblüten mit brauner Mitte, haltbar als Schnittblume.

Salvia, Salbei, LABIATAE, ○.

Salbei lieben kalkhaltigen Boden, sind aber sonst anspruchslos. Bei rechtzeitigem Rückschnitt blühen sie unermüdlich weiter.

△ **officinalis 'Purpurascens'**, 50 cm, VII—VIII. Gartenform mit rötlichpurpurnen B, lila Bl. Herrliche Laubwirkung das ganze Jahr.

△ — **'Tricolor'**, B dreifarbig graugrün-gelblich und rosa

△ — **'Variegatis'**, gelbgrün gefleckte B

nemorosa 'Mainacht', 40 cm, V—X. Nachtblaue Bl an reichverzweigten Blütenähren, unermüdlicher Dauerblüher.

pratensis 'Mittsommer', 100 cm, VI—VII, ☼, ☞. Schöne Verbesserung unseres Wiesensalbei. Himmelblaue Lippenbl. in langen Trauben. Zweiter Flor im Herbst.

— **'Ostfriesland'**, 50 cm, VII—IX. Wertvollster Salbei, vielseitig zu verwendender Farbfleck in tiefem Violett-blau. Für Rabatten, Heide- und Naturgärten.
N: Rudbeckia 'Goldsturm', Coreopsis, Oenothera, niedrige Helenium.

Santolina, Heiligenkraut, COMPOSITAE, VII—VIII, ☉, ☞.

Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeergebiet für geschützte Lagen. Wirkungsvoll durch die zierliche Belaubung. Ein Rückschnitt von Zeit zu Zeit lohnt sich. Auch als Einfassung zu verwenden, da sie sich wie eine kleine Hecke schneiden lassen.

△ **chamaecyparissus**, 30 cm, silbergraue B und gelbe Bl-Köpfchen.

△ **serratifolia**, 40 cm, ebenfalls silbergraue B, aber viel zarter gefiedert, Bl gelb.

△ **virens**. Satt grüne B und hellgelbe Bl-Köpfchen.

Saponaria, Seifenkraut, CARYOPHYLLACEAE, ☉, ☞.

△ **ocymoides**, 20 cm, V—VI. Teppichseifenkraut mit rosa Bl, bildet große Polster ohne zu wuchern, sehr schön für Steingärten und Trockenmauern.

N: Iberis, lila Polsterphlox, Veronica latifolia.

△T **x olivana**, 5 cm, VI—VII. Feste Polster auf denen die ca. 2 cm großen Bl sitzen. Sehr wertvolle Polsterstaude.

Saxifraga, Steinbrech, SAXIFRAGACEAE, ☞.

Die Familie der Saxifragen ist eine der größten im Pflanzenreich. Ihre Ansprüche und ihr Aussehen ist dementsprechend verschieden.

△T **aizoon 'Atropurpurea'**, 20 cm, V—VI, ☉. Rosettensteinbrech, dessen B zum Teil rot gerandet sind und mit rosa Bl. Wintergrün.

△T — **'Crustata'**, 15 cm, V—VI, ☉. Kleine, runde Rosetten mit weiß gepunkteten Blatträndern, weiße Bl. Liebt wie alle der aizoon-Gruppe vollsonnige Lage und kalkhaltigen Boden. Eine Zierde das ganze Jahr über

△T — **'Minor'**, 15 cm, V—VI, ☉. Sehr kleine dichte Rosetten, weiße Bl.

△ **x arendsii 'Farbenkissen'**, ☉—●, rot, frühblühend.

△ — **'Findling'**, 10 cm, V—VI, ☉—●. Moossteinbrech, welches gute Polster bildet mit kleinen, weißen Bl. Verträgt keine anhaltende Trockenheit.

△ — **'Schneeteppich'**, ☉—●, schneeweiße Bl.

cortusifolia var. fortunei, 30 cm, IX—X, ☉—●. Herbststeinbrech mit großen, bräunlichen, unterseits rötlichen B. Viele weiße Bl in Rispen für humosen Boden in halbschattiger Lage. Überraschende Wirkung unter Gehölzen mit Herbstfärbung.

cotyledon, 50 cm, VI, ☉. Bis 12 cm breite, flache Rosetten, die absonnig gepflanzt sein wollen. Aus ihnen erheben sich reichverzweigte, weißblühende Rispen.

△ **lingulata**, 35 cm, VI, ☉. Ein Steinbrech für trockene, helle Plätze zwischen Steinen. Weiße Bl in Rispen.

△ **umbrosa**, 30 cm, V—VI, ☉—●. Porzellanblümchen für schattige Plätze. Aus großen, dunkelgrünen B-Rosetten, die auch im Winter hübsch sind, erscheinen Rispen mit zartrosa Blütchen.

△ — **'Aureopunctata'**. Gelb punktierte B, rosa Bl

△T — **'Elliots Variety'**, 20 cm. Kleinere Rosetten und kräftig rosa Blütenchen.

Scabiosa, Skabiose, DIPSACACEAE, 80 cm, VI—X, ○, ✕.

Die edlen Schalenblüten sind eine der schönsten Schnittblumen, aber auch im Garten bringt die Skabiose immer wieder neue Blüten, in milden Jahren bis in den November.

N: Hohe Goldgarben, Gräser, Mädchenauge, Prachtscharte.

- **'Blauer Atlas'**, etwas gedrungener wachsende dunkelblaue Sorte. Sehr gute Neueinführung.
- **'Clive Greaves'**, hellblau
- **'Miss Willmott'**, rahmweiß
- **'Nachtfalter'**, 80 cm, an straffen Stielen dunkelviolet- te Bl.

Scutellaria, Helmkraut, LABIATAE, ○, ▮.

Anspruchslose Sommerblüher mit schönen stahlblauen Lippenblüten.

baicalensis, 60 cm, VI—IX. Vielseitig zu verwendende Wildstaude, die immer ordentlich aussieht. Bienen- pflanze.

N: Gypsophila, Coreopsis verticillata.

△ **scordifolia**, 20 cm, V—VIII. Hübscher Sommerblüher für den Steingarten.

N: Hypericum polyphyllum, Inula ensifolia, niedrige Gypsophila, Tunica saxifraga.

Sedum, Fetthenne, CRASSULACEAE, ○, ▮.

Sie sind durch ihre vielgestaltigen Blattformen und Farben hübsche, wirkungsvolle Bodenbedecker, die sehr viel Trockenheit und steinige, magere Böden ver-

tragen. Gut als Rasenersatz, zu Einfassungen und Grabbepflanzungen. Die höheren Arten haben schöne Bl und sind auch als Rabattenpflanzen geeignet.

△ **acre**, 5 cm, VI—VII. Der bekannte, goldgelbe Mauerpfeffer.

△ **album 'Coral Carpet'**, 5 cm, VI—VII. Im Sommer grün, im Herbst und Winter korallenrote B, weiße Bl. Guter Bodenbedecker.

△ — **micranthum 'Chloroticum'**, 5 cm, V. Hellgrün, dicht- rasig, weiß blühend.

△ **anacampseros**, Walzensedum, 10—15 cm, VII—VIII. B rund blaugrün, Bl purpur.

△T **cauticolum**, 10 cm, VIII—IX. B schieferblau mit rötlichem Rand, Bl karminrot.

△ — **'Robustum'**, 20—25 cm, VIII—IX. In allen Teilen größer und starkwüchsiger als die Art. Sehr wirkungsvoll. N: Festuca glauca, Aster dumosus.

△T **ewersii**, 15 cm, VIII—IX. Große B an holzigen Trieben, ro- sa Bl.

△ **floriferum 'Weihenstephaner Gold'**, 15 cm, VII—VIII. Grü- ne B, leuchtend gelbe Bl, guter Bodenbedecker.

△ **hybr. 'Immergrünchen'**, 15 cm, VII—VIII. Ähnlich Sedum spurium, aber immergrün, gelbe Bl.

△ **kamtschaticum 'Variegatum'**, 15—20 cm, VI—VII. Weißbun- te B, gelbe Bl.

△ **middendorffianum 'Diffusum'**, 20 cm, VII—VIII. B lineal

△T **sieboldii**, 15—20 cm. B blaugrün, rosa Bl. Wird als „Ok- toberle“ vielfach in Töpfen auch als Ampelpflanze gezogen.

- △ **spectabile 'Carmen'**, 40 cm, VIII—IX. Große, dunkelrosa Blütendolden auch an ungünstigen, trockenen Stellen dankbar.
N: graue Gräser, Aster amellus.

- △ **spurium 'Album Superbum'**, 15 cm, VI—VII. Bester, sattgrüner Bodenbedecker mit wenig weißen Bl.

- △ — **'Purpurteppich'**. B und Bl dunkelpurpurrot.

- △ — **'Schorbuser Blut'**. B bräunlich grün, Bl rot.

telephium 'Herbstfreude', 50 cm, IX—X. Große, flache Bl-Dolden von rosa bis braunrot, die auch verblüht den ganzen Winter gut aussehen. Daher nicht abschneiden.

N: Ceratostigma, blaue Aster dumosus.

Sempervivum, Dach-, Haus- oder Steinwurz, CRASSULACEAE, VI—VII, ○, ▢, T.

Sempervivum = immerlebenslang, besagt, daß die Pflanze äußerst genügsam ist. In vielen Dörfern sieht man sie auf Dächern und Mauern. Sie vertragen viel Trockenheit. Es gibt kleinrosettige von Pfenniggröße und welche von der Größe eines Tellers. Ebenso verschieden sind die Farben, die sich auch in jedem Boden und zu jeder Jahreszeit ändern. Alle sind geeignet für Steingärten, Mauerfugen, Grabbepflanzungen und Troggärten.

N: Sedum, Zwergglockenblumen, kleine Veronica. Festuca glauca, Zwergiris.

- △ **arachnoideum**. Spinnwebdachwurz mit übersponnenen Silberrosetten. Bl karminrot.
- △ — **'Alpha'**. Mittelgroß, bräunlich rot, weiß übersponnen, Bl rosa.
- △ — **'Beta'**. Braunrot mit silberner Behaarung, Bl dunkelrosa

- △ — **'Gamma'**. Mittelgroß, tiefbraune Rosetten, silbern behaart, Bl rosa

- △ — **'Granat'**. Mittelgroß, dunkelrote Rosetten, silberne Spitzen, Bl karminrosa

- △ — **'Rauhreif'**. Mittelgroß, purpurbraun, weiß übersponnen, Bl rosa

- △ — **'Rheinkiesel'**. Sehr kleinrosettig, braun und besonders stark silbrig übersponnen, Bl rosa.

- △ **blandum 'Rubrifolium'**. Mittelgroß, braun innen grün, rosa Bl

- △ **borisii**, besonders lang behaarte Art mit kurzen Ausläufern und von ballartiger Form.

- △ **flavipilum**. Sehr kleine, grüne Rosetten, außen braun, rosa Bl.

- △ **metallicum 'Giganteum'**. Große Rosetten, metallisches Braunrot, Bl rosa.

- △ **ornatum 'Mahagony'**. Große, rotbraune Rosetten, dunkelrosa Bl.

- △ **pseudofunkii**. Kleine, grüne Rosetten mit roten Spitzen.

- △ **schottii**. Mittelgroße, grüne Rosetten, hellbraune Spitzen. Bl rosa.

- △ **soboliferum**. Rosetten kugelig, hellgrün mit hellbraunem Fleck, Bl grünlichgelb.

- △ **tectorum 'Atrovioleaceum'**. Große, dunkelgrüne Rosetten mit braunen Spitzen, Bl rot.

- △ — **'Glaucum'**. Hellgrüne Rosetten mit blaugrauem Schimmer, Bl rosa.

- △ — **Hybride 'Commander Hay'**, besonders schön geformte, große Rosetten, grün und braun.

- △ — — **'Monstrosum'**. Riesenhauswurz bis 25 cm Durchmesser, Bl-Höhe 30 cm, dunkelrosa.

- △ — — **'Nocturno'**, mittelgroße, schwarzgrüne Rosetten.

- △ — — **'Othello'**. Große, tiefdunkelrote Rosetten, prächtig.
- △ — — **'Rubin'**. Mittelgroße, auffallend rote Rosetten, Bl lachsrot
- △ — — **'Smaragd'**. Braune Rosetten mit grünen Spitzen, Bl rosa
- △ — — **'Topaz'**. Bräunlich-olivgrün, mittelgroß, Bl dunkelrosa
- △ — — **'Triste'**. Große, graubraune Rosetten, Bl dunkelrosa

Silene, Leimkraut, CARYOPHYLLACEAE, ○, ☐.

Wertvoller und anspruchsloser Sommerblüher für den Steingarten.

- △T **acaulis**, 2 cm, VI. Das Gebirgisleimkraut will leichten Boden und nicht zu trockenen Standort. Es bildet ganz feste grüne Polster, auf denen einzelne rosa Blüten sitzen.
- △ **maritima** **'Weißkehlchen'**, 20 cm, VI—VIII. Über graugrünem Polster weiße Bl (Taubenkröpfchen).
N: braune Sempervivum, Sedum 'Purpurteppich', Helmkraut.
- △ **schafta** **'Splendens'**, 10 cm, VIII—IX. Grüne Polster und tiefrosa Bl.
N: Zwergalant, Bleikraut.

Sisyrinchium, Binsenlilie, IRIDACEAE, 20 cm, V—VII. ○, ☐.

- △T **angustifolium (anceps)**. Irisähnliche, kleine Pflanze mit grasartiger Belaubung u. violettblaue Sternblüten. Für sonnige Steingartenplätze.
- △T **brachypus (californicum)**, 15 cm, V—VI. Reizende goldgelbe Bl. Lange Blütezeit. **Neueinführung!**

Solidago, Goldrute, COMPOSITAE, ○, ✕.

N: Herbstastern, braune Helenium, Chrysanthemum.

caesia, 60 cm, VIII—IX. An den drahtartigen, dunklen Stielen sitzen viele, goldgelbe Bl. Gaziöser strauchartiger Wuchs, nicht wuchernd.

Hybride 'Goldenmosa', 70 cm, IX. Spitzkegelige Bl-Rispen mit großen, goldgelben Bl, die an Mimosen erinnern und gelblichen B.

- **'Golden Shower'**, 60 cm, VIII—IX. Früher blühende Sorte mit großen, breiten, goldgelben Bl-Rispen.
- **'Goldwedel'**, 60 cm, VI—VIII. Hellere Gelb, frühblühende Neuheit mit langer Blütezeit.
- **'Strahlenkrone'**, 60 cm, VII—VIII. Die goldgelben Bl bilden flache Blütenbüsche, straffer Wuchs.

Stachys, Ziest, LABIATAE, ○.

grandiflora 'Superba', 60 cm, V—VI, ✕. Wie eine riesige Taubnessel aussehende Pflanze mit purpurrosa Bl. Wünscht humusreichen, frischen Boden. Für sonnige und halbschattige Lagen.

N: Gräser, Campanula.

△ **lanata**, 30 cm, VI—VII. Wollziest. Die B haben dichte, grau-filzige Behaarung, deshalb auch der deutsche Name Esels- oder Hasenohren. Bodenbedecker für durchlässige, trockene Lagen, Bl unscheinbar.

N: Pechnelke.


Stokesia, Kornblumenaster, COMPOSITAE, 40 cm, VIII—IX, ○, ☐.

laevis, lilablau bis 8 cm große asterähnliche Bl.



Iris '**Fuchsjagd**'. Eine zuverlässige wüchsige, braune Iris.


Iris '**Granada Gold**' hat sich sehr bewährt.





Iris **'One Desire'**. Die meisten anderen Sorten sind mehr lachsrosa.

Iris **'Eleanors Pride'**. Eine der wundervollen hellblauen Iris. Andere gute Sorten sind: 'Lady Ilse', 'Cross Country' und 'Himmlisches Blau'.



Tellima, falsche Alraunwurzel, SAXIFRAGACEAE, 40 cm, V—VI, ○—●, ☐.

grandiflora. B rund herzförmig, unscheinbare, grünliche Bl in rot übergehend. Anspruchslose Staude mit ganzjährig hübschem Laub zur Unterpflanzung von Gehölzen und im Schatten.

Teucrium, Gamander, LABIATAE, 30 cm, VII—IX, ○, ✕.

△ **chamaedrys**. Zwergstrauch mit glänzend grünen B und rosalila Bl. Für sonnige, nicht zu feuchte Lagen im Stein-, Heide- oder Gräsergarten. Läßt sich auch als Einfassung verwenden und als Heckchen schneiden.

Thalictrum, Wiesenraute, RANUNCULACEAE, ○—●, ✕.

Stauden, welche nicht nur durch Bl schmücken, sondern auch sehr zierende, mehrfach gefiederte B haben.

aquilegifolium, 100 cm, V—VI. Akeleiblättrige Wiesenraute. Die Bl sind lila oder hellpurpur in großen Trugdolden.

N: Gräser, Akelei, Taglilien, Trollblumen, Iris sibirica.

— **'Album'**, dasselbe in Weiß.

△ **dipterocarpum**, 120 cm, VII—IX. Akeleiähnliche B und rosalila Bl an großen Rispen. Sehr schöne Pflanzen für etwas feuchten Standort und sauren Boden.

glaucum, 200 cm, VI—VII. Blaugestreifte Stengel und B, die schön gefiedert sind. Schwefelgelbe Bl

minus 'Adiantifolium', 40 cm, V. Zierlich gefiederte B, reizend zum Schnitt. Bl unscheinbar.

Thymus, Thymian, LABIATAE, ○, ☐.

Thymian ist eine sehr sonnenliebende Staude. Die niedrigen bilden schöne Polster, aus denen man viele andere Pflanzen herauswachsen lassen kann. Be-

sonders geeignet für Stein- und Heidegärten und zwischen Trittplatten und Treppenfugen. Die höheren Sorten bilden immergrüne, kleine Büsche.

N: Sedum, Sempervivum, Zwergglockenblumen, Teppichnelken.

△ **x citriodorus 'Golden Dwarf'**, 15 cm, VI—VII. Sehr schöne, gelbgrüne Polster, die Bl sind nicht bedeutend, weißlila. Sehr robust.

△T — **'Silver Queen'**, 25 cm. Jedes Blatt ist elfenbeinweiß gerandet. Bildet reizend kleine Büsche. Wundervoller Zitronenduft.

△ **hirsutus var. doerfleri 'Bressingham Seedling'**, 8 cm, V—VI. Bildet üppige, niedrige, hellgrüne Polster mit rosa Bl.

△ **nitidus**, 30 cm, spitze graue B, straffe aufrechte kleine Büsche.

△ **pseudolanuginosus**, 5 cm, V—VII. Kaum blühend, aber die grauhaarigen Polster sind besonders schön und ordentlich

△ **rotundifolius 'Purpurteppich'**, 8 cm, VII—VIII. Die runden B sind größer als bei serpyllum. Bl purpurrot.

△ **serpyllum 'Albus'**, 5 cm, VII. Weißblühende Form unseres heimischen Thymians

△ — **'Coccineus'**, Teppichthymian mit roten Bl und rötlichem Laub

△ — **'Pink Chintz'**. Reizende, rosa blühende Sorte.

Tiarella, Schaumblüte, SAXIFRAGACEAE, ○—●, ☐.

△ **cordifolia**, 20 cm, IV—V. Schöner, unentbehrlicher Bodenbedecker für lichten Schatten. Als Waldpflanze liebt sie lockeren Humusboden und bildet dort üppige Teppiche mit zierlichen, cremeweißen Blütenkerzen. Schöne Laubfärbung im Winter.

N: andere Frühlingswaldstauden wie Primula, Lungenkraut, Gedenkmeine und Carex.

△ **wherryi**, 30 cm, VI—VII. Hellgrüne B, die hübsch braun gezeichnet sind, Rahmweiße Blüten.

Tradescantia, Dreimasterblume, COMMELINACEAE, 40 cm, VI—VIII, ○—●, ✕.

Robuste Staude für frischen Boden und feuchte Lagen. Hübsch in Rabatten und an Rändern von Wasserbecken. Bei Rückschnitt Nachflor durch den ganzen Sommer.

N: Taglilien, Blutweiderich, Iris sibirica, Trollius.

x andersoniana (virginiana)' Blue Stone', mittelblau

— **'Gisela'**, reinweiß

— **J. C. Weguelin'**, hellblau

— **'Karminglut'**, Bl schönes leuchtendes Rot

— **'Leonore'**, Bl tiefviolett

Tricyrtis, Krötenlilie, LILIACEAE, 50 cm, VIII—IX, ○—●, ☞

hirta, interessante Pflanze mit weißlichlila, purpurgefleckten Bl in den B-Achsen. Verlangt anmoorigen Waldboden. Gleicht einer kleinen Orchidee.

Trollius, Trollblume, RANUNCULACEAE, ○—●, ✕.

Beliebte Blumen, die zum guten Gedeihen viel Humus und feuchten Standort wünschen. Besonders geeignet für Teich- und Bachränder, aber auch für Rabatten.

N: Thalictrum, Pulmonaria, Brunnera, Dicentra, Iris sibirica.

chinensis 'Golden Queen', 100 cm, VI—VII. Orange Schalenblüten mit aufrechten Staubblättern.

europaeus 'Superbus', 70 cm, V—VI, hellgelbe Kugelblüten.

x cultorum 'Goldquelle', 70 cm, gelborange Bl

— **'Orange Globe'**, 90 cm, orange Bl.

Tunica, Felsennelke, CARYOPHYLLACEAE, 20 cm, VI—IX, ○, ☞

△ **saxifraga 'Rosette'**. Sehr reich und lange blühende, schleimkrautähnliche Staude für durchlässige Böden. Geöffnete, rosa Bl. Besonders reizend!

Verbascum, Königskerze, SCROPHULARIACEAE, ○.

Aus großen Blattrosetten erheben sich dekorative Bl-Stände. Für jeden, nicht zu feuchten Boden. Schön für Naturgärten. Bei den Zweijährigen lasse man Samen ausfallen.

N: Salvia, hohe Veronica, Eryngium, Avena.

bombyciferum (lagurus hort.), 170 cm, VII—VIII. Dicht silberwollige B, große, schwefelgelbe Bl an kandelaberartigen, weißfilzigen Stielen. Sehr dekorativ im Garten und in Sträußen. Zweijährig.

x hybridum 'Pink Domino', 100 cm, V—VI. Lilarosa Bl-Kerzen, ausdauernd.

nigrum, 100 cm, VI—VII. Verzweigte Bl. Rispen, hellgelb, zweijährig.

olympicum, bis 200 cm, VI—VII. Sehr dekorativ, riesiger verzweigter Blütenstand mit gelben Bl.

Veronica, Ehrenpreis, SCROPHULARIACEAE, ○.

Der Ehrenpreis bringt die blaue Farbe für sonnige Gartenplätze von Mai bis Juni in verschiedenen Arten und Sorten.

△ **cinerea**, 12 cm, V—VI, ☞. Silberteppichveronica mit grau-behaarten B und blauen Bl. Für trockene, sonnige Plätze.

N: Sedum 'Purpurteppich'.

△ **cuneifolia**, 10 cm, VI—VII, ☞. Flach am Boden liegende Triebe, weißblaue Bl. Schön zum Überwachsen von Steinen.

△ **fruticans**, 15 cm, V—VI, ☞. Kleiner, immergrüner Ehrenpreis, dessen dunkelblaue Bl einen roten Fleck haben. Für durchlässigen Humusboden und Sonne bis Halbschatten.

△ **incana**, 30 cm, VI—VIII, ☞. Grausilbrige B und dunkelblaue Bl-Kerzen. Gute Unterpflanzung auch für größere Flächen.

longifolia 'Blauriesin', 80 cm, VII—VIII. Lange, blaue Bl-Rispen, sehr wüchsig.

- △ **prostrata (rupestris hort.)**, 10 cm, V—VI, ☐. Kriechend, leuchtend blau.
- △ — **'Alba'**, 10 cm, ☐, dieselbe in Schneeweiß
- △ — **'Rosea'**, 10 cm, ☐, mit rosa Bl
- △ — **'Spode Blue'**, 10 cm, ☐. Hübsche, englische Sorte mit hellblauen Bl.
- △ **repens**, 5 cm, IV—V, ☐. Reizendes, dunkelgrünes Polster mit weißen Blütchen.
- △ **spicata 'Erika'**, 30 cm, dunkelrosa
- △ — **'Nana'**, 15 cm, leuchtendblau.
- △ **teucrium 'Crater Lake Blue'**, 30 cm, V—VI, ☐. Leuchtend enzianblaue Bl.
N: *Oenothera 'Fyrverkeri'*, niedrige Schafgarben.
- **'Royal Blue'**, 40 cm, ☐. Etwas höhere Sorte in leuchtendem Blau.

Vinca, Immergrün, APOCYNACEAE, ○—●, ☐.
Bewährter Bodenbedecker auch für tiefen Schatten.

major, 40 cm, VI—VII. Großblättrig, stark wachsend, grosse, blaue Bl.

- △ **minor**, 15 cm, IV—VI. Bekanntes Immergrün mit blauen Bl.
- △ — **'Alba'**, dasselbe mit reinweißen Bl.
- △ — **'Bowles Variety'**, 15 cm, IV—VI. Großblumig, tief Blau
- △ — **'Rubra'**, dasselbe mit rotviolettten Bl

Viola, Veilchen, VIOLACEAE, ✕.

- △ **cornuta 'G. Wermig'**, 15 cm, V—VIII, ○—●, ☐. Lange blühendes Hornveilchen für Steingarten und als Einfassung. Veilchenblaue Bl.

△ — **'Lord Nelson'**, dasselbe in Violettröt.

△ **odorata**, Duftveilchen, III—IV und IX, ○—●.

△ — **'Irish Elegance'**, aparte cremegelbe Bl.

△ — **'Königin Charlotte'**, Duftveilchen, das im Herbst remontiert.

△ — **'Red Charm'**, Bl purpurrot.

△ — **'Triumph'**, große langgestielte blaue Bl.

△ **papilionacea**, 20 cm, V—VI, ○—●, ☐. Pfingstveilchen. B langgestielt nierenförmig. Bl dunkelviolet.

△ — **'Immaculata'**, großblumig weiß.

△ **striata**, 15 cm, IV—V, ○—●. Runde B, weiße Bl mit blauen Adern in der Mitte. Reizendes, duftloses Veilchen für ungünstige Schattenstellen.

Waldsteinia, Waldsteinie, ROSACEAE, ○—●, ☐.

Guter Bodenbedecker für Halbschatten und unter Gehölzen.

△ **geoides**, 25 cm, III—V. Leuchtend gelbe Bl über 3—5 gezähnten B, nicht wuchernd.

△ **ternata (sibirica, trifoliata)**, 10 cm, III—V. Bildet durch kriechende Ausläufer schöne Teppiche, wintergrün, gelbe Bl.

Yucca, Palmilie, LILIACEAE, ○, ☐.

Sehr wirkungsvolle Stauden mit großen, grünlich-weißen Bl-Glocken an hohen Schäften. Verlangt trockenen, sonnigen Standort.

filamentosa, 150 cm, VII—IX. Breitlanceolliche B am Rande faserig, große, weiße Bl-Glocken.

glauca, bis 200 cm, VIII—IX. B schmal graugrün mit weissem Rand. Härteste Art.

Alle Pflanzen werden mit Namen geliefert

- A Polster- und Rasenersatzstauden
- B Steingartenpflanzen, reichhaltige Auswahl
- C Besonderheiten für den Steingarten
- D Halbhohe Stauden
- E Schnittstauden
- F Schnitt- und Rabattenstauden
- G Schnitt- und Rabattenstauden, beste Sorten
- H Halbschatten- und Schattenstauden
- I Bodenbedecker für Halbschatten und Schatten
- K Pflanzen für Teichrand und am Wasserbecken
- L Pflanzen für Schalen und Töpfe

Wer das beste Staudensortiment und allerhand Sträucher und Rosen in schöner Pflanzung sehen will, sollte den Vergleichsgarten der Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Weißenstephan bei Freising besuchen. Er ist lehrreich und schön zugleich und für jeden, auch den Nichtgärtner beglückend.

Winterharte Ziergräser

Die Staudengräser der Gärten kommen aus allen Erdteilen. Durch ihr ganz verschiedenes Wachstum vom kleinsten Blauschwingel bis zum 3,5 m hohen Chinaschilf, geben sie jedem Garten neue Ausdrucksmöglichkeiten. Die Blatt- und Blütenstände wirken durch ihre Linie, manche auch durch ihre Herbstfärbung über viele Monate. Gerade im winterlichen Garten mit Rahreiß oder Schnee geben sie eine besondere Note. In Natur- und Heidegärten sind sie die unentbehrlichen Begleitpflanzen und aus der modernen Binderei sind sie nicht mehr wegzudenken.

Arrhenaterum, Glatthafer, GRAMINACEAE, 50 cm, VII—VIII, ○.

bulbosum 'Variegatum'. Hübsch, weißbunt gestreift, merkwürdig korkenzieherartige Wurzelverdickungen.

Arundo, Pfahlrohr, GRAMINACEAE, 300 cm, ○.

donax. Blätter lanzettlich graugrün an dicken Rohren. Bildet imposante Büsche, die besonders am Wasser sehr dekorativ wirken. Winterschutz erforderlich.

Avena, Blaustahlhafer, GRAMINACEAE, 50 cm, VI, ○, ☞.

sempervirens. Feines, aufrechtes, blaugraues Gras.

Bouteloua, Moskitogras, GRAMINACEAE, 30 cm, VII—IX, ☞, ✕, ○.

△ **gracilis (oligostachya)**. Überhängende, schmale B, braunbehaarte, waagr. absteh. Ähren, wie kleine Fischchen.

Briza, Zittergras, GRAMINACEAE, 40 cm, V—VI, ○—●, ✕, ☞.

media. Zierliche, herzförmige Ähren.

Calamagrostis, Reitgras, GRAMINACEAE, 120 cm, VII—VIII, ○, ✕.

x acutiflora 'Karl Foerster'. Breites, grünes Gras, steife Ähren, im Gegensatz zur Art nicht wuchernd.

Carex, Segge, CYPERACEAE

grayi, Morgensternsegge, ○—●, ✕, 75 cm, VI—VIII. Auf fallende morgensternähnliche Fruchtstände, auch für Trockensträuße geeignet. Verträgt sowohl sumpfigen wie trockenen Standort.

montana, Bergsegge, 20 cm, II—IV, ○. Dichte, überhängende Grasschöpfe mit schöner Herbstfärbung.

morrowii 'Variegata', Japansegge, ●—●, ☞, 40 cm, IV—VI. Frisch grünes Gras mit gelbem Rand. Wintergrüne Horste für Bodenbedeckung unter Gehölzen sehr dankbar.

muskingumensis, Palmedelsegge, 70 cm, VII—VIII, ○, ☞. Die Stengel sind bis an die Spitze schmal lanzettlich beblättert und erinnern an Palmwedel.

pendula, Riesen- oder Pendelsegge, ●, ✕, 100 cm, VI—VII. Immergrüne, überhängende Blattbüsche mit herabhängenden Blütenähren, für feuchte Lagen.

plantaginea, Breitblattsegge, 40 cm, V—VI, ●—●, ☐. B breit, frisch grün.

Cortaderia, Pampasgras, GRAMINACEAE, 200 cm, IX—X, ○, ✕, ☐.

selloana. Elegante, überhängende B und riesige Silberwedel von großer Schönheit. Verlangt guten Winterschutz und als Steppengras trockenen Standort. Pflanzung nur im Frühjahr.

Deschampsia (Aira), Waldschmiele, GRAMINACEAE, 50 cm, VI—VII, ○, ✕.

caespitosa. Dunkelgrüne Blattbüsche, gelbliche Ähren, auch zum Trocknen.

Elymus, Blaustrandhafer, GRAMINACEAE, 80 cm, V—VI, ○, ✕, ☐.

arenarius (glaucus hort.). Schönes, großes, blaugraues Ziergras, das wuchert. Auffallend gelbe Ähren.

Festuca, Schwingel, GRAMINACEAE

Die meisten Festuca sind wintergrün und eignen sich besonders zur Auflockerung großflächiger Pflanzungen. Hübsch auch als Gruppenpflanzungen in Rabatten.

△ **amethystina**, Regenbogenschwingel, 30 cm, V—VI, ○, ☐. Überhängend mit sehr feinen, blaugrauen B für Heidegärten.

△ — **'Aprilgrün'**, 20 cm, ○, ☐. B frisch graugrün, früh austreibend.

△ **glauca**, Blauschwingel, 20 cm, VII, ○, ☐. Viel verwendetes blaugraues Gras von guter Dauerwirkung.

△ **punctoria**, 10 cm, VI—VII, ○, ☐. Ganz harte, graue Igelpolster.

△ **scoparia (crinum ursi)**, Bärenfellschwingel, 15 cm, ●—●, ☐. Dichte, grüne Igelpolster.

△ **tenuifolia**, 15 cm, ○, ☐. Feiner Schwingel mit weit überhängenden, hellgrünen B.

△ **vallesiaca 'Glaucantha'**. 15 cm, VI—VII, ○, ☐. Zwergblauschwingel.

Glyceria, Süßgras, GRAMINACEAE, 70 cm, VII—VIII, ○, ✕, ☐.

maxima (aquatica) 'Variegata'. Schilfartig gelb-weiß und rosa gestreift, stark wuchernd.

Hystrix, Flaschenbürstengras, GRAMINACEAE, 60 cm, VI—VII, ○—●, ✕, ☐.

patula. Schilfartige B, weißbehaarte, besonders hübsche, lockere Ähren.

Koeleria, Schillergras, GRAMINACEAE, 20 cm, ○, ☐.

△ **glauca (gracilis)**. Kleine, graugrüne Igel.
N: Thymian, Dianthus petraeus, Erica, Sedum.

Lasiagrostis (Achnatherum), Silberährengras, GRAMINACEAE,

splendens, Zottengras. B schilfartig, straff aufrecht, auffallend gegrannte Ähren.

Luzula, Hainsimse, Marbel, JUNCACEAE, ●—●, ☐.
am Rande stark behaart, weiße Doldenrispen.

nivea, Schneemarbel, 40—60 cm, VI—VII. Immergrüne B

sylvatica, Waldmarbel, 25—40 cm, V—VII. B wintergrün, lang bewimpert, bräunliche Blütenstände.

— **'Marginata'**, wie die Art, aber mit gelb-weißem Rand. mit schönen, silbrigen Ähren, schmale B, Wertzeugnis.

- **'Tauernpaß'**, 15 cm. Wertvoller Findling aus den Tauern, der sich durch breites Laub und niedrigen Wuchs auszeichnet.

Melica, Perlgras, GRAMINACEAE, 60 cm, V—VI, ○—●, ✕, ☐.

- ciliata**, Wimperperlgras. B. graugrün, zylindrische, weißlichgelbe Ähren. Wächst auf trockenen Böden und eignet sich sehr gut als Zwischenpflanzung zu Bartiris.

Miscanthus, Chinaschilf, GRAMINACEAE, ○, ✕, ☐.

- japonicus 'Giganteus'**, Riesenchinaschilf, bis 350 cm, IX—X. Schilfartige, überhängende B, seidig kupferfarbene B-Fahnen. Blüht nur in günstigen Lagen.

- sinensis 'Gracillimus'**, 150 cm, IX—X. Überhängende, sehr schmale B, die sehr dekorativ wirken, nicht wuchernd.

- **'Silberfeder'**, 200 cm, VIII—IX. Sicher blühende Sorte mit schönen, silbrigen Ähren, schmale B.

- **strictus**, 150 cm, IX—X. Die gelblich quergestreiften B sind von straffem, aufrechtem Wuchs.

Molinia, Pfeifengras, GRAMINACEAE, ○—●, ✕, ☐.

- altissima**, 150 cm, VIII—IX. Herrlich durch die goldene Herbstfärbung. Schmale, abstehende Rispen.

- coerulea 'Variegata'**, 50 cm, VIII—X. B weißbunt, Ähren auf drahtigen Stielen.

Panicum, Hirse, GRAMINACEAE, ○, ✕, ☐.

- virgatum**, 120 cm, VIII—IX. Graziöse Blütenstände, hübsch in Sträußen.

Pennisetum, Federborstengras, GRAMINACEAE, ○, ✕.

- compressum**, 80 cm, IX—X. Lampenputzerähnliche, rotbraune Bl-Ähren. Wirkt auch im Winter mit Rauhereif hübsch, daher erst im Frühjahr abschneiden.

- **'Hameln'**, 60 cm, niedrigere und früher blühende Neuheit!

Phyllostachys, Bambusgras, GRAMINACEAE, bis 600 cm, ○.

- bambusoides**. Dieser Bambus stammt aus China und wird dort bis zu 20 m hoch. Sollte in rauen Gegenden Winterschutz bekommen.

Sasa, Zwergbambus, GRAMINACEAE, 40 cm, ○—●.

- pumila**, lanzettliche, hellgrüne B. Reizende Zwergform.

Sesleria, Kopfgras, GRAMINACEAE, 25 cm, V—VII, ○, ☐.

- △ **caerulea**. Lineal bläulich bereifte B, bläuliche Ähren.

Sinarundinaria, Chinarohrgras, GRAMINACEAE, bis 30 cm,

○—●.

- nitida**. B zierlich an bambusartigen, harten Stengeln. Verträgt Trockenheit und ist absolut hart. Sehr hübsche Wirkung auch im Winter.

Spartina, Goldleistengras, GRAMINACEAE, 150 cm, VIII—IX,

○, ✕, ☐.

- michauxiana 'Aureomarginata'**. Weit überhängende, gelberänderte B, braune Ähren.

Stipa, Federgras, GRAMINACEAE, ○, ✕, ☐.

- barbata**, 80 cm, VII—VIII. Die Blütengrannen des Reiherfedergrases sind besonders lang und malerisch. Verlangt leichten Boden.

- capillata**, 80 cm, VII—VIII. Schmale, aufrechte Haarrispe.

- gigantea**, Pyrenäenfedergras, mit riesigen Bl-Rispen. Kann bis 180 cm hoch werden, sehr schön!

- pennata**, 60 cm, VI—VII. Sehr bewegte, federartige Grannen, die auch zum Schnitt schön sind. Für leichte, kalkhaltige Böden.

Uliola, Plattährengras, GRAMINACEAE, 80—120 cm, IX—X,

○—●, ✕, ☐.

- latifolia**. Dunkelgrün, plattgedrückte, braune Ähren in großen, überhängenden Rispen, sehr hübsch.

Winterharte Farne

Die meisten Farne sind Waldpflanzen und wollen als solche einen humosen, feuchten Boden und schattigen Standort. Es empfiehlt sich, den Boden mit Düngetorf, Lauberde und Holzstückchen zu mischen. Farne wollen viele Jahre ungestört stehen. Mit den entsprechenden Nachbarn wie Aruncus, Cimicifuga, Aquilegia, Digitalis und Hosta wird man stimmungsvolle Gartenecken schaffen. Die größeren Farne sind auch schön, wenn sie von Epimedium, Waldsteinia, Asarum, Primeln oder Tiarella umgeben sind. Immer ist ihre vielseitige Form ein reizvoller Partner für andere Pflanzen.

Adiantum, Venushaar, POLYPODIACEAE, ①—●, ✕.

pedatum, 50 cm. An drahtigen Stielen waagerechte, handförmige, feingefiederte Wedel. Einer der elegantesten und feinsten Farne.

venustum, 20—30 cm. Ahnelt dem Glashausadiantum und ist bei leichtem Winterschutz vollkommen hart. Die zarten Wedel sind sogar weitgehend wintergrün.

Athyrium, Frauenfarn, POLYPODIACEAE, 70 cm, ①—●, ☞.

filix-femina. Zwei- bis dreifach gefiederte Wedel. Anspruchlos.

Blechnum, Rippenfarn, POLYPODIACEAE, 30 cm, ①—●, ☞.

spicant. Einfach gefiedert, lederartige, immergrüne, kleine Wedel. Liebt sauren Boden.

Dryopteris, Wurmfarn, POLYPODIACEAE, ①—●.

filix-mas, 100 cm. Anspruchsloser, heimischer Farn mit meist doppelt gefiederten, großen Wedeln.

borreri, Goldschuppenfarn, 100 cm. Tiefgrüne, weitgehend wintergrüne Wedel. Sehr schöner Schildfarn.

erythrosora, Rotschleierfarn. Wedel doppelt gefiedert dunkelgrün an langem rotbraunem Stiel. Die Sporenbehälter sind vor der Reife hellrot. Wunderschöne **Neuaufnahme**.

Matteucia, Becherfarn, POLYPODIACEAE, 80 cm, ①—●.

struthiopteris. Die hellgrünen Wedel sind auffallend trichterförmig angeordnet.

Onoclea, Perlarn, POLYPODIACEAE, 40 cm, ①—●

sensibilis. Die hellgrünen Wedel sind breit und doppelt gefiedert.

Osmunda, Königsfarn, OSMUNDACEAE, 120 cm, ①—●.

regalis. Breite, hellgrüne Wedel, doppelt gefiedert. Bevorzugt sauren Boden mit viel Feuchtigkeit.

Phyllitis, Hirschzunge, POLYPODIACEAE, ①—●, ☞.

scolopendrium, 20—30 cm. Wedel ungefiedert, lederartig immergrün, breitlanzettlich.

— '**Crispum**' (**Undulatum**), 20—30 cm. Wie die Art, aber mit gewellten Rändern.

— '**Marginatum**', 25 cm. Sehr schmale, lederartige, dunkelgrüne Wedel, deren Ränder fein gekräuselt sind.

Polypodium, Tüpfelfarn, POLYPODIACEAE, 20 cm, ●.

vulgare. Tief gefiederte, immergrüne Wedel. Kriechender Wurzelstock. Für saure Böden.

Polystichum, Schildfarn, POLYPODIACEAE, 60 cm, ①—●, ✕, ☞
setiferum '**Proliferum**' (**angulare**). Immergrüner, Farn mit besonders feinzerteilten Wedeln. Sehr hübsch.

Winterharte Küchenkräuter und Heilkräuter

Eine Kräuterecke sollte in keinem, noch so kleinen Garten fehlen. Mit Gewürzkräutern kann man frisch oder getrocknet Salate und andere Gerichte reizvoll variieren, außerdem enthalten sie wertvolle Vitamine und Mineralsalze. Manche sind bewährte Hausmittel, die gegen vielerlei Krankheiten helfen können. Wir bieten nur winterharte Arten an. Alle bevorzugen sonnigen Standort und werden mit Topfballen geliefert.

Baldrian (*Valeriana officinalis*). Tee b. Magenstörungen, Kopfschmerzen und zur Beruhigung.

Bohnenkraut (*Satureja montana*). Blätter und Stiele zu allen Bohnengerichten und zum Einlegen von Gurken.

Eberraute (*Artemisia abrotanum*). Stark geschlitzte Blätter mit aromatischem, zitronenähnlichem Duft.

Estragon (*Artemisia dracunculus*). Blätter: Salate, Kräuterbutter, Majonaisse und zum Einlegen von Gurken. Besonders feines Aroma.

Lavendel (*Lavandula angustifolia*). Blüten: werden in der Knospe geschnitten, zu Duftkissen verwendet und sind wirksam gegen Motten. Hauptbestandteil des Potpourri. Blätter und Stengel: für erfrischende Bäder.

Liebstockel (*Levisticum officinale*). Maggikraut. Blätter: sehr starkes Aroma für Bratensoßen und Suppen.

Majoran (*Origanum vulgare*). Blätter: als Würze in Kartoffelsuppe, zur Leberwurstbereitung und für Braten und Soßen.

Pfefferminze (*Mentha piperita* 'Mitchham'). Blätter: bekannter Tee. Kalt auch sehr erfrischend mit Zitronenmelisse.

Pimpinelle (*Sanguisorba minor*). Blätter: zu Salaten, Kräuterbutter und Fischgerichten.

Rosmarin (*Rosmarinus officinalis*). Blätter: als Medizin eingesetzt mit Alkohol gegen Asthma und Atembeschwerden. Zu Schweine- und Gänsebraten. Guter Winterschutz nötig.

Salbei (*Salvia officinalis*). Blätter: zu Fisch- und Geflügelgerichten. Tee ausgezeichnet gegen Halsschmerzen und alle Entzündungen der Mundhöhle.

Schnittlauch (*Allium schoenoprasum*). Vielseitig verwendbar. Ausgezeichnet auf Butterbrot und zu Quark.

Thymian (*Thymus vulgaris*). Blätter: gutes Gewürz an Braten, Soßen und Kräutermayonnaisen.

Waldmeister (*Asperula odorata*). Frische B zur Herstellung der Maibowle. Getrocknet als Duftkissen und gegen Motten.

Weinraute (*Ruta graveolens*). Blätter: starkes Gewürz für Fleisch und Fischspeisen.

Wermut (*Artemisia absinthium*). Blätter: bekannter, bitterer Tee gegen Magenbeschwerden. Wurmmittel.

Ysop (*Hyssopus officinalis*). Blätter: zu Soßen und Braten. Tee zum Gurgeln bei Halsentzündungen.

Zitronenmelisse (*Melissa officinalis*). Blätter: zu allen Salaten, Fleisch- und Fischgerichten. Zusatz zu verschiedenen Tees und zu erfrischenden Bädern.

Hemerocallis-Sortiment

Hemerocallis, Taglilie, LILIACEAE

Taglilien haben keine besonderen Kulturansprüche und sollten viele Jahre ungestört bleiben. Daher ist es wichtig, sie weit genug auseinander zu pflanzen (60—90 cm je nach Sorte). Sie vertragen volle Sonne aber auch leichten Schatten, der für manche zarte Farbe günstiger ist. In großzügigen Dauerpflanzungen haben sie sich sehr bewährt. Hemerocallis können im Herbst oder zeitigen Frühjahr verpflanzt werden. Ihre volle Schönheit zeigen sie erst im 2. oder dritten Jahr. Verschiedene Sorten blühen im Herbst ein zweites Mal.

N: *Geranium platypetalum*, *Iris sibirica*, *Anchusa*, *Delphinium*. Als Unterpflanzung ist schön: *Ajuga atropurpurea*, *Sedum Purpureteppich* oder im Halbschatten *Epimedium*, *Dicentra eximia*.

f = frühe Sorte (Mai bis Juni), m = mittlere Blütezeit (Juli), s = spätblühend (Juli bis August).

AM = Award of Merit (Wertzeugnis) der Amerikanischen Hemerocallis-Gesellschaft, das im Jahre an zehn Sorten vergeben wird.

STM = Stout Medal, höchste Auszeichnung in den USA, die jährlich nur an eine Sorte vergeben wird.

Miniatur und kleinblumige Hemerocallis

Diese sind diesmal in zwei besondere Gruppen zusammengefaßt. Sie sind nicht nur durch ihre kleinen Blüten, sondern auch zum Teil durch niedrigeren Wuchs so anders, daß sie andere Verwendungsmöglichkeiten haben. Sie passen gut in kleine Gärten oder Innenhöfe, an Vogelbecken usw. So herrlich die großblumigen neuen Sorten sind, es wird immer Blumenfreunde geben, die gerade den Charm der kleinblumigen schätzen werden.

Auch in USA erfreuen sie sich großer Beliebtheit und bedeutende Züchter befassen sich mit ihnen.

Miniatur-Hemerocallis

(ca. 3—4 cm Blütendurchmesser)

'Corky' (USA Fischer 1960), 75 cm, m.

Der besondere Charme der kleinblumigen Taglilien wird einem bei dieser Sorte sofort bewußt. An stark verzweigten, dunklen Stielen sind die rein mittelgelben Blüten wohl verteilt. Elegant und besonders reizend für Sträucher.

'Curls' (USA Kraus 1961), 60 cm, f

Kreidig maisgelb mit Aprikosenschein. Gekrauste Ränder der Sepalen, rosa Griffel.

'Golden Chimes' (USA Fischer 1956), 70 cm, f—m.

Reizende kleine Blüten in klarem Goldgelb von guter Substanz. Ausgezeichnet verzweigt und lange blühend

'Jenny Wren' (USA Fischer 1960), 60 cm, f

Unter den kleinblumigen ist diese die einzige in richtigem Mittelbraun. Eine dunklere Zone umgibt den orangefarbenen Schlund. Sehr reizend.

'Sleepy' (USA Fischer 1964), 65 cm, m—s.

Aprikosengelb mit rosigem Nerv. Sehr hübsch und gut verzweigt.

'Thumbellina' (USA Fischer 1960), 40 cm, m.

Diese reizende, kleinblumige Taglilie ist eine richtige Zwergsorte mit orangefarbenen Blütchen. Geeignet für den Vordergrund oder auch im größeren Steingarten.

Kleinblumige Hemerocallis

(bis 6 cm Blütendurchmesser)

- 'August Orange' (USA Stout 1946), 70 cm, s.
Elegante, einheitlich orangegelbe Blumen an graziösen Stielen.
- 'Bambi Doll' (USA Wild 1965), 70 cm, f—m.
Sehr zartes Rosa mit grünem Schlund. Gute Verzweigung und Substanz.
- 'Bel' (USA Wynne 1964), 60 cm, f
Reizende kleine Blüten in hellem Zitronengelb.
- 'Brunette' (USA Stout 1941), 50 cm, f.
Kleine Blüten von stumpfem Braun. Wegen der sehr frühen Blütezeit wertvoll.
- 'Lady Inara' (USA Hall 1959), 80 cm, f—m.
Petalen rosa, Sepalen lachsgelb, orange-lachs Schlund. Die runden Blüten sind von dicker Substanz und haben gewellte Ränder. Reichverzweigt an dunklen Stielen.
- 'Mc Pick' (USA Lexington 1957), 55 cm, f.
Tiefes, reines Goldgelb, das durch die dunklen Knospen besonders wirkt. Locker verzweigt, reichblühend. Beste Gartenwirkung.
- midgendorfiii (GB Perry 1946), 50 cm, f.
Frühblühend, goldgelb. Die Blüten sitzen dicht am Stiel.
- 'Red Cup' (USA Douglas 1945), 60 cm, s.
Sehr leuchtend Rot mit kleinem, tieforange Schlund, reichblühend.
- 'Songster' (USA Wynne 1950), 85 cm, s.
Grünlich-zitronengelbe Bl an hohen, gut verzweigten Stielen. Durch sehr späte Blütezeit wertvoll.
- 'Suzie Wong' (USA Kennedy 1962), 60 cm, f—m.
Mittelgroße Blumen von frischem Grüngelb und hübscher Form.
- 'Tang' (USA Lambert-Wynne 1964), 50 cm, f—m.
Eintonig oxsenblutrot mit grünem Schlund.

Großblumige Sorten

- 'Abstract Art' (USA Hall 1967), 130 cm, m.
Aprikosenlachsfarben. Petalen rötlich überhaucht, gelbgrüner Schlund, sehr großblumig, reich verzweigt.
- X 'Alan' (USA Claar 1953), 70 cm, m.
Intensives, leuchtendes und sehr reines Rot. Dicke Substanz der großen Blüten, die nur einen sehr kleinen, grünlich-gelben Schlund haben. Eine der bedeutendsten reinroten Sorten, die 1960 ein AM erhielt.
- 'Annie Welch' (USA Claar 1964), 50 cm, m.
Weiches Lachsrosa in kräftigeren lachsfarbenen Schlund übergehend.
- 'Aten' (USA Kraus 1952), 110 cm, s.
Große, tieforange Blüten von glatter Form.
- 'Athlone' (USA Russell 1942), 100 cm, m.
Großblumig. Äußere Blütenblätter goldgelb, bräunlich getönt, innere weiches, rosiges Orangebraun mit auffallendem, goldgelbem Mittelstrich. Immergrün AM 1952.
- 'Atlas' (USA Kraus 1952), 110 cm, m.
Riesige Blüten in schönstem Hellgelb mit leicht gewellten Rändern und von bester Substanz.
- 'Autumn Red' (USA Nesmith 1941), 80 cm, s.
Samtiges Ziegelrot mit großem, goldgelbem Schlund. Lange Blütezeit.
- 'Azor' (USA Claar 1963), 60 cm, s.
Tieforange breite Blüten, gekreppte Substanz, besonders sonnenbeständig.
- 'Banbury Giant' (GB Brummitt 1965), 90 cm, m—s.
Tiefes Goldgelb bis in den Schlund. Sehr breite Petalen mit bewegten Rändern und wie Sepalen zurückgebogen.
- 'Banbury Signal' (GB Brummitt 1964), 90 cm, s.
Eine englische Züchtung von reinem Signalrot. Goldgelber Schlund.

- 'Bed of Roses'** (USA Wynne 1963), 60 cm, s.
Eine auffallende Sorte in sehr merkwürdigem Rosenrosa bis Lachsrot. Die mittelgroßen Bl sitzen an reichverzweigten Stielen. Einzigartig in der Farbwirkung.
- 'Bess Ross'** (USA Claar 1954), 70 cm, m.
Herrliches Rot von großer Leuchtkraft. STM 1962.
- 'Black Friar'** (USA Lester 1951), 90 cm, m.
Schwarzrot. Sehr sonnenbeständig. Die Blume bleibt bis zum späten Abend offen.
- 'Blushing Belle'** (USA Hall 1963), 60 cm, s.
Aprikosengelb mit rosa Nerv und tiefgelbem Schlund. Alle Bl-Blätter sind zurückgeschlagen.
- 'Burning Daylight'** (USA Fischer 1962), 60 cm, s.
Tiefes Orangelgelb von unglaublicher Leuchtkraft mit einem zarten, braunroten Hauch. Dicke Substanz, schöne Form und Sonnenbeständigkeit machen diese Sorte zu einer Weltsorte ersten Ranges.
- 'Carey Quinn'** (USA Hall 1960), 80 cm, f—m.
Ausgezeichnete rote Sorte. Die Farbe ist dunkel, die Substanz samtig, kleiner grüngelber Schlund. AM 1966
- 'Cartwheels'** (USA Fay 1959), 90 cm, m.
Große flache, runde Blumen von schönstem Goldgelb Mit hellerem Mittelnerv. Sonnenbeständig und von bester Substanz. STM 1966. Spitzensorte!
- 'Congo Beauty'** (USA Claar 1960) 75 cm, m.
Sehr dunkles, leuchtendes Rot mit samtigem Glanz. Kleine grüne Mitte. Sonnenbeständig.
- 'Coral Mist'** (USA Hall 1955), 50—60 cm, f—m.
Richtiges Rosa mit dunkelroter Zone, runde Form.
- 'Cradle Song'** (USA Milliken 1953), 70 cm, f.
Die orangegelben Blüten sind von dicker, gekreppter Substanz und öffnen sich schon am Abend. Langblühend!
- 'Crestwood Ann'** (USA Fay-Griesbach 1961), 40 cm, m.
Tetraploide Sorte mit melonenfarbenen Blüten mit opalisierendem Glanz und goldgelbem Schlund. Sehr breite Petalen, remontiert.

- 'Crimson Glory'** (USA Carpenter 1952), 110 cm, f.
Leuchtend rein Karminrot ohne Brauntöne. Sehr reichblühend. Zuverlässige alte Sorte.
- 'Crimson Pirate'** (USA Sass 1951), 70 cm, m.
Hervorragende Sorte von leuchtendem, klarem Rot. Wenig orange Schlund. Eher kleinblumig u. von ster-niger Form. Reich und lange blühend.
- 'Daafu'** (USA Claar 1955), 50 cm, m.
Helles Himbeerrosa mit dunklerer Zone vor dem klei-nen, goldgelben Schlund. Sehr rosa in der Wirkung.
- 'Dawn Supreme'** (USA Rudolph 1962), 60 cm, f—s.
Große mittelgelbe Blüten mit gewellten Petalen. Lan-ge Blütezeit.
- 'Eveline Claar'** (USA Kraus 1950), 75 cm, s.
Edelgeformte Blüten in kühlem Orchideenrosa mit sei-digem Schimmer. Hält die Konkurrenz mit vielen der neuesten Züchtungen aus. AM 1955.
- 'Felice'** (USA Kraus 1950), 110 cm, s.
Große Blüten von schmaler, sterniger Form, mittel-goldgelb mit orange Ton.
- 'Flamboyant'** (USA Douglas 1947), 90 cm, m—s.
Tiefes Goldgelb mit rotbrauner Zeichnung am Schlund. Sehr effektiv!! AM 1953.
- 'Flying Saucer'** (USA Flory 1956), 90 cm, m.
Hell bis Zitronengelb mit grünem Schlund. Die gro-ßen Blüten vertragen stärkste Sonne. Lange Blütezeit. AM 1960.
- 'Frances Fay'** (USA Fay 1957), 50 cm, s.
Hellstes Perlmuttergelb mit rosigem Schimmer u. weiß opalisierend. Eine schwer zu beschreibende Farbe u. sehr besonders. Beliebte Sorte in USA mit höchsten Auszeichnungen wie Stout Medal 1964.
- 'Frans Hals'** (USA Flory 1955), 90 cm, m—s.
Zweifarbige Sorte von großer Leuchtkraft. Petalen orangerot und Sepalen rahmgelb. Starkwüchsig, reich-blühend.

- 'Friar Tuck'** (USA Lester 1951), 100 cm, m.
Tiefes Goldgelb mit mahagonirotem Auge. Sonnenbeständig, gut verzweigt. Herbstblüher.
- 'George Cunningham'** (USA Hall 1957), 60 cm, s.
Hervorragende, melonenfarbige Taglilie mit seidigem Glanz. Die dunklen Stiele geben noch eine besondere Note. Hochbewertete Sorte.
- 'Golden Scepter'** (USA Nesmith 1939), 95 cm, m.
Eher kleinblumig, tiefes Goldgelb in orange-gelb übergehend. Überreichblühende, leuchtende Sorte.
- 'Grecian Gift'** (USA Spalding 1959), 70 cm, f.
Hübsches kräftiges Aprikosenrosa mit ausgesprochener Mittelrippe und grünem Schlund. Sehr gut verzweigt. Duftend.
- 'Green Goddess'** (USA House 1951), 100 cm, m.
Glatte, riesige Blüten von kühlem Hellgelb mit sehr grünem Schlund. Gut verzweigt.
- 'Greenland'** (USA Wynne 1968), 100 cm, m.
Große sternförmige Bl. Die Knospen sind tiefgrün, die Bl helles Zitronengelb mit grünem Schlund.
- 'Haymaker'** (USA Hall 1962), 65 cm, f—m.
Rotschwarz von mattem Glanz und nur ganz wenig gelbem Schlund. Ausgezeichnete wüchsige und schöne Sorte.
- 'Hazel Powell'** (USA House 1954), 90 cm, m—s.
Die sehr großen Blüten von klassischer Form sind mittelgelb. Der Farbton ist nicht hell und auch nicht dunkel, sondern genau in der Mitte. Ein ganz reines, klares Gelb. Gut verzweigte Stiele.
- 'High Glory'** (USA Claar 1962), 70 cm, m.
Große, mittelgoldgelbe Bl von dicker Substanz. Alle Bl-Blätter leicht zurückgebogen und an den Rändern gewellt. Gut verzweigt.
- 'Howdy'** (USA Bremen-Armstrong 1952), 100 cm, m.
Mittelgroße Blumen von ungewöhnlicher Farbzusammenstellung. Petalen hellgelb, Sepalen rot, was in purpur übergeht. Hellgelber Mittelnerv.
- 'Hyperion'** (USA Mead 1925), 100 cm, f.
Ältere Sorte, die wegen ihrer Schönheit und Wüchsigkeit sehr verbreitet ist. Mittelgroße Blumen von ruhiger Form, zitronengelb.
- 'Invictus'** (USA Hall 1955), 80 cm, s.
Große, bewegte Blumen von tiefgoldorange mit etwas braun auf den Sepalen.
- 'Irene Felix'** (USA Claar 1963), 80 cm, m.
Sehr große mittelgelbe Blumen mit gewellten Rändern, die leicht zurückgebogen sind. AM 1969.
- 'Jake Russell'** (USA Russell 1956), 80 cm, m.
Die breiten Blütenblätter geben eine runde Form. Reines Goldgelb, hervorragende Sorte.
- 'Jean'** (USA McDade 1943), 120 cm, s.
Petalen goldgelb, Sepalen braunrot, spitze, sternige Form. Eine der spätesten, die immer auffällt.
- 'Joan Durelle'** (USA Flory 1955), 80 cm, s.
Besonders spätblühende Sorte mit frischgrünlich, gelben Bl an reichverzweigten, eleganten Stielen.
- 'Lavender Girl'** (USA Hall 1963), 70 cm, f—m.
Gedektes Lila mit großer sterniger, cremegelber Mitte. Besonders.
- 'Lexington'** (USA Claar 1961), 80 cm, m—s.
Die großen, haltbaren Blüten mit den stark gewellten Rändern sind ein klares Hellgelb. Eine Sorte, die in USA, England, Wien und Hamburg Auszeichnungen erhielt.
- 'Luxury Lace'** (USA Spalding 1959), 70 cm, m.
Das Rosa dieser Sorte ist bläulich, also mit wenig gelb und darum sehr neuartig. Noch auffällender ist der grüne Schlund. Die Blüten sind eher klein, aber von reizender Form. In USA lange eine der beliebtesten Spitzensorten, die die höchste Auszeichnung, die STM 1965 bekam.

- 'Magic Dawn'** (USA Hall 1955), 60 cm, f—m.
Mittelgroße, rosenrosa Bl mit Goldschlund, breite Bl-
Blätter. Lange Blütezeit.
- 'Nashville'** (USA Claar 1952), 70 cm, m—s.
Goldgelb mit hellroter Zeichnung in gotischer Form
am Schlund. Ausgezeichnete Sorte.
- 'Neyron Rose'** (USA Kraus 1952), 70 cm, m.
Eigenartiges Mittelrot bis Rosenrosa der runden Blü-
ten. Klar abgesetzter, heller Nerv.
- 'Nob Hill'** (USA Hall 1963), 70 cm, s.
Lachsige-Melonenfarbig, zum Schlund goldgelb. Große
Bl von eleganter zarter Farbe. Besonders spät.
- 'Orient'** (USA Wynne 1965), 40 cm, m.
Zart lachsige Rosa mit breiter, dunkelpflaumenfarbi-
ger Zone. Anders!
- 'Painted Lady'** (USA Russell 1942), 70 cm, f—m.
Warm Goldbraun mit dunklerer Zone. Schmale Blü-
tenblätter. Reichblühend u. wüchsig. Stout Med. 1951.
- 'Pamela'** (USA Kraus 1950), 100 cm, s.
Großblumig, weiches Butterblumengelb mit dunkler
Rückseite. Starke, bestens verzweigte, dunkle Stiele,
runde Blumenform.
- 'Pink Damask'** (NZ Stevens 1953), 80 cm, m.
Ganz einheitliches Rosa von besonderem Zauber.
Wüchsige und beliebte Sorte. AM 1957.
- 'Prairie Charmer'** (USA Marsh 1962), 50 cm, m.
Hellstes rosiges Beige mit tief weinroter Bänderung.
Auffallend und besonders!
- 'President Rice'** (USA Claar 1953), 80 cm, s.
Große Blüten von runder Form mit gewellten Petalen
und haltbarer Substanz. Ganz einheitliches, tiefes
Goldgelb bis in den Schlund. Ausgezeichnete Sorte.
- 'Prophet'** (USA Claar 1963), 70 cm, s.
Unter den Weinroten scheint mir diese die leuchtend-
ste und wirkungsvollste. Der orangefarbene Schlund
macht sie noch farbiger.

- 'Regal Air'** (USA Wild 1965), 70 cm, m—s.
Ganz mattes Blutrot mit sehr kleinem, grüngelbem
Schlund.
- 'Resplendent'** (USA Nesmith 1951), 100 cm, m.
Sehr samtiges Rotbraun von sterniger, spitzer Form.
Alle Blütenblätter haben einen goldgelben Mittel-
nerv, wodurch eine sehr besondere Note entsteht.
- 'Sammy Russell'** (USA Russell 1951), 60 cm, s.
Eher kleinblumige Sorte mit leuchtend ziegelroten Blü-
ten und orange Schlund. Eine der spätesten Sorten.
- 'Satin Glass'** (USA Fay 1960), 90 cm, m—s.
Cremerosa mit grünem Schlund. Ein silbriger Schim-
mer liegt über den runden Blüten. Mehrmalige Spit-
sorte in der Beliebtheitsliste der USA.
- 'Sea Gold'** (USA Hall 1964), 50 cm, m.
Kräftig aprikosenfarbig, Petalen etwas dunkler mit
hellem Nerv.
- 'Shining Plumage'** (USA Hall 1957), 90 cm, f.
Leuchtendes Rot zur Mitte dunkler werdend. Grün-
gelber Schlund, ausgezeichnet verzweigt.
- 'Shooting Star'** (USA Hall 1953), 100 cm, s.
Große, wohlgeformte Blüten in blassem, grünlichem
Gelb. Gut verzweigt.
- 'Skiatook Cardinal'** (USA Hancock 1960), 50 cm, m—s.
Leuchtend rote Sorte, großblumig, ganz eintonig bis
auf kleinen grünen Schlund.
- 'Spectacular'** (USA Pattison 1956), 60 cm, f.
Mahagonirote Zeichnung auf hellgelbem Grund.
- 'Stephan Blue'** (USA Connell 1962), 60 cm, m.
Helles Lavendelgrau, großer hellgelber Schlund. In-
teressante Liebhabersorte.
- 'Summer Interlude'** (USA Hall 1957), 70 cm, s.
Tiefes Ochsenblutrot mit kleinem, grüngelbem
Schlund. Breite Blütenform und Verzweigung.

'Sunday Afternoon' (USA Fischer 1963), 70 cm, m.
Tiefes Butterblumengelb der mittelgroßen Blumen an sehr gut verzweigten Stielen geben dieser Sorte besonderen Gartenwert.

'Tis Midnight' (USA Russell 1961), 100 cm, m.
Mahagonischwarz. Hier dunkelste aller Sorten. Wenig goldgelber Schlund. Reichblühend.

'Toro' (USA Fischer 1962), 110 cm, s.
Tieforangefarbene große Blüten, die in der Sonne haltbar sind. Gutverzweigt. Duftend.

'Tralee' (USA Claar 1965), 70 cm, m.
Zartrosa mit hellerem Nerv. Die Sepalen sind stark zurückgebogen.

'War Eagle' (USA Hall 1957), 55 cm, s.
Tiefes Ochsenblutrot, große Blüten. Sehr niedrig.

'Whistling Swan' (USA Hall 1960), 90 cm, s.
Frisches, klares Gelb. Eine der Spätesten, daher wertvoll.

'Widened' (USA Craig 1954), 80 cm, m—s.
Auf hellgelbem Grund kontrastreiche, leuchtend mahagonirote Bebländerung. Sehr farbig. Blüht stark nach und ist darum besonders wertvoll.

Hemerocallis, Taglilie

Einteilung nach Farben

f = frühe Sorte (Ende Mai bis Juni)
m = mittlere Blütezeit (Juli)
s = spätblühend (August, September)

M = Miniatur-Hemerocallis
KI = Kleinblumige Sorte

| Farbe | Höhe | Blütezeit | DM | Farbe | Höhe | Blütezeit | DM | Farbe | Höhe | Blütezeit | DM |
|------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | cm | | | | cm | | | | cm | | |
| Hellgelb: | | | | Hellgelb: | | | | Goldgelb: | | | |
| KI 'Atlas' 182 | 110 | m | 3,80 | 'Joan Durelle' | 80 | s | 5,50 | 'Banbury Giant' | 90 | m—s | 9,— |
| 'Bel' | 60 | f | 10,— | 'Lexington' | 80 | m—s | 8,— | 'Cartwheels' | 90 | m | 8,— |
| 'Flying Saucer' | 90 | m | 6,— | 'Shooting Star' | 100 | s | 4,50 | M 'Corky' | 75 | m | 7,— |
| 'Green Goddess' | 100 | m | 4,50 | KI 'Songster' | 85 | s | 5,— | M 'Curls' | 60 | f | 10,— |
| 'Greenland' | 100 | m | 12,— | KI 'Suzie Wong' | 60 | f—m | 7,— | 'Dawn Supreme' | 60 | f—s | 12,— |
| 'Hyperion' | 100 | f | 2,70 | 'Whistling Swan' | 90 | s | 5,— | 'Felice' | 110 | s | 3,50 |

| | Farbe | Höhe | Blütezeit | DM |
|------------------|-------------------|------|-----------|------|
| | | cm | | |
| Goldgelb: | | | | |
| M | 'Golden Chimes' | 70 | f—m | 5,50 |
| | 'Golden Scepter' | 95 | m | 3,50 |
| | 'Hazel Powell' | 90 | m—s | 4,50 |
| | 'High Glory' | 70 | m | 7,— |
| Kl | 'Mc Pick' | 55 | f | 6,— |
| | 'Irene Felix' | 80 | m | 7,— |
| | 'Jake Russell' | 80 | m | 10,— |
| Kl | 'middendorffii' | 50 | f | 2,70 |
| | 'Pamela' | 100 | s | 4,50 |
| | 'President Rice' | 80 | s | 5,— |
| | 'Sund. Afternoon' | 70 | m | 6,50 |
| M | 'Thumbelina' | 40 | m | 6,50 |

Orange:

| | | | | |
|----|--------------------|-----|---|------|
| Kl | 'August Orange' | 70 | s | 3,— |
| | 'Aten' | 110 | s | 4,50 |
| | 'Azor' | 60 | s | 12,— |
| | 'Burning Daylight' | 60 | s | 12,— |
| | 'Cradle Song' | 70 | f | 4,— |
| | 'Toro' | 110 | s | 7,— |

Bebänderte:

| | | | | |
|--|-------------------|-----|-----|------|
| | 'Flamboyant' | 90 | m—s | 3,50 |
| | 'Friar Tuck' | 100 | m | 4,50 |
| | 'Nashville' | 70 | m—s | 6,50 |
| | 'Orient' | 40 | m | 14,— |
| | 'Prairie Charmer' | 50 | m | 10,— |
| | 'Spectacular' | 60 | f | 7,— |
| | 'Wided' | 80 | m—s | 5,50 |

Zweifarbige (Bicolor):

| | | | | |
|--|----------------|-----|---|------|
| | 'Abstract Art' | 130 | m | 12,— |
|--|----------------|-----|---|------|

| | Farbe | Höhe | Blütezeit | DM |
|--|-------|------|-----------|----|
| | | cm | | |

Zweifarbige (Bicolor):

| | | | | |
|--|--------------|-----|-----|------|
| | 'Athlone' | 100 | m | 2,70 |
| | 'Frans Hals' | 90 | m—s | 6,— |
| | 'Howdy' | 100 | m | 3,30 |
| | 'Invictus' | 80 | s | 6,— |
| | 'Jean' | 120 | s | 3,— |

Braun:

| | | | | |
|----|----------------|-----|-----|------|
| Kl | 'Brunette' | 50 | f | 2,70 |
| M | 'Jenny Wren' | 60 | f | 7,50 |
| | 'Painted Lady' | 70 | f—m | 3,50 |
| | 'Resplendent' | 100 | m | 3,50 |
| | 'Sammy Russel' | 60 | s | 2,70 |

Rot:

| | | | | |
|----|-------------------|-----|-----|------|
| | 'Alan' | 70 | m | 9,— |
| | 'Autumn Red' | 80 | s | 2,70 |
| | 'Banbury Signal' | 90 | s | 9,— |
| | 'Bess Ross' | 70 | m | 10,— |
| | 'Carey Quinn' | 80 | f—m | 8,50 |
| | 'Crimson Glory' | 110 | f | 3,80 |
| | 'Crimson Pirate' | 70 | m | 3,80 |
| Kl | 'Red Cup' | 60 | s | 4,50 |
| | 'Regal Air' | 70 | m—s | 7,— |
| | 'Shining Plumage' | 90 | f | 5,50 |
| | 'Skiat. Cardinal' | 50 | m—s | 8,— |
| | 'Summ. Interlude' | 70 | s | 6,— |
| Kl | 'Tang' | 50 | f—m | 7,50 |
| | 'War Eagle' | 55 | s | 6,50 |

Weinrot:

| | | | | |
|--|-----------|----|---|-----|
| | 'Prophet' | 70 | s | 8,— |
|--|-----------|----|---|-----|

| | Farbe | Höhe | Blütezeit | DM |
|--|-------|------|-----------|----|
| | | cm | | |

Lavendel:

| | | | | |
|--|-----------------|----|-----|-----|
| | 'Lavender Girl' | 70 | f—m | 8,— |
| | 'Stephan Blue' | 60 | m | 6,— |

Schwarzrot:


| | | | | |
|--|----------------|-----|-----|------|
| | 'Black Friar' | 90 | m | 5,— |
| | 'Congo Beauty' | 75 | m | 6,50 |
| | 'Haymaker' | 65 | f—m | 9,— |
| | 'Tis Midnight' | 100 | m | 10,— |

Rosa und Braunrosa:

| | | | | |
|--|-----------------|-------|-----|------|
| | 'Bed of Roses' | 60 | s | 10,— |
| | 'Coral Mist' | 50—60 | f—m | 4,50 |
| | 'Daafu' | 50 | m | 5,50 |
| | 'Eveline Claar' | 75 | s | 5,— |
| | 'Luxury Lace' | 70 | m | 9,— |
| | 'Magic Dawn' | 60 | f—m | 6,— |
| | 'Neyron Rose' | 70 | m | 5,— |
| | 'Pink Damask' | 80 | m | 4,— |
| | 'Tralee' | 70 | m | 8,— |

Lachs und Melonenfarbige:

| | | | | |
|----|------------------|----|-----|------|
| | 'Annie Welch' | 50 | m | 12,— |
| Kl | 'Bambi Doll' | 70 | f—m | 12,— |
| | 'Blushing Belle' | 60 | s | 6,— |
| | 'Crestwood Ann' | 40 | m | 9,— |
| | 'Frances Fay' | 50 | s | 6,— |
| | 'G. Cunningham' | 60 | s | 7,— |
| | 'Grecian Gift' | 70 | f | 7,— |
| Kl | 'Lady Inara' | 80 | f—m | 6,50 |
| | 'Nob Hill' | 70 | s | 8,— |
| | 'Satin Glass' | 90 | m—s | 16,— |
| | 'Sea Gold' | 50 | m | 7,50 |
| M | 'Sleepy' | 65 | m—s | 10,— |



Hemerocallis 'Chetco'. Lange Blütezeit der lilienartigen Blumen.

Hemerocallis 'West Point'.





Kleiniris sind reizend für Steingärten. Oben links **'Pogo'**, rechts **'Tonya'**, unten links **'Baria'**, rechts **'Cyanea'**.

Iris 'Menuett'. Es gleicht ihr die Sorte **'Dancers Veil'** und die blauere **'Blue Petticoats'**.



Hemerocallis-Kollektionen 1974

Nr. 45 Erster Versuch mit Taglilien

Atlas
Crimson Pirate
Evelyn Claar
Hazel Powell
Howdy
Resplendent DM 22,—

Nr. 46 Taglilien von Juni bis September

Früh: Brunette

Cradle Song
Spectacular

Mittel: Black Friar

Crimson Glory
Pamela

Spät: Frances Fay

Sammy Russell
Whistling Swan DM 36,50

Nr. 47 Klare Gartenfarben

Atlas
Frans Hals
Shining Plumage
Sunday Afternoon DM 20,—

Nr. 48 Ausgefallene Farben

Frances Fay
George Cunningham
Prairie Charmer
Prophet DM 28,—

Nr. 49 Spitzensorten

Bed of Roses
Bess Ross
Frans Hals
Lexington
Satin Glass
Toro DM 52,—

Iris germanica

Alle anderen Iris finden Sie in der allgemeinen Staudenliste.

Alphabetische Einteilung.

Die Blüte der Schwertlilien fällt in eine blumenarme Zeit. Die früheren Sorten blühen noch zusammen mit den letzten Tulpen und die späteren Anfang Juni mit den Pfingstrosen und den ersten Rittersporn. Die Farbskala ist so groß, wie bei keiner anderen Staude. Neben leuchtenden, satten Farben, bei denen nur reines Rot noch fehlt, gibt es eine Vielzahl von Pastelltönen und Zwischenfarben, die sehr schwer zu beschreiben sind, aber erst den Zauber der Iris = Regenbogen-göttin, ausmachen. Dadurch und durch die verschiedenen Höhen und Blütezeitgruppen ergibt sich das große Sortiment. Um es Ihnen übersichtlich zu machen, finden Sie eine Einteilung nach Farben. Außerdem haben wir verschiedene Kollektionen zusammengestellt, die dem Eiligen oder dem Anfänger die Auswahl erleichtern sollen. Wenn Sie sich für Neuheiten oder zum Teil ausgefallene Sorten interessieren, verlangen Sie bitte die Liebhaberliste, die im Sommer erscheint.

Kulturanleitung

Standort: möglichst vollsonnige, trockene Gartenplätze. Bei ungünstigen Lagen Beete erhöhen, damit sich keine stehende Nässe bildet.

Erde: Jede normale Gartenerde, Lehm, Kompost, nur **kein** saurer oder mooriger Boden.

Düngung: Phosphate, Hornmehl, Knochenmehl im Winter oder zeitigen Frühjahr. Zuviel Stickstoff oder Mist begünstigt Fäulnis.

Pflanzenschutz: Man kann gegen Blattflecken spritzen mit den üblichen Schwefel-Kupfer-Mitteln (Orthocid, Cupra-vit, Phytex-Kupfer o. a.) unter Zusatz eines Netzmittels im zeitigen Frühjahr vorbeugend und nach der Blüte, damit das Laub über den Sommer ansehnlich bleibt. Blattflecken beeinträchtigen aber nicht die Blüte. Bei Rhizomfäule (bei zu nassem Standort oder in ungünstigen Jahren) die faulen Stellen ausschneiden, die Erde desinfizieren und die ausgeschnittenen Rhizome herausgenommen oder am Standort desinfizieren, mit Holzkohle bestreuen und gut trocknen lassen. (Einfachstes Mittel hellrosa Kaliumpermanganatlösung).

Pflanzung: August bis November oder März, wobei Herbstpflanzung vorzuziehen ist. Abstand je nach Sorte 40 bis 80 cm, Rhizome flach pflanzen, nur wenig mit Erde bedecken, fest andrücken und einmal gut angießen. Weiteres Wässern ist nicht nötig. Es ist wichtig, daß Iris nicht von anderen Pflanzen überwuchert werden.

Teilung: Einfache, kleinblumige Sorten können viele Jahre ungeteilt stehen. Die großblumigen Sorten sollte man, wenn sie mit dem Blühen nachlassen, nach 4 bis 5 Jahren teilen und verpflanzen. Will man nicht die ganze Pflanze herausnehmen, kann man sie durch heraus-schneiden einzelner Rhizome auslichten.

Iris germanica (Barbata-Nana-Gruppe), niedrige Bartiris

Diese Klasse umfaßt die Zwergiris (bis 25 cm) und die sogen. Kleiniris (25—38 cm). Alle lieben einen sonnigen Standort und durchlässigen Boden.

Je niedriger die Sorten sind, desto früher blühen sie. Die höheren Sorten erreichen in der Blütezeit den Beginn der ersten hohen Bartiris. Läßt man sie einige Jahre stehen, wird man zum vollen Genuß eines überreichen Flors kommen. Sie sind reizend in Steingärten oder als Einfassung und blühen im April, also mit den Tulpen. Wir werden in den nächsten Jahren noch allerhand hübsche Neuheiten bekommen, da auch auf diesem Gebiet viel gezüchtet wird.

- △ **'Bingo'** (USA Schreiner 1963), 25 cm. Tiefschwarzblau, H sehr samtig mit blauem Bart. Guter Farbfleck.
- △ **'Blue Denim'** (USA Warburton 1959), 30 cm
Eine spät- und langblühende Kleiniris von einheitlichem Hellblau mit mehreren Blüten am Stiel. Weißer Bart, hübsche Form und gute Substanz.
- △ **'Brassie'** (USA Warburton 1958), 25 cm.
Ganz ausgezeichnete tief goldgelbe Sorte mit sehr hübschen Blumen von guter Form und Substanz. Reichblühend!
- △ **'Brighteyes'** (GB Darby 1957), 30 cm
D frisches Zitronengelb, H olivgrüngelb mit pflaumenfarbigem, samtigem Fleck, von dem sich ein heller Bart abhebt. Teilweise verzweigt.
- △T **'Bright White'** (USA Welch 1960), 15 cm.
Gute, schneeweiße Sorte.
- △ **'Cherry Garden'** (USA Jones 1967), 30 cm. Ganz einheitlich Weinrot einschließlich Bart. Zwei Blüten am Stiel, gute Substanz, hübsch.
- △T **'Cherry Spot'** (USA Welch 1954), 10 cm.
Reizende, kleine Iris, weiß mit kirschrotem Fleck auf den H.
- △ **'Circlette'** (USA Goett 1962), 30 cm. Eine violettblaue Plicata von gefälliger Form.
- △T **'Crispy'** (USA Welch 1958), 15—20 cm. Lange blühende, schneeweiße Sorte von guter Substanz.
- △ **'Cyanea'** (D G & K 1899), 15 cm.
Bis heute nicht überholte violettblaue Sorte.
- △ **'Dale Dennis'** (USA Dennis 1957), 25 cm.
Spät und reich blühende Plicata. Sauber abgesetzte lilafarbene Ränder auf schneeweißem Grund.
- △ **'Fashion Lady'** (USA Welch 1957), 10—15 cm. Reines, tiefes Goldgelb. Sehr hübsche Form. Caparne-Award 1964.
- △ **'Footnote'** (USA Keppel 1968), 30—40 cm. D grau lavendel, H mittel weinrot, lang und reich blühend.
- △ **'Frisky'** (USA Schreiner 1966), 40 cm.
D orangegelb, H kastanienbraun.
- △T **'Gay Lassie'** (USA Welch 1956), 10 cm.
D schneeweiß, H lindgrün mit weißem Rand.
- △ **'Gingerbred Man'** (USA Jones 1968), 25—30 cm. D braun mit goldbronce Puder, H richtig warm Braun von dem sich der leuchtend blaue Bart abhebt. Auffallende Neuheit!
- △ **'Gletscherspalte'** (D van Nes 1964), 25 cm.
Große Blüten. Hellstes Blau bis Weiß. Der blaue Bart gibt eine besondere Note.
- △ **'Golden Fair'** (USA Warburton 1960), 25 cm.
Ausgezeichnete goldgelbe Sorte von bester Form und Substanz.
- △ **'Grace Note'** (USA Hamblen 1965), 30 cm. Eine der auffallenden gelben Sorten mit blauem Bart. Diese Kombination findet sich bis jetzt nur bei Kleiniris.
- △ **'Gräfin Clementine'** (D van Nes 1962), 20—25 cm. D creme-gelb, H gelb, weißer Bart. Frische Gartenfarbe.

- △ **'Green Spot'** (USA Cook 1951), 30 cm.
Weiß mit grünen Adern und Fleck auf den H. Bewährte und sehr beliebte Sorte.
- △T **'Himmelsauge'** (D van Nes 1964), 10 cm. Reizende, kräftig hellblaue Blumen mit weißem Bart. Durch den niedrigen Wuchs auch für Tröge geeignet.
- △ **'Jerry Rubin'** (D van Nes 1965), 30 cm.
Leuchtend rubinrote Kleiniris. Überaus reichblühend. Mehrere Bl an jedem Stiel. Eindrucksvolle Farbwirkung im Garten.
- △ **'Knick Knack'** (USA Greenlee 1961), 15 cm.
Hier ist eine Plikata in der Gruppe der Zwergiris mit weißem Grund und blauer Randzeichnung. Weißer Bart und violette Stempelblätter.
- △ **'Laurin'** (Oe Hanselmeyer 1958), 15 cm.
Ungewöhnliche Farbzusammenstellung. Verschiedene bronzebraune Töne, H dunklere Mitte, von der sich der leuchtend blaue Bart gut abhebt.
- △ **'Lilli Var'** (USA Welch 1959), 20 cm.
D broncegelb, H warm kastanienbraun mit sauberem Goldrand.
- △T **'Lilli White'** (USA Welch 1958), 15 cm. Reinweiß von guter Form. Reichblühend.
- △ **'Lilli Yellow'** (USA Welch 1958), 30 cm.
Große dunkelgelbe Blüten, zwei Terminalknospen.
- △ **'Little Rosy Wings'** (USA Douglas 1955), 17 cm.
Sehr früh. Rubinrot bis weinrot, H waagrecht und samtig. Reichblühend.
- △ **'Mephisto'** (D van Nes) 25 cm.
Kleine violettrote Blüten von eleganter Form. Der helle Bart fällt auf.
- △ **'Mitternacht'** (D van Nes 1960), 25 cm.
Violette Sorte mit blauem Bart, auffallend lange Blütezeit.
- △ **'Nachtmahr'** (D van Nes 1960), 30—35 cm. Rötliches Violett, zierliche Blüten an feinen verzweigten Stielen. Späteste von allen.
- △ **'Path of Gold'** (USA Hodson 1943), 15 cm.
Niedrige, reichblühende, goldgelbe Kleiniris.
- △ **'Pepita'** (USA Schreiner 1965), 30 cm.
Das leuchtende Hellblau hat auf den H einen dunklen Fleck, ausgezeichnete Substanz. Mehrere mittelgroße Blüten am Stiel.
- △ **'Pogo'** (USA Douglas 1954), 30 cm.
Goldgelb, brauner Fleck auf den H.
- △ **'Pygmy Gold'** (USA Douglas 1953), 30 cm.
Hübsch geformte Blüten in reinem Dunkelgelb.
- △ **'Regards'** (USA Hager 1967), 30 cm. D seidig, rötlich Lila, H sehr samtig weinrot, violetter Bart. Verzweigt, waagrechte Haltung. Lang- und reichblühend.
- △ **'Rotkäppchen'** (D van Nes 1964), 25—30 cm. Auch eine der zierlichen, reichblühenden Sorten von Frau van Nes mit „Wildcharakter“. Tiefschwarzes Weinrot.
- △ **'Schwanensee'** (D van Nes 1960), 30 cm.
Wüchsige, höhere reinweiße Sorte.
- △ **'Sonnenland'** (D van Nes 1964), 30 cm.
Klares Goldgelb ist eine der schönsten Gartenfarben. Hier ist das Gelb frisch und rein. Die Stiele haben zwei Terminalknospen. Die Blüten sind von guter Substanz und sehr haltbar.
- △ **'Tinkerbell'** (USA Douglas 1954), 30 cm.
Schönstes kräftiges Hellblau, auf den H ist ein dunklerer Fleck. Sehr wüchsig und reichblühend.
- △ **'Tonya'** (USA Schreiner 1962), 25 cm.
D lavendelblau, H rosig lila mit purpurroter Mitte, heller Bart. Verzweigte Stiele bringen immer wieder Blüten, daher längere Blütezeit. Außerordentlich wüchsig.
- △ **'Velvet Caper'** (USA Warburton 1963), 30 cm. Schönes Violett ganz ohne Adern, blauer Bart, H sehr samtig. Schön.

Iris germanica (Barbata-Media-Gruppe), mittlere Bartiris

Diese Gruppe liegt, was Höhe und Blütezeit anbetrifft, zwischen *Iris barbata nana* und *Iris barbata elatior*.

'Alaska' (USA Schreiner 1940), I—II, 60 cm, I b.
Frühe, schneeweiße Sorte.

'Andalusian Blue' (USA Schreiner 1938), I—II, 70 cm, IV b.
Unter den ganz frühblühenden Iris ist dies die beste, hellblaue Sorte.

'Brown Doll' (USA Schreiner 1968), 50 cm, XIV.
Warm braunrot, auf den H dunklerer samtiger Fleck.
Eine wertvolle Farbbereicherung der frühen Zeitgruppe.

'Cloud Fluff' (USA Greenlee 1955), I, 40 cm, I a.
Diese schneeweiße Sorte ist durch die hervorragend geformten Blüten v. bester Substanz die beste ihr. Art.

'Cutie' (USA Schreiner 1962), I—II, 40 cm, I c.
Unter den frühblühenden Iris ist diese weiße Sorte m. den türkisblauen Adern auf d. H wirklich neuartig.
Ausgezeichnet. Form u. Substanz, verzweigt, reich- und langblühend.

'Dresden Candleglow' (USA Reath 1964), I—II, 50 cm, XX.
D frisches Gelb, H weiße Mitte. Rundliche Blütenform, hübsch verzweigt.

'Drummer Boy' (USA Schreiner 1963) I, 50 cm, IV b.
Hellblau, die H von der Mitte aus durchzogen von dunkleren Adern. Lange Blütezeit. Ausgezeichnet!

'Fairy Frolic' (E Soper 1962), I, 35 cm, XXIV.
D hellstes Lavendelblau mit olivgoldenem Hauch, blauem Bart und olivfarbenen Adern und Schlund. Duftend. Sehr aparte Liebhabersorte!

'Findelkind' (D van Nes 1960), I—II, 50 cm, XXII a.
Bei der Auswahl der goldgelben, frühblühenden Iris, ist Findelkind mit Abstand die beste. Das Goldgelb ist tiefer und reiner als bei allen mir bekannten ähn-

lichen Sorten. Sie ist eine sehr reichblühende, wüchsige Vordergrundsorte.

'First Lilac' (USA Greenlee 1957), I, 45 cm, VIIa.
Echtes Lila ist eine seltene Farbe unter den Iris und in der frühen Zeitgruppe erst recht.

'Georgia' (E Farr 1920), I—II, 80 cm, XI.
Cattleyenrosa. Unter den Frühblühern einzige dieser Farbe.

'Interim' (USA Salman 1962), I, 50 cm, XXI.
D elfenbeinweiß, H goldgelb, in der Farbe wie Mystic Melody, aber in der frühesten Blütezeit eine sehr willkommene Bereicherung. Außerordentlich reichblühend und wüchsig.

'Lichtelfe' (D van Nes 1960), I, 50 cm, XXIV.
Lavendelblaue Blüten, die einen olivfarbenen Hauch haben. Sehr feste runde Blumen. Wurde in Wien prämiert.

'Light Cavalry' (USA B. Jones 1967), I—II, 50 cm, XIV.
Unter den frühblühenden ist diese Farbe neu. Das sehr harmonische Braunrot ist auch eine gute Gartenfarbe. Blütenform, Substanz und Verzweigung sind sehr gut.

'Lillipinkput' (USA Douglas 1959), I—II, 40 cm, XII b.
Unter den frühblühenden Iris ist diese tief lachsrosa Sorte auffallend. Die kleinen Blumen sind von leuchtender Farbe. Verzweigte Stiele.

'Marine Wave' (USA Schreiner 1942), I—II, 70 cm, VIII b.
Scharfes Mittelviolet, ganz eintonig, ohne Samt, weißer Bart.

'Maroon Caper' (USA Warburton 1964), I—II, 50 cm, IX a.
Tief rotviolett. Gute Form und Substanz. Durch die aphylla Abstammung von unten verzweigt.

'Moonbeam' (E Murrell 1927), I—II, 50 cm, XIX.
Sehr frühblühende Iris in klarem Zitronengelb.

'Namanga' (D van Nes 1964), I—II, 35 cm, XIII.
Ganz eintoniges Violettrot mit blauem Bart. Lange H.
sehr schönes, breites, geschwungenes Laub.

'Rose Harmony' (USA Brown 1967), I—II, 60 cm, XII.
Die großen Blumen haben gewellte Ränder. D rosig
weinrot, H dunkler mit samtiger Mitte. Neue Farbe.

'Sunbeam' (E Murrell 1927), I, 70 cm, XXII a.
Frühe, primelgelbe Sorte.

'Tamino' (USA Schreiner 1964), I—II, 50 cm, I c.
Weißer D, die Mitte der H ist mit blauen Adern durch-
zogen und gelb gerandet. Sehr farbige Wirkung.

Iris germanica (Barbata-Elatior-Gruppe), Hohe Bartiris

'Accent' (USA Buss 1953), IV, 80 cm, XXV.
Variegata mit tief goldgelbem D und samtig braun-
roten H. Am Schlund Goldadern. Gut verzweigt.

'After Dark' (USA Schreiner 1963), II, 90 cm, VI b.
Tiefes Violettblau, einschließlich Bart. H sehr samtig.
Hoch und gut verzweigt.

'Ahoy' (USA Tompkins 1957), V, 60 cm, XIV.
Sehr leuchtendes Braunrot von seidiger Oberfläche.
Gute Gruppensorte für Vordergrund.

'Allegiance' (USA Cook 1958), IV, 100 cm, VI a.
D herrliche blaue Seide, H sehr samtig, goldener Bart.
Großblumige Sorte, die alle guten Eigenschaften ver-
einigt und als blaueste der dunklen Sorten Weltruf
hat. Dykes Medal 1964.

'Amethyst Flame' (USA Schreiner 1958), III—IV, 80 cm, VIII a.
Rosiges Lila wird durch braunen Schlund belebt. Die
riesigen Blüten sind von bester Substanz. Hat viele,
höchste Auszeichnungen einschließlich Dykes Medal
1963 erhalten.

'Babbling Brook' (USA Keppel 1966), III, 80 cm, IV a.
Immer wieder bemühen sich Züchter um hellblaue Iris.
Diese Sorte ist wohl eine der blauesten und in Form,
Substanz, Verzweigung hervorragend. Die Dykes Med-
al 1972 ist ein Beweis, daß sie sich über den ganzen
Kontinent bewährt hat.

'Bang' (USA Craig 1954), III, 70 cm, XIV.
Viel gerühmte Sorte in warmem Braunrot von guter
Form und Substanz.

'Bellerive' (USA Benson 1950), III, 90 cm, XVIII.
Rahmgelb, olivgoldener Schlund. Dicke, lederartige
Substanz und schöne Form.

'Black Onyx' (USA Schreiner 1958), IV, 70 cm, VI b.
D tiefviolettblaue Seide, H schwarzer Samt einschließ-
lich Bart. Ganz ohne Schlundaderung. Bewährte, schö-
ne Sorte.

'Black Taffeta' (USA Songer 1954), IV, 70 cm, VI b.
Der seidige Glanz dieser schwarzblauen Iris ist von
großer Schönheit. Die Blume ist vollkommen einheit-
lich und hat eine bewegte Form.

'Blue Petticoats' (USA Schreiner 1965), II—III, 70 cm, II a.
Diese Spitzensorte der Plikata hat weißen Grund und
blaue Randzeichnung. Ausgezeichnete Substanz ele-
gante Form und reine Farbe geben dieser Sorte einen
besonderen Charm.

'Blue Sapphire' (USA Schreiner 1953), II—III, 100 cm, IV a.
Eine Spitzensorte, die in USA jahrelang an erster Stel-
le stand. Die elegant bewegten Blüten sind lavendel-
blau und werden von hohen, standfesten und gut ver-
zweigten Stielen getragen. Dykes Medal 1958.

'Bonnie Blue' (USA Sturtevant 1928), III, 80 cm, V a.
Kräftiges Hellblau mit hellem Bart. Kleinblumig aber
überreich blühend.

'Braithwaite' (GB Randall 1952), V, 70 cm, V b.
D himmelblaue Seide, H tief leuchtend blauer Samt.
Reichblühende, späte Gartensorte.

'Brasilia' (USA Schreiner 1961), III, 70 cm, XV.
Schönes, warmes Rotbraun, große Blüten von leder-
ner Substanz an gut verzweigten Stielen. Wüchsige
und sehr empfehlenswerte Sorte.

'Brass Accents' (USA Schreiner 1959), IV, 80 cm, XVI.
Sehr große Bl von einheitlichem Hell-Mittelbraun.

'Bright Hour' (USA Douglas 1952), IV, 80 cm, III a.
Reinweißer D und violette H.

'Buttercup Bower' (USA Tompkins 1961), II—III, 80 cm, XIX.
Kühles Zitronengelb ist eine sehr schöne Gartenfarbe.
Diese Sorte hat Substanz, Form und Verzweigung.

'Captain Gallant' (USA Schreiner 1959), V, 65 cm, XIV.
Die kastanienbraunen Blumen sind ganz eintonig ein-
schließlich Bart und ohne jede Aderung. Eine wüchsi-
ge Sorte, die einen warmen Farbfleck im Garten gibt.

'Cascadian' (USA Linse 1952), III, 80 cm, Ic.
Bläuliches, kaltes Weiß, gute Substanz. Wie bei allen
Weißen, wundervolle Gartenwirkung.

'Cathedral Bells' (USA Wallace 1953), IV, 80 cm, X.
Das Rosa ist sehr zart, aber nicht lachs oder apriko-
sen, sondern echtes Rosa, was sehr selten ist. Hohe,
gut verzweigte Stiele.

'Cayenne Capers' (USA Gibson 1961), II, 70 cm, IIc.
D braun, H auf gelbem Grund dicht braun gestrichelt
und punktiert. Die Ränder sehr samtig. In der Garten-
wirkung braun. Faszinierend bei naher Betrachtung.

'Celestial Glory' (USA Br. Charles 1961), III, 80 cm, XXII b.
Das Orange gelb hat einen lachsigen Schimmer. Eine
ungewöhnliche Farbe. Ausgezeichnete Substanz und
Form.

'Chinquapin' (USA Gibson 1960), III, 70 cm, II c.
Honigbraune Plikata mit gewellten Rändern, zum
Schlund dunklere, braune Tupfen. D Goldbronze, sehr
besondere Sorte.

'Christmas Angel' (USA De Forest 1960), V, 90 cm, Ib
Großblumige, rahmweiße Sorte mit goldgelbem
Schlund. Sehr ähnlich der schönen Patrician. Gute
Verzweigung und Substanz, standfest.

'Cliffs of Dover' (USA Fay 1952), II, 80 cm, Ia.
Bewegte Form, beste Substanz und Verzweigung so-
wie Wüchsigkeit machen diese Sorte zu einer der be-
sten reinweißen. Das kalkige Weiß war die Veran-
lassung für den Namen.

'Confetti' (USA Schreiner 1949), II—III, 90 cm, II b.
Plikata von bester Substanz und Verzweigung. Weiß
bis cremefarbener Grund, darauf hellweinrote Rand-
zeichnung. Reizvoll für sorgfältige Betrachtung.

'Cool Lemonade' (USA Muhlestein 1947), II, 70 cm, XIX.
Helles Zitronengelb mit weißgelbem Bart.

'Corrida' (F Millet 1914), IV—V, 80 cm, IV a.
Viele kleine Blüten in kühlem Hellblau mit blauem
Bart. Reizender, später Massenblüher.

'Crimoline' (USA Schreiner 1965), II, 70 cm, IIb.
Rosenrote Zeichnung auf weißem Grund. Keinerlei
Braun, wodurch die Wirkung frisch ist. Sehr große Bl
von dicker Substanz.

'Crispette' (USA Schreiner 1954), V, 80 cm, XII a.
Weiches, etwas braun getöntes Lila, die hervorragen-
de Substanz ist auffallend. Reich verzweigt, wüchsig,
blühwillig.

'Cross Country' (USA Knocke 1963), III, 90 cm, IV a.
Ausgezeichnete hellblaue Iris mit orangegelbem Bart.
Sehr großblumig und von bester Substanz.

'Dancers Veil' (GB Hutchison 1959), IV, 110 cm, II a.
Diese Plikata mit den vorzüglich verzweigten hohen
Stielen und den wundervoll geformten weißen Blüten
mit blauem Rand, hat in Florenz 1963 den ersten Preis
und in England die Dykes Medal erhalten.

- 'Danube Wave'** (USA Schreiner 1947), III, 100 cm, V a.
Leuchtendes Mittelblau, wenig brauner Schlund, blauer Bart, bewegte Blumen an gut verzweigten Stielen.
- 'Debby Rairdon'** (USA Kuntz 1965), II—III, 70 cm, XX.
Nicht eine gewöhnliche weiß und gelbe Iris, sondern sehr besonders. D eigenartiges metallisches Gelb und H weiße Mitte mit gelbem Rand. Besonders gefällige Form, beste Substanz und alle guten Eigenschaften haben mit Recht zu der Dykes Medal 1971 geführt.
- 'Deep Space'** (USA Tompkins 1961), IV, 85 cm, VI a.
Vollkommen einheitliches Indigoblau, einschließlich Bart. Keinerlei Adern oder Schlundzeichnung. Klassische glatte Form.
- 'Desert Song'** (USA Fay 1946), II—III, 100 cm, XX
Sehr besonderes Hellgelb. Große, feste Blumen schweben an wohlverzweigten Stielen.
- 'Dotted Swiss'** (USA Sass 1956), II—III, 85 cm, II a.
Eine klassische Plikata mit schneeweißem Grund und pastellblauer Randzeichnung. Bewährte Sorte.
- 'Edenite'** (USA Plough 1959), II—III, 60 cm, IX.
Bei dieser nahezu schwarzen Iris ist die Grundfarbe ein braunes Rot, also nicht Blau. Die glatten Bl sind immer noch sehr eindrucksvoll.
- 'Eleanor's Pride'** (USA Watkins 1956), III, 80 cm, IV a.
In allen Teilen hervorragende hellblaue Sorte mit waagerechten, wetterbeständigen Hängeblättern und guter Verzweigung. Dykes Medal 1961.
- 'Elsie May'** (GB Anley 1948), II, 100 cm, VI a.
Eine kräftig wachsende altbewährte Sorte mit samigen blaviolettten Bl. Gute Gartenfarbe.
- 'Elizabeth Noble'** (USA Smith 1955), IV, 70 cm, III a.
D hellstes Lavendelblau, H tief Purpur ohne Aderung. Der helle Bart macht die Farbzusammenstellung noch interessanter. Ausgezeichnete und zuverlässig reichblühende Sorte.
- 'Esther Fay'** (USA Fay 1961), III, 80 cm, X.
Eine der wenigen, sehr guten, reinrosa Sorten. Ausdrucksvoll durch den leuchtend tangerineroten Bart.

Ausgezeichnete Substanz und Verzweigung, leicht gewellte Blumen.

- 'Fairy Rose'** (USA Schreiner 1964), V, 85 cm, VI.
Leuchtendes Cattleyenrosa mit etw. brauner Schlundaderung und tangerinefarbenem Bart. Gut verzweigt, glatte Form.
- 'Firebright'** (USA Craig 1954), IV, 90 cm, XV.
Auffallendes, scharfes Rot mit violett auf den H. Sehr leuchtend und erfolgreiche Annäherung an richtiges Rot.
- 'Fire Chief'** (USA Galyon 1959), V, 100 cm, XXV.
D reines Goldgelb, H warmbrauner Samt und dünner goldener Rand. Keine Schlundaderung.
- 'Fire Magic'** (USA Schreiner 1962), V, 80 cm, XIV.
Glatte Form der dunkelbraunen Bl. Spät und lange blühend.
- 'Flaming Dragon'** (USA Fay 1966), III, 60 cm, XXIII.
Orangenlachsfarben mit krabbrottem Bart. In dieser neuen Farbkasse sicher eine der Besten.
- 'Fluted Haven'** (USA Raynolds 1958), II, 65 cm, Ia.
Eine der wundervollen weißen Sorten, bei denen jede Blume ein Erlebnis ist.
- 'Foamy Wave'** (NL van Veen 1961), IV, 60 cm, V a.
Sehr reines Mittelblau. Kleiner, weißer Fleck auf den waagerechten H. Großblumige Vordergrundsorte, die durch die reine Farbe auffällt.
- 'Frau Else Thiel'** (D von Martin 1960), IV, 85 cm, XIX.
Hell kanariengelb mit etwas weiß unterhalb des hellgelben Bartes. D gewellt, fest geschlossen, H schwebend mit stark gewelltem Rand. Wüchsige, gute Gartensorte.
- 'Frenchi'** (USA Jones 1959), II—III, 50 cm, XIII.
D lilarosa, H leuchtendes Purpurrot, von dem sich der tangerinefarbene Bart gut abhebt. Auffallende Farbzusammenstellung! Gehört zu den „Border-Iris“, also niedrige Vordergrundsorte.

- 'Frost and Flame'** (USA Hall 1957), III, 85 cm, I d.
Eine Aufsehen erregende und vielbegehrte Iris. Kaltes bläuliches Weiß mit leuchtend rotem Bart.
- 'Frühlingskleid'** (D Steffen 1949), II—IV, 90 cm, II b.
D und H haben leuchtend karminrote Randzeichnung auf weißer Mitte. Frische Plikata von bester Gartenwirkung. Reich- und langblühend.
- 'Fuchsjagd'** (D von Martin 1963), III, 80 cm, XIV.
Sehr einheitliches, richtiges Fuchsrot, nicht dunkel und ohne Samt. Mittelgroße Blüten, gut verzweigt. Auffallende Farbe. Bekam 1961 in Florenz den Preis der Stadt für die beste rote Iris.
- 'Fuji's Mantle'** (USA Schreiner 1966), IV, 70 cm, III a.
Weißer Dom und hellblaue H, deren Mitte weiß ist. Durch die Farbzusammenstellung und schwebende Form eine ganz neuartige Iris. Einzigartig schön!
- 'Gala Finale'** (USA De Forest 1950), IV, 70 cm, I c.
Tief kastanienbraune Zeichnung auf goldgelb. Dramatische Steigerung von Firecracker.
- 'Gay Lavinia'** (USA Schreiner 1954), IV, 100 cm, I d.
Frostiges Schneeweiß, von dem sich der tangerinefarbene Bart scharf abhebt.
- 'Gay Lights'** (USA Schreiner 1965), III, 80 cm, XVI.
Eine sehr ungewöhnliche Sorte, deren D braun ist und die H metallisch Gold sind mit braunem Rand. Etwas ganz Besonderes!
- 'George Specht'** (GB Fletcher 1964), II—III, 80 cm, VIII b.
Die veilchenblauen Blüten haben gute Substanz und überraschenderweise ein echtes Blau am Schlund. Sehr schöne Form und gute Verzweigung. Hervorragende Gartenwirkung!
- 'Gold Anthem'** (USA Douglas 1954), IV, 90 cm, XXII a.
Goldgelb, H hellere Mitte. Wertzeugnis der Deutschen Gartenbau Gesellschaft 1964.
- 'Golden Alps'** (GB Brummit 1955), III—IV, 70 cm, III b.
D weiß mit gelblicher Mitte, H scharf grüngelb. Englische Dykes Medal 1957.
- 'Golden Garland'** (USA Hall 1957), III, 80 cm, XXI.
Auf schneeweißem Grund, goldene bewegte Ränder. Große eindrucksvolle Blüten.
- 'Golden Spice'** (USA Muhlestein 1960), III, 70 cm, II c.
Frischgelbe Plicata. Reichblühend, gut verzweigt.
- 'Golden Sunshine'** (USA Schreiner 1952), III, 90 cm, XXI.
Hervorragende Sorte in klarem Gelb von besonderer Eigenart. Wüchsig.
- 'Goldfackel'** (D Steffen 1948), III, 90 cm, XXII a.
Gute, goldgelbe Sorte.
- 'Gracie Pfost'** (USA E. Smith 1961), III, 80 cm, XVII.
Riesige Blumen von eigenartigem Rosenholzbraun.
- 'Granada Gold'** (USA Schreiner 1962), II—III, 80 cm, XXII b.
Das ganz tiefe, reine Gelb ist eine der wichtigsten Gartenfarben. Hier ist die Intensität ganz besonders.
- 'Green Quest'** (USA R. Brown 1960), III—IV, 75 cm, XIX.
Wundervolles, eigenartiges Grüngelb mit metallischem Glanz. Noble Form.
- 'Gypsy Jewels'** (USA Schreiner 1963), III, 80 cm, XIV.
Sicher eine der besten braunroten Iris mit seidigem Glanz und breiten H. AM 1966.
- 'Happy Birthday'** (USA Hall 1952), III, 70 cm, X.
Manchmal entdeckt man erst nach Jahren die guten Eigenschaften einer Sorte. Diese alte rosa Irist ist eine der berühmtesten Hall'schen Züchtungen. Sie ist wüchsig und die Farbe ist gut.
- 'Harbor Blue'** (USA Schreiner 1954), II—III, 110 cm, IV b.
Sehr große, hellblaue Blüten mit wenig heller Schlundzeichnung und hellem Bart. Hervorragend wüchsig, reichblühend und von bester Substanz.
- 'Harriet Thoreau'** (USA Cook 1944), III—IV, 90 cm, XI.
Rosalila, rosébraune Adern am Schlund.
- 'Headlines'** (GB Brummit 1954), V, 70 cm, III a.
D bläuliches Weiß, H pflaumenfarbig. Englische Dykesmedal 1959.

- 'Heartbreaker'** (USA Hall 1964), IV, 80 cm, X.
Auf der Suche nach wüchsigen, rosa Sorten bin ich auf diese gekommen. Es ist ein richtiges Rosa mit tangerinefarbigem Bart. Sie ist reichblühend und gut verzweigt.
- 'Helen Collingwood'** (USA Smith 1949), IV—V, 90 cm, III a.
D hellstes Lavendel, H samtig violettrot.
- 'Henry Shaw'** (USA Benson 1959), III, 100 cm, Ia.
Große, sehr elegante, weiße Blüten mit grüner Rückseite. Eine weiße Spitzensorte.
- 'Hephaistos'** (D von Martin 1964), IV, 90 cm, XV.
Eine kupferrote Sorte mit großen, gewellten Blüten von fester Substanz. D gewölbt und fest geschlossen, H horizontal. Wächst stark und blüht reich und regelmäßig. Erhielt 1964 den Preis der Stadt Florenz für die beste rote Iris.
- 'Hermann Hesse'** (D Werckmeister 1960), II-III, 130 cm, XVIII.
Auf riesigen Stielen große Blüten in weichem Bronze-gelb. Imposante Erscheinung. Die Sorte wurde mit Genehmigung des Dichters nach ihm benannt, angeregt durch sein Märchen „Iris“.
- 'High Above'** (USA De Forest 1961), III, 100 cm, IVa.
Eine himmelblaue Iris von ausgesprochenem Zauber. Viele Blumen voller Grazie an jedem Stiel.
- 'High Command'** (GB Long 1945), IV, 80 cm, XXV.
D bronzegelb, H warm kastanienbraun.
- 'High Praise'** (USA Schreiner 1966), III—IV, 70 cm, Va.
Eine wundervolle, mittelblaue Iris für hohe Ansprüche. Die tiefe Verzweigung fällt auf.
- 'Himmlisches Blau'** (USA Schreiner), 80—100 cm, IV a.
Bei meinem Besuch bei Schreiner haben mich die wundervollen hellblauen Sämlinge immer wieder entzückt. Einige davon konnte ich mir aussuchen. Dies sind sie: Großblumig, von bester Form und gleichwertig den besten Sorten.
- 'Indianerblut'** (USA Schreiner), 80—90 cm, XIv.
Die verschiedenen rotbraunen Klone, die ich bei

Schreiner aussuchte, sind mindestens so gut wie manche der neuesten Sorten.

- 'Irenka'** (CSSR Blazek 1966), IV, 80 cm, Ia.
Schneeweiß mit wenig grüngelb am Schlund. Überaus reichblühende und harte Sorte.
- 'Jane Philipps'** (USA Graves 1950), III, 80 cm, IV a.
Sehr große, hellblaue Blüten von bester Form. Beliebte Sorte.
- 'Jessie Viette'** (USA Randolph 1960), III, 80 cm, XXI.
D elfenbeinweiß, H mittelgelb. Überreich blühend.
- 'Jungle Fires'** (USA Schreiner 1960), II—III, 70 cm, XIV.
Ganz einheitlich braunrot, ohne jede Aderung. Seidige, glatte Blüten.
- 'Karin von Hugo'** (D von Martin 1962), III, 70 cm, X.
Auffallend durch die leuchtende Farbe. Rosa mit Lachsschein. Viele große Blüten an gut verzweigten Stielen. Zuverlässige Sorte. Auch für rauhe Gegenden.
- 'Krönungsmantel'** (D von Martin 1962), III, 85 cm, IX c.
Die Zahl der weinroten Iris-Sorten ist klein. Form und Substanz sind gut, die ganze Blüte leicht gewellt. Wüchsig!
- 'Lambent'** (GB Long 1948), IV, 90 cm, XXV.
D leuchtendes Hellgelb, H samtig braunrot mit goldenem Rand.
- 'Lavanesque'** (USA Schreiner 1953), V, 85 cm, XI.
Leuchtend orchideenrosa, zum Schlund etwas braun.
- 'Lavish Lady'** (USA Buttrick 1954), III, 70 cm, VIII a.
Richtiges Lila ist eine Farbe, die man selten bei Iris findet. Die Form der Blumen ist sehr schön und die Substanz bestens.
- 'Lebensfreude'** (D Steffen), II, 70 cm, II c.
D grünlich Bronze, H weißer Spiegel. Hübsche, frische, gelbe Plikata.
- 'Lela Dixon'** (USA Douglas 1949), II—III, 90 cm, II a.
Plikata von sehr reinem Blau. Etwas dunkler als Blue Shimmer.

- 'Lemon Mint'** (USA Schreiner 1963), II—III, 70 cm, XIX.
Klares frisches Mittelgelb, H etwas weiß in der Mitte.
Sehr hübsche bewegte Form und gute Gartenwirkung.
stark gewelltem Rand. Vordergrundsorte. Sehr reich
und lange blühend.
- 'Licorice Stick'** (USA Schreiner 1961), V, 100 cm, VI b.
Die höchste der schwarzvioletten Iris! Sehr seidig,
blauer Bart. Sehr eindrucksvoll!
- 'Lilac Festival'** (USA Plough 1959), II—III, 70 cm, VIII a.
Ganz eintonig, einschließlich Bart. Die großen, lila
Blüten von klassischer Form und mit silbrigem Schim-
mer sind festlich.
- 'Limelight'** (USA Hall 1952), III, 80 cm, XIX
Das weiche Gelb ist von besonderer Tönung und wird
durch den tief orangefarbenen Bart belebt. Blütenrän-
der stark gekraust. Beste Substanz und Haltung.
- 'L'Litta'** (USA Tams 1961), III, 60 cm, X.
Die Reichblütigkeit dieser Sorte fällt auf. Ein hüb-
sches helles Lachsrosa macht die Blüten sehr anspre-
chend. Waagerechte H. Ausgezeichnete Substanz.
- 'Lothario'** (USA Schreiner 1942), III, 90 cm, IX b.
D seidig violett, H tiefer, purpurfarbener Samt.
- 'Louis Bel'** (F Denis 1925), II—IV, 60 cm, IXc.
Eine der alten französischen Sorten, die einen eigen-
en Charakter hat. D dunkelviolett, H schmal, lang
und schwarz.
- 'Lugano'** (F Cayeux), II, 80 cm, I b.
Elfenbeinweiß mit zitronengelbem Schlund. Besonde-
rer Zauber und sicherer Herbstblüher.
- 'Lula Marguerite'** (USA De Forest 1956), IV, 120 cm, XXIV.
Silbrig grau mit gewelltem, olivgoldenem Rand und
goldenem Schlund. Besonders!
- 'Majestoso'** (USA Schreiner 1967), III—IV, 100 cm, VI a.
Einer der Schreiner'schen Sämlinge, die ich dort aus-
gesucht habe und dem ich mit Genehmigung des Züch-
ters einen Namen gegeben habe. Ganz einheitliches
dunkel violettblau. Herrliche und großartige Iris mit
allen guten Eigenschaften, die man sich wünscht.
- 'Margarete Gräfin von Kirchbach'** (D von Martin 1962), V,
75 cm, XX.
D reines Gelb, H weiße Mitte mit gelbem Rand. Be-
wegte Form und gekrauste Ränder bei ausgezeichne-
ter Substanz. Eine wundervolle frische Farbe, die
überzeugend jeden anspricht.
- 'May Magic'** (USA Schreiner 1956), IV—V, 80 cm, XI.
Zartes Lilarosa, hellgelber Schlund und Bart. Die Blu-
menränder sind stark gefranst.
- 'Meissner Porzellan'** (D Janssen 1947), IV, 70 cm, IV b.
D lavendel, H waagrecht mittelblau mit hellerem,
stark gewelltem Rand. Vordergrundsorte.
- 'Menuett'** (USA Schreiner 1967), III, 90 cm, II a.
Diese Plicata habe ich 1967 bei Schreiner ausgesucht.
Sie hat sich seitdem so gut bewährt und fällt Experten
und Laien immer wieder durch ihre Qualität und den
besonderen Charm auf. Der schneeweiße Grund hat
einen ganz gleichmäßigen, mittelblauen Rand. Die
Stempelblätter sind blau, was sehr ausdrucksvoll ist.
Sehr breite H, beste Form, Substanz und Verzwei-
gung.
- 'Milestone'** (USA Plough 1965), II, 70 cm, XXV.
D chartreusegrün gelb, H rotes Violett mit scharf blau-
er Mitte, von der sich der gelbe Bart abhebt. Eine
extravagante Schönheit!
- 'Millionaire'** (USA Brizendine 1958), V, 70 cm, XVII.
Diese späte goldbraune Iris hat sich als wüchsig er-
wiesen. Reich verzweigt.
- 'Miss Indiana'** (USA Cook 1961), III, 80 cm, III a.
Es war zu erwarten, daß die Aufsehen erregende Sor-
te Whole Cloth noch verbessert würde. Miss Indiana
ist eine davon. Der D ist reinweiß und die H sind kla-
res, kräftiges Hellblau.
- 'Moonlight Sonata'** (NZ Stevens 1946), IV, 80 cm, XXI.
Kühles Mittelgelb, einschließlich Bart. Von sehr beson-
derer Note. Wüchsig und gut.
- 'Mystic Melody'** (NZ Stevens 1951), IV—V, 90 cm, XXI.
D edles Cremegelb, H tief goldgelb. Besonders reich-
blühende und wüchsige Sorte mit hervorragender
Gartenwirkung.

- 'New Snow'** (USA Fay 1946), III—IV, 120 cm, I a.
Riesige, schneeweiße Blumen von bewegter Form.
Wundervolle alte Sorte, die auch zum Schnitt herrlich ist.
- 'Nightfall'** (USA Hall 1942), III, 80 cm, VI a.
D veilchenblau, H tiefer Samt. Ausgezeichnete Gartensorte.
- 'Night Song'** (USA Lühn 1965), IV, 90 cm, IX a.
Sehr große, nachtblaue Blüten an gut verzweigten Stielen. Überaus wüchsig und reichblühend.
- 'Ola Kala'** (USA Sass 1943), IV—V, 90 cm, XXII a.
Hervorragende, tief goldgelbe Sorte in der späten Zeitgruppe.
- 'Olympic Torch'** (USA Schreiner 1958), V, 80 cm, XVII.
Große Blumen in Goldbronce. Eine Farbe, die bestechend ist. Sehr gut verzweigt.
- 'Oma's Sommerkleid'** (D von Martin 1962), III-IV, 80 cm, XXIV
Hanffarben mit großem lila Fleck auf den H. Aparte, neuartige Farbe. Blüten elegant gekraust und von guter Form. Reichblühende, interessante Sorte.
- 'One Desire'** (USA Shoop 1960), II—III, 70 cm, X.
Das echte Rosa ist auch unter den neuen Iris selten. Hier ist eine Sorte, die weder bläulich noch aprikosenrosa ist, sondern ein wirkliches, reines Rosa. Die Blüten sind glatt und von guter Substanz. Die Sorte gilt als eine der besten.
- 'Parc de Neuilly'** (F Verdier 1910), II—IV, 70 cm, VIII b.
Eintonig mittelviolet. Reichblühende diploide Iris.
- 'Phébus'** (F Cayeux 1930), IV, 90 cm, XX.
Lichtes Hellgelb. Unverwüstlicher Massenblüher.
- 'Pierre Menard'** (USA Faught 1948), IV, 90 cm, V a.
Wundervolles Mittelblau, hellgelber Bart. Glatte Form und schwebende H. Klassische und ausgezeichnete Sorte.
- 'Pink Fringe'** (USA Rudolph 1967), V, 60 cm, X.
Das Rosa dieser Sorte hat einen zarten blauen Schein und ist daher ganz anders als die anderen. Ein neuer Farbton. Die Blütenränder sind stark gekraust.

- 'Pink Plume'** (USA Schreiner 1951), III—IV, 80 cm, XI.
Rosigste der Cattleyenfarbigen von bester Verzweigung und sehr reich blühend.
- 'Pinnacle'** (NZ Stevens 1949) IV—V, 80 cm, III b.
D kreidig weiß, H klares Hellgelb ohne Zeichnung. Sehr besonders!
- 'Pinnacle-Auslese'** (D Zeppelin) 70—90 cm, III b.
Aus Kreuzungen von Pinnacle und Mystic Melody oder Summit entstanden eine Reihe schöner Sämlinge mit schneeweißem oder hellgelbem D und goldgelben H. Nach sorgfältiger Auslese kann ich einige anbieten, die in jeder Weise gut sind. Diese frische Farbkombination hat einen ganz besonderen Reiz und ist von bester Gartenwirkung.
- 'Pinwheel'** (USA Schreiner 1962), III, 70 cm, II b.
Die ganzen Blüten sind dicht durchzogen von braunroten Adern. Sehr waagerechte Haltung.
- 'Pompano Peach'** (USA Schreiner 1963), II, 70 cm, XXIII.
Auffallende Aprikosenfarbe, die sehr ansprechend ist.
- 'Prince Indigo'** (USA Schreiner 1964), V, 100 cm, VIII b.
Blauer Bart auf riesigen violettblauen Bl. Sehr imposant.
- 'Quicksilver'** (USA Schreiner 1953), III, 90 cm, IV b.
Hier hat das kräftige Hellblau einen gedämpften, metallischen Ton, der sehr besonders ist.
- 'Radiant Apogee'** (USA Gibson 1966), III, 70 cm, IIc.
Eine goldgelbe Plicata, deren D ziemlich einfarbig ist. Die H haben eine weiße Mitte, deren Ränder gelb und zum Schlund braun gepunktet sind.
- 'Rainbow Gold'** (USA Plough 1960), III, 80 cm, XXII.
Reines Goldgelb der großen Bl mit orangerotem Bart. Beeindruckende Sorte.
- 'Raspberry Ribbon'** (USA Schreiner 1951), II—III, 80 cm, II b.
Wesentliche Verbesserung von Minnie Colquitt. B helles Weinrot, H weißer Spiegel.
- 'Raspberry Ripples'** (USA Niswonger 1969), III, 80 cm, XIII.
Ein wichtiger Fortschritt in der seltenen Farbkategorie der maulbeerroten Iris, die viel Anerkennung findet. Sehr effektiv im Garten. Gut verzweigt und wüchsig, dunkelgrünes Laub.

- 'Rheingaupele'** (D G & K 1924), III—IV, 100 cm, XI.
Eine der sehr reichblühenden alten diploiden Sorten mit lilarosa Blüten. Anspruchslos und zuverlässig.
- 'Rheintraube'** (D G & K 1919), V, 80 cm, V b.
Kleine und reichblühende, späte Sorte. D lavendel, H dunkel violettblau.
- 'Ribbon Round'** (USA Tompkins 1963), II—III, 85 cm, II a
Sehr sauberer, hellblauer Rand der schneeweißen Blüten. Spitzenrote der Plikata.
- 'Rippling Waters'** (USA Fay 1961), III, 90 cm, IVa.
Zartes Blau mit rosigem Schimmer, von dem der tangerinefarbige Bart sich gut abhebt. Erhielt Dykes Medal 1966.
- 'Rococo'** (USA Schreiner 1960), II, 80 cm, II a
Schneeweißer Grund, von dem sich die kräftig blauen, stark gewellten Ränder gut abheben. AM 1962.
- 'Rosenquarz'** (D Werckmeister 1960), III, 90 cm, X.
Große, wohlgeformte Blüten in sehr reinem Rosa mit tangerinefarbenem Bart. Wüchsiger als viele der amerikanischen Sorten und daher besonders wertvoll.
- 'Rosy Veil'** (USA Sass 1953), III, 80 cm, II b.
Schneeweiße Plikata mit zarter Randzeichnung in rosigem Lila. Ausgezeichnete Form und Substanz der eleganten Blüten.
- 'Ruby Mine'** (USA Schreiner 1962), IV—V, 90 cm, XIV.
Tief blutrote Seide, H sehr samtig und goldgelber Bart. Bleicht in der Sonne nicht aus. Ausgezeichnete rote Sorte.
- 'Rusticana'** (USA Schreiner 1961), IV, 80 cm, XVI.
Einheitliches, kupfriges Braun mit metallischem Schimmer. Bewegte Form, sehr gute Substanz. Von den edlen braunen Sorten eine der wüchsigsten.
- 'Sable'** (USA Cook 1938), II—III, 100 cm, VI b.
Tiefstes Violettblau, H schwarz, stahlblauer Bart.
- 'Sable Night'** (USA Cook 1952), III, 80 cm, IX a.
Die berühmte schwarze Iris mit rotem Unterton, die 1955 die Dykes Medal bekam.

- 'Soaring Kite'** (USA Nelson 1958), IV, 95 cm, XX.
Kühles Rahm- bis Primelgelb. Elegante, bewegte Blüten an hohen Stielen. Vielgerühmte Sorte.
- 'Southern Comfort'** (USA Hinkle 1965), II, 120 cm, XVIII.
Elfenbein, zur Mitte mehr gelb. Wunderschöne, ansprechende Blume an gut verzweigten, sehr hohen Stielen, die sich hier bei einem Orkan als standfest erwiesen haben.
- 'Sparkling Waters'** (USA Schreiner 1960), IV, 75 cm, IVa.
Das Hellblau hat in der Mitte der H eine weiße Zone und weißen Bart. Wundervoll bewegte Form vereinigt Grazie und üppige Großblumigkeit.
- 'Spring Festival'** (USA Hall 1958), V, 70 cm, X.
Echtes, zartes Rosa. Große bewegte Blumen von guter Substanz.
- 'Stardom'** (USA Hall 1941), IV, 70 cm, XVI.
Diese alte, mittelbraune Züchtung ist zuverlässig und reichblühend, was leider so manche der schönen, neuen, braunen Sorten nicht sind.
- 'Staten Island'** (USA Smith 1947), V, 90 cm, XXV.
Eine alte Variegata, die mir immer noch kulturwürdig scheint. D goldgelb, H braunrot mit goldenem Saum.
- 'Stepping Out'** (USA Schreiner 1964), IV, 80 cm, II a.
Die sensationelle Plicata, die die Dykesmedal 1968 erhielt. Auf reinweißem Grund dunkelviolette Randzeichnung. Ganz dicke feste Substanz der wohlgeformten Blüten. Die gutverzweigten Stiele sind ein großartiger Effekt.
- 'Summer Song'** (USA Nesmith 1951), IV, 60 cm, XVI.
Ganz einheitlich schönes Bronzebraun.
- 'Sunsite'** (USA Plough 1964), IV, 70 cm, XXII.
Eine ausgezeichnete goldgelbe Iris mit breitem orange Bart.
- 'Symphony'** (USA Hinkle 1958), V, 85 cm, IVa.
Immer wieder ist man bezaubert von hellblauen Iris. Hier ist die ganze Blume durchzogen von etwas dunkleren Adern. Gute Substanz und Verzweigung.

- 'Taholah'** (USA Gibson 1956), II—III, 70 cm, IIc.
Der Grund dieser Plicata ist rahmgelb, wobei der D dicht rosenholzbraun belegt ist und die gleiche Farbe den Rand der H umgibt.
- 'Tall Chief'** (USA De Forest 1956), III, 80 cm, XIV.
Ausgezeichnete und bewährte braunrote Iris, die sehr empfehlenswert ist.
- 'Techy Chimes'** (USA Brother Charles 1955), III, 70 cm, XXIIa
Ein leuchtendes, klares Gelb wird durch einen orange bis tangerinefarbigen Bart belebt.
- 'Toelleturm'** (D Arends 1930), III, 60 cm, III a.
D schneeweiß, H violett, stark weiß geadert und weisser Rand. Kleinblumig.
- 'Toll Gate'** (USA Cook 1959), III, 90 cm, V b.
Hier ist eine zweitonige Iris mit einem ganz neuen Charakter. Hellblauer D u. tief violette H. Hellblauer Schlund. Das alles klingt garnicht besonders, aber es ist anders!
- 'Top Favorite'** (USA Schreiner 1957), V, 80 cm, XI.
Lilarosa von bester Form und lederartiger Substanz. Leicht bewegte Ränder machen die Blüte elegant.
- 'Tranquility'** (USA Fay 1960), IV, 100 cm, I a.
Mit Recht heißt diese Sorte Ruhe, da die harmonischen glatten Blüten in Schneeweiß eine absolute Gelassenheit ausströmen.
- 'Tulare'** (USA Hamblen 1961), II, 50 cm, XXIIa.
Spitzensorte in der Klasse der Vordergrundiris. Reines Goldgelb mit orange Bart. Form, Substanz und Verzweigung sind ausgezeichnet.
- 'Tuxedo'** (USA Schreiner 1965), III, 80 cm, VIb.
Ganz tiefes Blauschwarz von wundervoller samtiger Substanz. Gut verzweigt.
- 'Tyrolean Blue'** (USA Schreiner 1963), IV, 70 cm, V a.
Sehr reines leuchtendes Mittelblau, was durch die braunen Schultern eine besondere Note bekommt. Ausgezeichnete Substanz der großen Blüten. Wer etwas besonderes sucht, sollte diese Iris wählen.

- 'Vitafire'** (USA Schreiner 1968), III, 70 cm, XIV.
Hervorragende, warm dunkelbraune Sorte ganz ohne Adern und vollkommen einheitlich. Große elegante Blüten von seidigem Glanz.
- 'Wabash'** (USA Williamson 1936), IV, 110 cm, III a.
Schneeweißer D, seilchenblaue H mit weißem Rand. Dykes Medal 1940.
- 'Wayward Wind'** (USA Barker 1958), II—III, 70 cm, XVI.
Goldbronce mit grünlichem Anflug, ganz eintonig einschließlich Bart. Klassische Form.
- 'Wenatchee Skies'** (USA Noyd 1963), IV, 60 cm, IVa
Eine der hellblauen Sorten, die etwas blauer ist als die meisten und zugleich alle modernen Eigenschaften einer guten Iris hat.
- 'White Knight'** (USA Sanders 1916), II—IV, 60 cm, I a.
Ausgezeichnete, schneeweiße Gruppensorte für den Vordergrund.
- 'Whole Cloth'** (USA Cook 1958), II—III, 70 cm, IIIa.
Reinweißer, fester Dom und hellblaue, waagrechte H. Zu seiner Zeit eine sensationelle Züchtung, die Weltruf errang. Premio Firenze 1961 und Dykes Medal 1962.
- 'Wiener Walzer'** (USA Schreiner), 80—100 cm, II a.
Beschwingte, dunkelblaue Plicata ähnlich 'Stepping Out'. Verschiedene schöne Klone, die ich ausgesucht habe und die sich seit Jahren als sehr wüchsig erwiesen haben.
- 'Wild Ginger'** (USA Gibson 1962), III, 70 cm, II c.
Eine der bekannten Plicata von Gibson. D braun, H creme. Grund dicht besät mit braunen Punkten.
- 'Wine and Roses'** (USA Hall 1963), III, 70, XII a.
D rosenrosa, H tief samtig weinrot mit etwas rosa Rand. Ganz neue Farbkombination!
- 'Winter Carnival'** (USA Schreiner 1941), III—IV, 110 cm, I b.
Große, schneeweiße Blüten von bester Substanz. Gelber Schlund und Bart.
- 'Yellow Moon'** (USA Sturtevant 1923), III—IV, 70 cm, XVIII.
Rahmgelber, zuverlässiger Massenblüher.
- 'Zitronencreme'** (D Schwarz), IV, 90 cm, XIX.
Reichblütige, wüchsige Sorte in frischem Gelb.

Iris Barbata Intermedia-Gruppe und Iris Barbata Elatior-Gruppe

Einteilung nach Farben

J = Iris Intermedia, die alphabetisch in einer gesonderten Gruppe zusammengefaßt sind.

Blütezeitgruppen:

I = sehr früh, intermedia, Anfang Mai
 II = früh, Anfang bis Mitte Mai
 III = mittel, Mitte Mai bis Ende Mai

IV = spät, Ende Mai
 V = sehr spät, Ende Mai bis Anfang Juni

| Name | Höhe | Blütezeit- | DM |
|------|-------|------------|----|
| | in cm | gruppe | |

I. Weiß

a) Reinweiß

| | | | |
|-------------------|-----|--------|------|
| 'Cliffs of Dover' | 80 | III | 4,50 |
| J 'Cloud Fluff' | 40 | I | 4,50 |
| 'Fluted Haven' | 65 | II | 5,— |
| 'Henry Shaw' | 100 | III | 6,— |
| 'Irenka' | 80 | IV | 4,50 |
| 'New Snow' | 120 | III—IV | 2,80 |
| 'Tranquility' | 100 | IV | 3,— |
| 'White Knight' | 60 | III—IV | 2,50 |

b) Weiß, gelblich getönt oder gelber Schlund

| | | | |
|-------------------|----|------|------|
| J 'Alaska' | 60 | I—II | 2,50 |
| 'Christmas Angel' | 90 | V | 5,— |

| Name | Höhe | Blütezeit- | DM |
|------|-------|------------|----|
| | in cm | gruppe | |

| | | | |
|-------------------|-----|--------|------|
| 'Lugano' | 80 | II | 2,80 |
| 'Winter Carnival' | 110 | III—IV | 2,80 |

c) Weiß, bläulich getönt

| | | | |
|-------------|----|------|------|
| 'Cascadian' | 80 | III | 5,— |
| J 'Cutie' | 40 | I—II | 4,50 |
| J 'Tamino' | 50 | I—II | 4,50 |

d) Weiß mit rotem Bart

| | | | |
|-------------------|-----|-----|------|
| 'Frost and Flame' | 85 | III | 4,50 |
| 'Gay Lavinia' | 100 | IV | 3,50 |

II. Gestrichelte und punktierte Plicata

a) Grund weiß, Zeichnung blau oder violett

| | | | |
|-------------------|----|--------|-----|
| 'Blue Petticoats' | 70 | II—III | 8,— |
|-------------------|----|--------|-----|

| Name | Höhe | Blütezeit- | DM |
|------|-------|------------|----|
| | in cm | gruppe | |

| | | | |
|-----------------|-----|--------|------|
| 'Dancers Veil' | 110 | IV | 6,— |
| 'Dotted Swiss' | 85 | II—III | 4,50 |
| 'Lela Dixon' | 90 | II—III | 2,50 |
| 'Menuett' | 90 | III | 15,— |
| 'Ribbon Round' | 85 | II—III | 8,— |
| 'Rococo' | 80 | II | 6,— |
| 'Stepping Out' | 80 | IV | 9,— |
| 'Wiener Walzer' | 90 | III—IV | 8,— |

b) Grund weiß, Zeichnung rosa od. rot

| | | | |
|------------------|----|--------|------|
| 'Confetti' | 90 | II—III | 2,50 |
| 'Crinoline' | 70 | II | 10,— |
| 'Frühlingskleid' | 90 | II—IV | 2,50 |
| 'Pinwheel' | 70 | III | 5,— |

| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

b) Grund weiß, Zeichnung rosa od. rot

| | | | |
|--------------------|----|--------|------|
| 'Raspberry Ribbon' | 80 | II—III | 3,30 |
| 'Rosy Veil' | 80 | III | 4,— |

c) Grund gelb, Zeichnung rot od. braun

| | | | |
|------------------|----|--------|------|
| 'Cayenne Capers' | 70 | II | 5,— |
| 'Chinquapin' | 70 | III | 4,50 |
| 'Gala Finale' | 70 | IV | 3,50 |
| 'Golden Spice' | 70 | III | 5,— |
| 'Lebensfreude' | 70 | II | 2,80 |
| 'Radiant Apogee' | 70 | III | 12,— |
| 'Taholah' | 70 | II—III | 4,50 |
| 'Wild Ginger' | 70 | III | 6,— |

III. Zweifarbige mit weißem Dom

a) Hängeblätter blau bis violett

| | | | |
|-----------------|-----|--------|------|
| 'Bright Hour' | 80 | IV | 3,— |
| 'Fuji's Mantle' | 70 | IV | 15,— |
| 'Headlines' | 70 | V | 4,— |
| 'Miss Indiana' | 80 | III | 9,— |
| 'Toileturm' | 60 | III | 2,50 |
| 'Wabash' | 110 | IV | 2,50 |
| 'Whole Cloth' | 70 | II—III | 5,— |

b) Hängeblätter gelb

| | | | |
|-----------------|-------|--------|------|
| 'Golden Alps' | 70 | III—IV | 4,50 |
| 'Pinnacle' | 80 | IV—V | 4,50 |
| 'Pinn.-Auslese' | 70—90 | | 4,— |

| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

IV. Hellblau

a) Sehr helles Blau

| | | | |
|--------------------|--------|--------|------|
| 'Babbling Brook' | 80 | III | 15,— |
| 'Blue Sapphire' | 100 | II—III | 3,30 |
| 'Corrida' | 80 | V | 2,50 |
| 'Cross Country' | 90 | III | 6,— |
| 'Eleanors Pride' | 80 | III | 4,— |
| 'High Above' | 100 | III | 6,— |
| 'Himml. Blau' | 80—100 | III | 10,— |
| 'Jane Phillips' | 80 | III | 3,— |
| 'Rippling Waters' | 90 | III | 9,— |
| 'Sparkling Waters' | 75 | IV | 4,50 |
| 'Symphony' | 85 | V | 4,— |
| 'Wenatchee Skies' | 60 | IV | 12,— |

b) Tieferes Hellblau

| | | | |
|---------------------|-----|--------|------|
| J 'Andalusian Blue' | 70 | I—II | 2,50 |
| J 'Drummer Boy' | 50 | I—II | 7,50 |
| 'Harbor Blue' | 110 | II—III | 4,— |
| 'Meissn. Porzellan' | 70 | IV | 2,50 |
| 'Quicksilver' | 90 | III | 2,80 |

V. Mittelblau

a) Eintönig

| | | | |
|---------------|-----|-----|------|
| 'Bonnie Blue' | 80 | III | 2,50 |
| 'Danube Wave' | 100 | III | 2,80 |
| 'Foamy Wave' | 60 | IV | 5,— |

| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

| | | | |
|-----------------|----|----|-----|
| 'High Praise' | 70 | IV | 9,— |
| 'Pierre Menard' | 90 | IV | 4,— |
| 'Tyrolean Blue' | 70 | IV | 7,— |

b) Zwei Töne

| | | | |
|--------------------|----|------|------|
| 'Braithwaite' | 70 | V | 4,50 |
| 'Elizabeth Noble' | 70 | IV | 4,— |
| 'HelenCollingwood' | 90 | IV—V | 3,50 |
| 'Rheintraube' | 80 | V | 2,50 |
| 'Toll Gate' | 90 | III | 4,50 |

VI. Dunkelblau und Schwarzblau


a) Dunkelblau

| | | | |
|--------------|-----|--------|------|
| 'Allegiance' | 100 | IV | 4,50 |
| 'Deep Space' | 85 | IV | 6,— |
| 'Elsie May' | 100 | II | 2,80 |
| 'Majestoso' | 100 | III—IV | 12,— |
| 'Nightfall' | 80 | III | 2,80 |


b) Schwarzblau

| | | | |
|------------------|-----|--------|------|
| 'After Dark' | 90 | II | 6,— |
| 'Black Onyx' | 70 | IV | 4,50 |
| 'Black Taffeta' | 70 | IV | 5,50 |
| 'Licorice Stick' | 100 | V | 7,— |
| 'Sable' | 100 | II—III | 2,80 |
| 'Tuxedo' | 80 | III | 8,— |

Iris sibirica sind auch hübsch für Sträuße. **'Caesars Brother'** ist die dunkelste, **'My Love'** hellblau, **'Tunkhannock'** weiß.




Papaver orientale 'Frührot'. Ein guter Partner zu frühem Rittersporn.



Iris 'Gay Lights'.

Iris 'Licorice Stick'. Ähnlich sind die Sorten 'Black Taffeta' und 'Dark Fury'.



| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

VIII. Lila und Mittelviolet

a) Lila

| | | | |
|------------------|----|--------|------|
| 'Amethyst Flame' | 80 | III—IV | 5,— |
| J 'First Lilac' | 45 | I | 4,— |
| 'Lavish Lady' | 70 | III | 5,50 |
| 'Lilac Festival' | 70 | II—III | 7,— |

b) Mittelviolet

| | | | |
|-------------------|-----|--------|------|
| 'George Specht' | 80 | II—III | 5,— |
| J 'Marine Wave' | 70 | I—II | 2,50 |
| 'Parc de Neuilly' | 70 | II—IV | 2,50 |
| 'Prince Indigo' | 100 | V | 9,— |

IX. Dunkelviolet

a) Eintönig

| | | | |
|------------------|----|--------|------|
| 'Edenite' | 60 | II—III | 6,— |
| J 'Maroon Caper' | 50 | I—II | 5,50 |
| 'Night Song' | 90 | IV | 10,— |
| 'Sable Night' | 80 | III | 5,— |

b) Zwei Töne

| | | | |
|------------|----|-----|------|
| 'Lothario' | 90 | III | 2,80 |
|------------|----|-----|------|

c) Violet, bräunlich getönt

| | | | |
|------------------|----|-------|------|
| 'Louis Bel' | 60 | II—IV | 2,50 |
| 'Krönungsmantel' | 85 | III | 5,— |

| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

X. Flamingorosa

| | | | |
|-------------------|----|--------|------|
| 'Cathedral Bells' | 80 | IV | 4,— |
| 'Esther Fay' | 80 | III | 9,— |
| 'Happy Birthday' | 70 | III | 4,50 |
| 'Heartbreaker' | 80 | IV | 6,— |
| 'Karin von Hugo' | 70 | III | 8,— |
| 'L'Litta' | 60 | III | 6,50 |
| 'One Desire' | 70 | II—III | 10,— |
| 'Pink Fringe' | 60 | V | 18,— |
| 'Rosenquarz' | 90 | III | 6,— |
| 'Spring Festival' | 70 | V | 4,50 |

XI. Lilarosa und Cattleyenrosa

| | | | |
|-------------------|-----|--------|------|
| 'Fairy Rose' | 80 | V | 8,— |
| J 'Georgia' | 70 | I—II | 2,50 |
| 'Harriet Thoreau' | 90 | III—IV | 2,50 |
| 'Lavanesque' | 85 | V | 4,— |
| 'May Magic' | 80 | IV—V | 4,— |
| 'Pink Plume' | 80 | III—IV | 3,30 |
| 'Rheingäuperle' | 100 | III—IV | 2,50 |
| 'Top Favorite' | 80 | V | 5,50 |

XII. Mittelrosa

| | | | |
|------------------|----|------|------|
| 'Crispette' | 80 | V | 3,50 |
| J 'Rose Harmony' | 60 | I—II | 10,— |
| 'Wine and Roses' | 70 | III | 8,— |

| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

XIII. Purpurrot

| | | | |
|---------------------|----|--------|------|
| 'Frenchi' | 50 | II—III | 4,50 |
| J 'Namanga' | 35 | I | 4,— |
| 'Raspberry Ripples' | 80 | III | 30,— |

XIV. Braunes und gelbliches Rot

| | | | |
|-------------------|-------|--------|------|
| 'Ahoj' | 60 | V | 4,50 |
| 'Bang' | 70 | III | 6,— |
| J 'Brown Doll' | 60 | I—II | 7,— |
| 'Captain Gallant' | 65 | V | 5,— |
| 'Fire Magic' | 80 | V | 5,— |
| 'Fuchsjagd' | 80 | III | 6,50 |
| 'Gypsy Jewels' | 60 | III | 7,50 |
| 'Indianerblut' | 70—90 | III | 10,— |
| 'Jungle Fires' | 70 | II—III | 5,— |
| J 'Light Cavalry' | 50 | I—II | 6,— |
| 'Ruby Mine' | 90 | IV—V | 5,— |
| 'Tall Chief' | 80 | III | 4,— |
| 'Vitafire' | 70 | III | 18,— |

XV. Kupfer

| | | | |
|--------------|----|-----|------|
| 'Brasilia' | 70 | III | 5,— |
| 'Firebright' | 70 | IV | 4,— |
| 'Hephaistos' | 90 | IV | 10,— |
| 'Rusticana' | 80 | IV | 7,50 |

| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

XVI. Bronze und Tabak

| | | | |
|-----------------|----|--------|------|
| 'Brass Accents' | 80 | IV | 5,— |
| 'Gay Lights' | 80 | III | 8,— |
| 'Stardom' | 70 | IV | 2,50 |
| 'Summer Song' | 60 | IV | 3,50 |
| 'Wayward Wind' | 70 | II—III | 5,— |

XVII. Hellbraun

| | | | |
|-----------------|----|-----|-----|
| 'Gracie Pfost' | 80 | III | 7,— |
| 'Millionaire' | 70 | V | 5,— |
| 'Olympic Torch' | 80 | V | 7,— |

XVIII. Rahmgelb

| | | | |
|------------------|-----|--------|------|
| 'Bellerive' | 90 | III | 3,— |
| 'Hermann Hesse' | 130 | II—III | 3,50 |
| 'South. Comfort' | 120 | II | 8,— |
| 'Yellow Moon' | 60 | III—IV | 4,50 |

XIX. Zitronengelb

| | | | |
|-------------------|----|--------|------|
| 'Buttercup Bower' | 80 | II—III | 4,— |
| 'Cool Lemonade' | 70 | II | 2,80 |
| 'Frau Else Thiel' | 85 | IV | 5,— |
| 'Green Quest' | 75 | III—IV | 7,— |
| 'Lemon Mint' | 70 | II—III | 6,— |
| 'Limelight' | 80 | III | 3,50 |
| J 'Moonbeam' | 50 | I—II | 2,50 |
| 'Zitronencreme' | 90 | IV | 3,50 |

| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

XX. Hellgelb

| | | | |
|--------------------------------------|-----|--------|------|
| 'Debby Rairdon' | 70 | II | 17,— |
| 'Desert Song' | 100 | II—III | 2,80 |
| J 'Dres.Candleglow' | 50 | I—II | 7,— |
| 'Margarethe Gräfin von Kirchbach' | 75 | V | 6,— |
| 'Phébus' | 90 | IV | 2,50 |
| 'Soaring Kite' | 95 | IV | 5,50 |

XXI. Mittelgelb

| | | | |
|--------------------|----|------|------|
| 'Golden Garland' | 80 | III | 4,— |
| 'Golden Sunshine' | 90 | III | 4,50 |
| J 'Interim' | 50 | I—II | 5,— |
| 'Jessie Viette' | 80 | III | 6,— |
| 'Moonlight Sonata' | 80 | IV | 2,50 |
| 'Mystic Melody' | 90 | IV—V | 3,50 |

XXII. Dunkelgelb und Orange

a) Dunkelgelb

| | | | |
|-----------------|----|------|------|
| J 'Findelkind' | 50 | I—II | 3,80 |
| 'Gold Anthem' | 90 | IV | 5,50 |
| 'Goldfackel' | 90 | III | 2,50 |
| 'Ola Kala' | 90 | IV—V | 2,80 |
| 'Rainbow Gold' | 80 | III | 7,50 |
| J 'Sunbeam' | 70 | I | 2,50 |
| 'Sunsite' | 70 | IV | 14,— |
| 'Techny Chimes' | 70 | III | 5,— |
| 'Tulare' | 50 | II | 6,— |

| Name | Höhe in cm | Blütezeit- gruppe | DM |
|------|---------------|----------------------|----|
|------|---------------|----------------------|----|

b) Orangegelb

| | | | |
|-------------------|----|--------|-----|
| 'Celestial Glory' | 80 | III | 6,— |
| 'Granada Gold' | 80 | II—III | 6,— |

XXIII. Aprikosenfarbig u. bräunlich Gelb

| | | | |
|------------------|----|------|------|
| 'Flaming Dragon' | 60 | III | 10,— |
| J 'Lillipinkput' | 40 | I—II | 4,50 |
| 'Pompano Peach' | 70 | II | 7,50 |

XXIV. Dom gelblich oder graugelb

| | | | |
|-----------------------|-----|--------|------|
| J 'Fairy Frolic' | 40 | I | 3,— |
| J 'Lichtelfe' | 50 | I—II | 3,50 |
| 'Lula Marguerite' | 120 | IV | 4,50 |
| 'Omas Sommerkleid' | 80 | III—IV | 4,— |

XXV. Zweifarbige mit gelbem Dom (Variegata)

| | | | |
|-----------------|-----|----|------|
| 'Accent' | 80 | IV | 4,50 |
| 'Fire Chief' | 100 | V | 5,— |
| 'High Command' | 80 | IV | 2,50 |
| 'Lambent' | 90 | IV | 2,80 |
| 'Milestone' | 70 | II | 16,— |
| 'Staten Island' | 90 | V | 2,80 |

Mit diesen verschiedenen Zusammenstellungen wollen wir Ihnen die Auswahl erleichtern. Sie sind außerdem günstiger im Preis. Wenn Sie schnell eine größere Wirkung erzielen wollen, empfiehlt es sich, dieselbe Kollektion drei mal zu bestellen und die drei Pflanzen einer Sorte zusammen zu setzen.

Nr. 112 Reiches Farbenspiel für den Steingarten
 'Baria'
 'Jerry Rubin'
 'Lilli White'
 'Mephisto'
 'Pogo'
 'Pygmy Gold'
 'Tonya' **DM 22,—**

Nr. 113 Iris von Ende April bis Anfang Juni

Sehr früh und niedrig:
 'cyanea'
 'Knick-Knack'
 'Sonnenland'

Früh und mittelhoch:
 'Fairy Frolic'
 'Maroon Caper'
 'Moonbeam'

Mittel: 'Lugano'
 'Krönungsmantel'
 'Spring Festival'

Spät: 'George Specht'
 'Gold Anthem'
 'Summer Song' **DM 44,—**

Nr. 114 Anspruchslose Massenblüher auch für rauhe und ungünstige Lagen

'Bulwark'
 'Corrida'
 'Harriet Thoreau'
 'Lela Dixon'
 'Meissner Porzellan'
 'Parc de Neuilly'
 'Rheingauperlé'
 'Sunbeam'
 'White Knight'
 'Yellow Moon' **DM 22,50**

Nr. 115 Klare Farben für Fernwirkung

'Buttercup Bower'
 'Cliffs of Dover'
 'Foamy Wave'
 'Harbor Blue'
 'Lilac Festival'
 'Techny Chimes' **DM 27,—**

Nr. 116 Ausgezeichnete Sorten aller Farbgruppen

'After Dark'
 'Esther Fay'
 'Granada Gold'
 'Green Quest'
 'Henry Shaw'
 'Hephaistos'
 'Lavish Lady'
 'Olympic Torch'
 'Wenatchee Skies' **DM 62,—**

Nr. 117 Ufergarten (für etwas feuchte Lagen)

Iris graminea
 I. kaempferi 'Lustige Witwe'
 I. kaempferi 'Ruby King'
 I. kaempferi 'Windjammer'
 I. pseudacorus 'Golden Queen'
 I. sanguinea
 I. sibirica 'Caesar'
 I. sibirica 'Mrs. Rowe' **DM 24,—**



Rosen und Stauden sind gute Partner

Große Vorteile und Leistungen bietet seinen Mitgliedern der

Verein Deutscher Rosenfreunde e. V.

größte deutsche Pflanzengesellschaft — gegründet 1883 - 757 Baden-Baden, Postfach 101



Jahresbeitrag

DM 20,— ordentliche Mitglieder

DM 8,— Studenten, Lehrlinge

DM 40,— Baumschulen, Gartenbaubetriebe, Behörden



Mitglieder erhalten dafür u. a.

Ein herrliches, reich illustriertes Jahrbuch. Eine vierteljährliche Verbands-Fachzeitschrift von hohem Niveau.

Beratung, Information, Erfahrungsaustausch, Zutritt zu Rosenausstellungen, Rosenseminaren und,
ab 1971, als stolze eigene Neuschöpfung des Vereins: Das neue deutsche Rosarium des VDR in Dortmund.

Zusammenstellung nach verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten

Schnittstauden

Achillea hohe Sorten
Aconitum
Anthemis tinctoria
Aster amellus
— cordifolius
— ericoides
— nov. belgii
— tongolensis
— yunnanensis
Astilbe Arendsii Hybriden
— Thunbergii Hybriden
Boltonia
Campanula grandis
— persicifolia
Centaurea dealb. 'Steenbergii'
Chrysanthemum coccineum
— Indicum Hybriden
— leucanthemum
— maximum
Coreopsis 'Badengold'

Delphinium Bellad. Hybriden
— Cultorum Hybriden
Dianthus plumarius
Doronicum
Echinops
Eremurus
Erigeron
Eryngium
Gaillardia
Geum
Gypsophila
Helenium
Helianthus
Heliopsis
Heuchera
Iris barbata
— ochroleuca
— sanguinea
— sibirica
— spuria
Kniphofia

Liatris
Limonium
Lupinus
Lythrum
Monarda
Myosotis
Paeonia
Papaver
Phlox hohe Sorten
Physalis
Physostegia
Primula elatior
Rudbeckia
Scabiosa
Solidago
Stachys grandiflora 'Superba'
Thalictrum
Trollius
Viola
Ziergräser

Solitärstauden

sind meist hohe Pflanzen, die durch ihre Gestalt oder Blüte besondere Schwerpunkte im Garten bilden. Man kann sie einzeln setzen oder in kleinen Gruppen in niedrige Staudenpflanzungen einfügen.

Althaea
Aralia
Aruncus
Boltonia
Cimicifuga
Echinops
Eremurus
Helianthus

Hemerocallis
Heracleum
Inula magnifica
Kniphofia
Ligularia
Macleaya
Paeonia
Peltiphyllum
Perowskia

Phlomis
Rodgersia
Rudbeckia maxima
— nitida
Thalictrum
Verbascum hohe Sorten
Yucca
Große Gräser und Farne

Pflanzen, die besonders viel Trockenheit vertragen:

Achillea
Alyssum
Anaphalis
Antennaria
Artemisia
Asphodeline
Centaurea simplicicaulis
Cerastium
Dianthus
Echinops
Eremurus

Eryngium
Euphorbia myrsinites
Heliopsis
Hemerocallis
Iris barbata
— — 'Nana'
Kentranthus
Kniphofia
Lavandula
Nepeta

Paronychia
Perowskia
Salvia
Santolina
Sedum
Sempervivum
Stachys lanata
Thymus
Verbascum
Veronica incana
Yucca

Pflanzen für feuchten Standort:

Aruncus
Astilbe
Geum
Iris ochroleuca
— pseudacorus
— sanguinea
— sibirica
— spuria

— versicolor
— wilsonii
Ligularia
Lysimachia
Lythrum
Myosotis
Peltiphyllum
Polygonum

Primula florindae
— rosea
— sikkimensis
Ranunculus
Rodgersia
Tradescantia
Trollius
Carex

Bodenbedecker für Sonne (Rasenersatz):

Acaena
Antennaria
Armeria
Artemisia schmidtii 'Nana'
Azorella
Cerastium
Dianthus nœanus
— petraeus

— rob. 'Splendens'
Helianthemum niedrige Sorten
Herniaria
Hypericum calycinum
Origanum
Paronychia
Polygonum affine
Potentilla verna 'Nana'

Prunella
Sedum
Silene
Stachys lanata
Thymus
Veronica repens
Festuca glauca
Koeleria

Bodenbedecker für Halbschatten und Schatten:

Ajuga
Arabis procurrens
Asarum
Cardamine
Cotula

Hypericum calycinum
Lamium
Omphalodes
Pachysandra
Saxifraga
Tiarella

Vinca
Waldsteinia
Carex
Luzula
Festuca scoparia

In Trockenmauerfugen wachsende Stauden (sonnig):

Aethionema
Alyssum
Androsace
Anthemis biebersteiniana
Arabis
Aubrieta
Campanula niedrige
Cerastium
Dianthus
Draba

Dryas
Euphorbia myrsinites
Gypsophila repens
Gentiana
Helianthemum
Iberis
Leontopodium
Nepeta
Oenothera missouriensis

Phlox subulata
Saponaria
Saxifraga aizoon
Scutellaria scordifolia
Sedum
Sempervivum
Silene
Thymus
Tunica
Veronica

Bienenweidepflanzen

Für die Imker unter unseren Kunden haben wir die uns bekannten Bienenweidepflanzen zusammengestellt. Nur ungefüllt blühende Sorten kommen in Betracht.

Achillea
Aconitum
Ajuga
Alyssum
Althaea
Anemone
Aquilegia
Arabis
Aster
Aubrieta
Bergenia
Campanula
Cardamine
Carlina
Centaurea
Cerastium
Chrysanthemum

Cimicifuga
Coreopsis
Corydalis
Digitalis
Doronicum
Draba
Echinops
Epimedium
Erigeron
Eryngium
Gaillardia
Helenium
Helianthus
Helianthemum
Helleborus
Heracleum
Iberis

Lamium
Lathyrus
Lavandula
Ligularia
Limonium
Linum
Lysimachia
Lithospermum
Malva
Monarda
Myosotis
Nepeta
Omphalodes
Origanum
Paeonia
Oenothera
Papaver

Penstemon
Polygonum
Potentilla
Primula
Prunella
Pulmonaria
Rudbeckia
Salvia
Sedum
Sempervivum
Solidago
Stachys
Thalictrum
Thymus
Verbascum
Veronica
Viola

Deutsche Pflanzennamen

Alant: Inula
Anemone: Anemone
Akelei: Aquilegia
Aralie: Aralia
Aster: Aster
Bärenklau: Acanthus
Ballonblume: Platycodon
Bartfaden: Penstemon
Bergenie: Bergenia
Binsenlilie: Sisyrinchium
Blaukissen: Aubrieta
Blaustrahlhafer: Avena
Blaustrandhafer: Elymus
Bleiwurz: Ceratostigma
Braunelle: Prunella
Bruchkraut: Herniaria
Chinarohrgras: Sinarundinaria
Chinaschilf: Miscanthus
Christrose: Helleborus
Dachwurz: Sempervivum
Dost: Origanum
Drachenkopf: Dracocephalum
Dreimasterblume: Tradescantia
Edeldistel: Eryngium
Edelraute: Artemisia
Edelweiß: Leontopodium
Efeu: Hedera
Ehrenpreis: Veronica
Eisenhut: Aconitum
Elfenblume: Epimedium
Enzian: Gentiana
Fackellilie: Kniphofia

Federborstengras: Pennisetum
Federgras: Stipa
Fедermohn: Macleaya
Feinstrahl: Erigeron
Felberich: Lysimachia
Felsennelke: Tunica
Fetthenne: Sedum
Fiederpolster: Cotula
Fingerhut: Digitalis
Fingerkraut: Potentilla
Flammenblume: Phlox
Frauenfarn: Athyrium
Frauenmantel: Alchemilla
Freilandgloxinie: Incarvillea
Frühlingswaldwicke: Lathyrus
Fuchsie: Fuchsia
Funkie: Hosta
Gänsekresse: Arabis
Gamander: Teucrium
Gedenkemein: Omphalodes
Geissbart: Aruncus
Gelenkblume: Physostegia
Gems-kresse: Hutchinsia
Gems-wurz: Doronicum
Glatthafer: Arrhenaterum
Glockenblume: Campanula
Goldleistengras: Spartina
Goldnessel: Lamium
Goldrute: Solidago
Goldquirl: Phlomis
Grasnelke: Armeria
Günsel: Ajuga

Hahnenfuß: Ranunculus
Hainkraut: Minuartia
Hainsimse: Luzula
Hartheu: Hypericum
Haselwurz: Asarum
Hauswurz: Sempervivum
Heiligenkraut: Santolina
Helmkraut: Scutellaria
Herkulesstaude: Heracleum
Herzblume: Dicentra
Herzllilie: Hosta
Hirschzunge: Phyllitis
Hirse: Panicum
Hornkraut: Cerastium
Hundszunge: Cynoglossum
Hungerblümchen: Draba
Immergrün: Vinca
Indianernessel: Monarda
Iris: Iris
Jakobsleiter: Polemonium
Johanniskraut: Hypericum
Junkerlilie: Asphodeline
Kamille: Anthemis
Katzenminze: Nepeta
Katzenpfötchen: Antennaria
Kaukasusvergifmeinnicht: Brunnera
Kleopatranadel: Eremurus
Knöterich: Polygonum
Königsfarn: Osmunda
Königskerze: Verbascum
Kokardenblume: Gaillardia
Kornblume: Centaurea

Deutsche Pflanzennamen

Kugelblume: Globularia
Kugeldistel: Echinops
Lampionblume: Physalis
Lavendel: Lavandula
Leberbalsam: Erinus
Leberblümchen: Hepatica
Leimkraut: Silene
Lein: Linum
Leinkraut: Linaria
Lerchensporn: Corydalis
Lichtnelke: Lychnis
Lobelia: Lobelia
Löwenmaul: Antirrhinum
Lungenkraut: Pulmonaria
Lupine: Lupinus
Mädchenauge: Coreopsis
Malve: Malva, Althaea
Mannsschild: Androsace
Margarite: Chrysanthemum
Mauermiere: Paronychia
Mohn: Papaver
Moskitogras: Bouteloua
Münzkraut: Lysimachia
Nachtkerze: Oenothera
Nelke: Dianthus
Nelkwurz: Geum
Ochsenzunge: Anchusa
Palmlilie: Yucca
Pampasgras: Cortaderia
Perowskie: Perowskia
Pfeifengras: Molinia
Pfingstrose: Paeonia
Phygelius: Phygelius

Plattährengras: Uniola
Prachtscharte: Liatris
Prachtspiere: Astilbe
Primel: Primula
Purpurglöckchen: Heuchera
Reitgras: Calamagrostis
Riesenkreuzkraut: Ligularia
Rippenfarn: Blechnum
Rittersporn: Delphinium
Rosmarin: Rosmarinus
Salbei: Salvia
Schafgarbe: Achillea
Schaublatt: Rodgersia
Schaumblüte: Tiarella
Schaumkraut: Cardamine
Scheinaster: Boltonia
Schildblatt: Peltiphyllum
Schillergras: Koeleria
Schlangenkopf: Chelone
Schleierkraut: Gypsophila
Schleifenblume: Iberis
Schneeheide: Erica
Schwertlilie: Iris
Schwingel: Festuca
Segge: Carex
Seifenkraut: Saponaria
Silberimortelle: Anaphalis
Silberkerze: Cimicifuga
Scabiose: Scabiosa
Sonnenauge: Heliopsis
Sonnenblume: Helianthus
Sonnenbraut: Helenium
Sonnenhut: Rudbeckia

Sonnenröschen: Helianthemum
Spornblume: Kentranthus
Stachelnüsschen: Acaena
Steinbrech: Saxifraga
Steinkraut: Alyssum
Steinsame: Lithospermum
Steintäschel: Aethionema
Steinwurz: Sempervivum
Steppenkerze: Eremurus
Stockrose: Althaea
Storchschnabel: Geranium
Strahlensame: Heliosperma
Strandflieder: Limonium
Taglilie: Hemerocallis
Süßgras: Glyceria
Thymian: Thymus
Trollblume: Trollius
Tüpfelfarn: Polypodium
Veilchen: Viola
Venushaar: Adiantum
Vergißmeinnicht: Myosotis
Waldsteinie: Waldsteinia
Weiderich: Lythrum
Wiesenfuchsschwanz: Alopecurus
Wiesenraute: Thalictrum
Wolfsmilch: Euphorbia
Wucherblume: Chrysanthemum
Wüstengoldaster: Eriophyllum
Wurmfarne: Dryopteris
Waldschmiele: Deschampsia
Ysander: Pachysandra
Ziest: Stachys

Neuaufnahmen und Neuheiten zum Katalog

Achillea, Schafgarbe, COMPOSITAE, ○, ☞.

x **hybr. 'Schwellenburg'**, 30 cm, VI—VIII, ✕. Eine halbhohe Sorte, die in Zitronengelb eine erfreuliche Bereicherung ist.

millefolium 'Red Beauty', 70 cm, VII—VIII, ✕. Höhere, dunkelrote Schafgarbe.

△ **tomentosa**, 15 cm, V—VII. B grauwoilig, Bl goldgelb.

Adonis, Adonisröschen, RANUNCULACEAE, 20 cm, IV, ○, ☞.

△ **vernalis**, feingefiederte B und goldgelbe Bl. Reizender Frühjahrsblüher für leichten Boden.

Althaea, Stockrose, MALVACEAE, 200 cm, VII—IX, ○, ☞.

ficifolia. Die B sind feigenartig gelappt, die Bl einfach in verschiedenen Farben.

Alyssum, Steinkraut, CRUCIFERAE, 25 cm, IV—V, ○, ☞.

△ **arduinii**, graugrüne B und zitronengelbe Bl. Rostresistent.

Anacyclus, Ringblume, Zwergmargarite, COMPOSITAE, 5 cm, V—VI, ○, ☞.

△ **depressus**, feines, grüngelbes Laub und weiße, unterseits rote Margaritenblüten. Reizende Pflanze für leichte Böden. Vor Winternässe schützen.

Anchusa, Ochsenzunge, BORAGINACEAE, 60 cm, V—VI, ○, ☞.

italica 'Little John', leuchtend blaue, kleine Bl. Durch den kompakten Wuchs wertvoll.

Antennaria, Katzenpfötchen, COMPOSITAE, 15 cm, V—VI, ○, ☞.

△ **tomentosa**, silbergraue B, die gute Teppiche bilden, besonders an trockenem Standort mit leichtem Boden. Weißlichrosa Bl.

Arenaria, Sandkraut, CARYOPHYLLACEAE, 4 cm, VII—VIII, ○, ☞.

△ **rotundifolia**, B graugrün, weiße Blüten. Guter Bodenbedecker.

Asphodelus, Affodil, LILIACEAE, 100 cm, V—VI, ○, ✕, ☞.

albus, Liliengewächs mit weißen Blüten, für leichte Böden, etwas Besonderes!

Aster, Aster, COMPOSITAE, 30 cm, VIII, ○, ☞.

△ **dum. 'Jenny'**, schönes, leuchtendes Rot.

Bergenia, Bergenie, SAXIFRAGACEAE, ○—●.

△ **acanthifolia**, 30 cm, III—IV, eine der Arten, deren Laub bis auf die Herzblätter erfriert. Die hellrosa Bl erscheinen je nach Witterung schon im März. Die halbgroßen B sind behaart. Möglichst geschützter Standort sichert die Freude an der Blüte.

△ **crassifolia**. Die mittelgroßen, winterharten B dieser Art sind länglich und verfärben sich bei sonnigem Standort zu auffallend hellem Rot. Bl Anfang III in leuchtendem Rosa.

△ **Hybride 'Pugsley Pink'**, 50 cm, IV. Große B mit roter Rückseite, Bl rosa mit braunen Kelchblättern.

△ **purpurascens 'Wintermärchen'**, 50 cm, IV—V. Längliche, mittelgroße B, die sich sehr leuchtend rot verfärben, Bl lilarosa spätblühend. Eine interessante **Neuheit**.

Campanula, Glockenblume, CAMPANULACEAE, 60 cm, VI—VII, ○, ✕, ☞.

grandis 'Percy Piper', eine Verbesserung mit größeren, dunkleren, blauen Bl.

Chiastophyllum, Goldtröpfchen, CRASSULACEAE, 15 cm, VI—VII, ○—●, ☐.

△ **oppositifolium**, runde, fleischige B, kleine gelbe Bl an überhängenden Rispen. Hübsche Staude für Steingärten und Trog.

Chrysanthemum, Margerite, COMPOSITAE, 30 cm, VII—VIII, ○, ☐.

△ **haradjanii**, halbstrauchiger Busch mit weißfilzigen, feingefiederten B und kleinen, gelben Trugdolden. Eine sehr reizvolle Bereicherung für Steingärten oder Trockenmauern.

Chrysogonum, Goldkörbchen, COMPOSITAE, 20 cm, V—VII, ○, ☐.

△ **virginianum**, längliche, rauhehaarte B und gelbe Bl. Eine Kleinstaude mit langer Blütezeit.

Clematis, Waldrebe, RANUNCULACEAE, 100 cm, VII—IX, ○—●, ☐.

heracleaefolia davidiana, hyazinthenähnliche Bl in Büscheln. Schönes Pastellblau. Interessante und langblühende Pflanze.

Convallaria, Maiglöckchen, LILIACEAE, 20 cm, V, ○—●, ✕, ☐.

△ **majalis**, Maiglöckchen sind wegen ihres Duftes beliebt und eignen sich zur Unterpflanzung von Gehölzen.

Coreopsis, Mädchenauge, COMPOSITAE, 25 cm, VII—IX, ○, ☐.

△ **verticillata 'Zagreb'**, wertvolle, niedrige Form der lange blühenden, dankbaren Staude mit ihren goldgelben Strahlenblüten. **Neuheit!**

Cotula, Fiederpolster, COMPOSITAE, 5 cm, ○—●, ☐.

△ **dioica**, diese teppichbildende Pflanze, hat etwas breitere B als **squalida**.

Delphinium, Rittersporn, RANUNCULACEAE, VI—VII u. IX—X, ○, ✕.

Cultorum-Gruppe 'Berghimmel', 170 cm, himmelblau, weißes Auge.

— — **'Lanzenträger'**, 200 cm, enzianblau, weißes Auge. Lange Bl-Rispen, standfest.

— — **'Merlin'**, 180 cm, leuchtend hellblau, weißes Auge.

Dianthus, Nelke, CARYOPHYLLACEAE, 15 cm, VI—VIII, ○, ☐.

△ **deltoides 'Brillancy'**, große karminrote, besonders leuchtende einfache Blüten. Dauerblüher.

Epimedium, Elfenblume, BERBERIDACEAE, 30 cm, IV—V, ○—●, ☐.

△ **perralderianum 'Frohneiten'**. Bei diesem Epimedium fällt das Laub auf, was sich besonders gut und lange hält. Die gelben Bl gleichen denen von **pinnatum 'Elegans'**.

Eryngium, Edeldistel, UMBELLIFERAE, 80 cm, VII—VIII, ○, ✕.

amethystinum, die tiefeingeschnittenen B sind stahlblau überlaufen, ebenso die Blütenköpfe. Anspruchslose, dekorative Pflanze, die gut in Heidegärten paßt. Wertvoll für Trockensträucher.

Eupatorium, Wasserdost, COMPOSITAE, 150 cm, VII—IX, ○, ✕.

purpureum, purpurrote Bl-Dolden. Haltbare Schnittblume.

Euphorbia, Wolfsmilch, EUPHORBIACEAE, 5 cm, VI—VII, ○, ☐.

△ **capitata**, Blaugrüne B, schuppenförmig angeordnet, gelbe Bl-Stände. Reizende Kleinausgabe von **E. myrsinites**.

Fuchsia, Fuchsia, ONAGRACEAE, 50 cm, VII—X, ○—●, ☐.

△ **magellanica 'Pumila'**, eine reizende Zwergform, die wie alle Freilandfuchsien Winterschutz verlangt.

Geranium, Storchschnabel, GERANIACEAE.

endressii, 30 cm, VII—VIII, leuchtend rosa Blüten, ○, ☐.

macrorrhizum 'Ingwersen', 30 cm, VI—VII, mit den gleichen guten Eigenschaften wie die Sorte 'Spessart', aber Blüten intensiver in der Farbe. ●—●, ☐.

Glaucium, Hornmohn, PAPAVERACEAE, 50 cm, VI—IX, ○, ☐.

flavum, ganze Pflanze blaugrün bereift. Ockerfarbene Bl. Sehr effektiv für geschützten Standort. Wintergrün. N: Yucca, graue Gräser, Salvia Ostfriesland.

Hosta, Funkie oder Herzlilie, LILIACEAE, ●—●, ☐.

albomarginata, 60 cm, VII—VIII, Weißrandfunkie, lila Bl.

Hybride 'Sweet Susan', 70 cm, VIII—IX, grünblättrige, amerikanische Züchtung mit duftenden lila Bl.

Iris, Schwertlilie, IRIDACEAE, ○, ✕.

forrestii, 50 cm, VI. Hellgelbe Bl, die H etwas rotbraun geädert.

halophila sogdiana, 60 cm, VI—VII, gehört zur Gruppe der spuria. Schmale, graugrüne straffe B und hellblaue Bl. Verträgt sehr trockenen Standort.

kaempferi 'Emotion', 90 cm, VI. Ganz zartes Lila, doppelt, reichblühend.

— **'Ge-Sho-Ui'**, 6 5cm, VI. Mittelvioletttrot gestreift, doppelt.

— **'Lustige Witwe'**, 65 cm, weiß mit lila Adern, grüngelbes Saftmal, umgeben von Lila, doppelt.

— **'Nagasaki'**, 60 cm, VI. Lilarosa, dunkle Zone und gelbes Saftmal, einfach.

monnieri, 100 cm, VI—VII. Gehört zu den I. spuria. Eine dankbare, spätblühende Iris mit gelben Bl.

sibirica 'Blue Cape' (GB Kitton 1957), 80 cm, VI. Mittelviolettblau, H stark weiß geädert.

— **'Ellesmere'** (GB Hutchinson 1956), 70 cm, VI. Dunkelblau, H sehr samtig mit wenig Zeichnung am Schlund.

— **'Weißer Orient'** (D Steiger 1958), 80 cm, VI. Elfenbeinweiß mit goldgelbem Schlund. Bewegte Ränder und gute Substanz. Spätblühend.

spuria 'Academos', (GB Fothergill 1954), 70 cm, IV. D rötlich lavendel, H durchzogen von hellgelben Adern. Früh und reichblühend.

— **'Farolito'** (USA Hager 1965), 100 cm, VI. D gedeckt lavendelblau, H lavendelblauer Rand und große gelbe Mitte.

— **'Golden Lady'** (USA Combs 1957), 90 cm, VI. Klares, helles Gelb, leicht gewellte Ränder, gute Substanz.

— **'Neophyte'** (USA Hager 1963), 90 cm, VI. D kräftig hellmittelblau, H weiß durchzogen von blauen Adern, mittelgroße Bl.

— **'Wakerobin'** (USA Ferguson 1958), 100 cm, VI. Bis jetzt beste weiße Sorte mit gelbem Saftmal. Großblumig, frühblühend.

tectorum, 40 cm, VI—VII. Frischgrüne B und violettblaue Bl mit weißem Kamm auf den H. Diese aparte Iris sollte warmen, trockenen Standort haben.

— **'Album'**, schöne weißblühende Form.

Lavatera, Buschmalve, MALVACEAE, 150 cm, VII—IX, ○, ☐.

thuringiaca, malvenartige Staude mit eingeschnittenen B und leuchtend rosa Blüten. Dauerblüher.

Leontopodium, Edelweiß, COMPOSITAE, 15 cm, VI—VII, ○, ☐.

△ **T souliei**, chinesisches Edelweiß von dichtem Wuchs, Bl silberweiß, reichblühend.

Liatris, Prachtscharte, COMPOSITAE, VII—IX, ○, ✕, ☐.

pycnostachya, 80—100 cm, dichte, hellpurpurfarbene Blähren an hohen Stielen.

spicata 'Kobold', 40 cm, eine niedrige Form.

Lithospermum, Steinsame, BORAGINACEAE, 20 cm, IV—V, ○, ☐.

△ **diffusum 'Heavenly Blue'**, lanzettliche B, enzianblaue Bl. Bezaubernde Liebhaberpflanze für nicht zu kalkhaltige Böden.

Minuartia, Hainkraut, Miere, CARYOPHYLLACEAE, 8 cm, VII—VIII, ○, ☒.

△T **graminifolia**, bildet gute, grüne Polster lanzettlicher B, weiße Bl.

Monarda, Indianernessel, LABIATAE, 120 cm, VI—VIII, ○, ✕, ☒.

Hybride **'Praerieglut'**, hellrot.

Nepeta, Katzenminze, LABIATAE, 70 cm, VI—IX, ○, ✕, ☒.

x **faassenii** **'Six Hills Giant'**, wesentlich größer in Wuchs und Blüte als die bekannte und viel verwendete Art und daher auch entsprechend zu pflanzen.

Orostachys, Steinwurz, CRASSULACEAE, 25 cm, VII—VIII, ○, ☒.

△T **spinosus**, ähnlich Sempervivum, dichte, kugelige Rosetten mit weißen Dornenspitzen. Bl gelbe Sternchen. Sehr reizvolle Steingarten- oder Trogpfanze.

Paeonia, Pfingstrose, RANUNCULACEAE, V—VI, ○, ✕.

Einfach blühende Sorten:

'Burma Ruby' (USA Glasscock 1951), 80 cm. Eine der sogenannten Hybrid-Paeonien, die aus Kreuzungen mit Arten, wie z. B. *officinalis* und *peregrina*, entstanden sind. Dadurch sind ganz neue Farbtöne dazugekommen und das Rot ist viel leuchtender und ohne Blautöne. Burma Ruby ist eine der auffallendsten dieser neuen Klasse und wie alle sehr frühblühend. Die Bl sind von wundervollem Rot in Form großer Schalen.

'Gertrud Allen' (USA Nicholls-Wild 1958), elfenbeinweiße Schale mit schwefelgelben, verbänderten Staubfäden. Sehr schöne, frühe Sorte.

'Hari-Ai-Nin' (USA Babcock 1929). Tief samtig rot, viele rote, zum Teil gelb bebänderte Staubfäden, m—s.

'Some Ganoko' (Japan). Dunkelkarmin, niedrig, duftend, m.

Gefülltblühende Sorten:

'John Howard Wigell' (USA Wigell 1942). Sehr schöne, gefüllt blühende Sorte mit rosa Blüten von lachsigem Schimmer. Niedrig, m.

'Lottie Dawson Rea' (USA Rea 1939). Zartes, ganz helles Babyrosa, sehr schöne Form, gute Schnittsorte, besonders spät.

'Kansas' (USA Bigger 1949). Leuchtendes Karminrot mit besonders schöner Form. Standfest, m.

'Mandaleen' (USA Lins 1942). Ganz helles, silbriges Lilarosa. Harmonische Form, f—m.

'Marie Crousse' (F Crousse 1892). Zart fleischfarbene Schale, cremeweiße Füllung. Reichblühend, m.

'Robert W. Auten' (USA Auten 1948). Samtiges Schwarzrot, halbgefüllt mit hellgelben Staubfäden, f.

'Triomphe de l'Exposition de Lille' (F Calot 1868). Niedrige, standfeste Sorte mit babyrosa stark gefüllten B. Als ausgezeichnete Gartensorte bis heute nicht überholt, m—s.

'Ville de Nancy' (F Calot 1872). Reichblühend, niedrig. Helles Weinrot, m.

***officinalis* 'Himmelsrose'**. Die bekannte, frühe Bauernpfingstrose in leuchtend Rosa. Niedrig und sehr früh.

Papaver, Mohn, PAPAVERACEAE, ○.

△ **nudicaule 'Gartenzwerg'**, 20 cm, V—VII. Besonders niedrig in reichem Farbenspiel.

orientale 'Arwide', 80 cm, V—VI. Eine auffallende Neuheit, die hier entstanden ist. Die Bl-Blätter sind außen weiß durchzogen von orange Adern. Innen große, schwarze Flecken. Im Erblühen rote Wirkung, große schöngewellte Bl an vollkommen standfesten Stielen.

— **'Lighthouse'**, 80 cm. Richtig rosa Bl mit großen, leuchtend roten Flecken, öffnet sich weit.

- '**Maidens Blush**', 80 cm. Weiß in lachsrosa Rand übergehend, der schön gewellt ist. Keine oder nur ange deutete Flecken. Blumen halten sich kelchartig geschlossen, absolut standfest.
- △ **pseudoscandens**, 50 cm, VI—X, $\frac{\times}{\circ}$, $\frac{\cup}{\cap}$. Ähnlich Papaver nudicaule Bl frisch zitronengelb. Reizvolle Wildstaude und haltbare Schnittblume.
- Phlox**, Flammenblume, POLEMONIACEAE, IV—V, $\frac{\circ}{\cap}$.
- △T **nivalis nivea**, 10 cm. Die Polster bedecken sich mit kleinen weißen Sternblüten. Bezaubernd!
- △T **subulata 'Maischnee'**. frischgrüne Polster mit hübschen, elfenbeinweißen, runden Blüten.
- △T — '**Rotraud**'. Besonders leuchtend rote Sorte.
- △T — '**Schöne von Ronsdorf**'. Auffallend schönes, etwas lachsiges Rosa.
- Platycodon**, Ballonblume, CAMPANULACEAE, 20 cm, VII—VIII, $\frac{\circ}{\cap}$.
- △ **grandiflorum 'Apoyama'**. Ganz niedrige Züchtung mit violettblauen Bl.
- Saxifraga**, Steinbrech, SAXIFRAGACEAE, 10 cm, V—VII, \bullet — \bullet , $\frac{\cup}{\cap}$.
- △ **x arendsii 'Luschinez'**. Diese interessante Sorte fällt durch ihre blutroten Bl auf. Sie zeichnet sich durch Wüchsigkeit und Sonnenverträglichkeit aus. **Neuheit**.
- △ **sarmentosa 'Cuscutiformis'**, 8 cm, VII—VIII. Hübsch gezeichnete runde B, weiße Bl mit roten Punkten. Bildet Ausläufer.
- Sedum**, Fetthenne, CRASSULACEAE, $\frac{\circ}{\cap}$.
- △ **ellacombianum**, 15 cm, VII—VIII. Hellgrünes Laub, gelbe Bl. Guter Bodenbedecker auch für Halbschatten.
- △T **ewersii 'Homophyllum'**, 15 cm, VIII. Blaugraue B und rosa Blütchen, schwachwachsend.
- △ **krajinae**, 5 cm, VII. Ähnlich dem bekannten „Mauerpfef fer“, aber ordentlicher im Wuchs.

- Sempervivella**, Himalaya-Hauswurz, CRASSULACEAE, 3 cm, VII—VIII, $\frac{\circ}{\cap}$.
- △ **sedoides**, kleine fleischige Rosetten, die sich stark vermehren, weiße Bl. Verlangt Schutz vor Winternässe.
- Sempervivum**, Dach-, Haus- oder Steinwurz, CRASSULACEAE, VI—VII, $\frac{\circ}{\cap}$.
- △T **calcareum 'Greeni'**. Mittelgroß, blaugrün mit rotbraunen Spitzen, purpurrosa Bl.
- △T **cantabricum**, mittelgroße blaugraue Rosetten.
- △T **cantalicum**, kleine bis mittelgroße Rosetten von spitzer Form, auffallend grün, rosa Bl.
- △T **pittonii**, flache, mittelgroße Rosetten, Spitzen wenig braun, gelbe Bl.
- △T **hirtum**, mittelgroße grüne Rosetten, die rötlichen „Kinder“ fallen ab, gelbe Bl.
- △T **tectorum Hybr. 'Seerosenstern'**. Große, besonders schön geformte, seerosenartige grüne Rosetten mit etwas braunen Spitzen.
- Stachys**, Ziest, LABIATAE, 20 cm, $\frac{\circ}{\cap}$.
- lanata 'Silver Carpet'**. Diese Neuheit ist ein dichter, grauer Bodendecker, der nicht blüht, und daher immer ordentlich aussieht. Auch für größere Flächen und schlechte Böden.
- Teucrium**, Gamander, LABIATAE, 15 cm, VII—VIII, $\frac{\circ}{\cap}$.
- △T **aureum**, silbergraufilzige B, kleine gelbe Bl-Köpfe. Reizend für trockenen Standort.
- Thymus**, Thymian, LABIATAE, 7 cm, VI—VII, $\frac{\circ}{\cap}$.
- △T **citriodorus**, bildet gute dunkelgrüne Polster mit gelegentlichen gelben Blattspitzen, lila Bl.
- Zauschneria**, Kolibritrompete, ONAGRACEAE, 25 cm, VII—IX, $\frac{\circ}{\cap}$.
- arizonica**, B lineal, leicht grau behaart, Bl leuchtend orange rot, sehr besonders.

Winterharte Ziergräser

Carex, Segge, CYPERACEAE, 40 cm, VII, ○, ☹.

buchananii, die braunrote Segge mit ihren dünnen, überhängenden Halmen ist eine interessante Bereicherung des Gräsersortimentes.

Chrysopogon, Goldbartgras, GRAMINACEAE, 100 cm, VIII—X, ○, ☹.

nutans, graugrüne B und goldbraune, überhängende Bl mit auffallenden gelben Staubfäden.

Deschampsia, Waldschmiele, GRAMINACEAE, ○—●, ☹.

caespitosa 'Tardiflora', 20 cm, IV—VII. Gedrungener als die Art, hellgrüne Ähren.

— **'Waldschatt'**, 90 cm, VII—VIII. Bildet schöne, kompakte Blatthorste mit vielen dunkelbraunen Ähren.

Festuca, Schwingel, GRAMINACEAE, 10 cm, VI—VII, ○, ☹.

△T **glacialis**. Der Gletscherschwingel bildet feine graugrüne Polster. Verträgt keine stauende Nässe.

Winterharte Farne

Adiantum, Venushaar, ADIANTACEAE, 15 cm, ○—●, ☹.

pedatum 'Minor'. Kleiner und zierlicher als die Art. Besonders reizend!

Currania, Eichenfarn, ASPIDIACEAE, 30 cm, ○—●, ☹.

dryopteris, guter Bodenbedecker, da ausläufertreibend für humose, schattige Plätze.

Dryopteris, Wurmfarne, ASPIDIACEAE, 30 cm, ○—●, ☹.

borreri 'Crispa', Zwerggoldschuppenfarn mit schönen wellig gefransten Wedeln.

Polypodium, Tüpfelfarn, POLYPODIACEAE, 30 cm, ○—●, ☹.

vulgare var. serratum 'Cornubiense'. Federtüpfelfarn, Wedel sehr fein zerteilt, stark gefiedert.

Polystichum, Schildfarn, ASPIDIACEAE, ○—●, ☹.

aculeatum, 80 cm. Glanzschildfarn, Wedel derb lederig, glänzend grün, doppelt gefiedert. Sehr dekorativer, wintergrüner Farn. Verträgt relativ viel Sonne.

setiferum proliferum 'Plumosum Densum', 50 cm. Flaumfeder-Filigranfarn. Wedel moosgrün, feingefiedert. Fiedchen übereinandergreifend.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges und der neuen Preisliste verlieren die früheren Listen ihre Gültigkeit.

Im Preis inbegriffen sind 8 % Mehrwertsteuer und die Verpackungskosten. Die Mehrwertsteuer wird auf Wunsch gesondert ausgewiesen.

Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Besondere Terminwünsche werden berücksichtigt, wenn sie zeitig mitgeteilt werden. Ersatz in gleichwertigen Sorten wird von uns geliefert, falls dies nicht ausdrücklich verboten wird.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Berechtigte Beanstandungen werden kostenlos ausgeglichen. Falls die Versandart nicht ausdrücklich angegeben wird, wählen wir die uns am günstigsten erscheinende.

Wenn Sie Ihre Bestellung hier abholen wollen, bitten wir um vorherige Aufgabe des Auftrags, da die Pflanzen teilweise auf entfernten Feldern geholt werden müssen.

Da wir aus Gefälligkeit für unsere Kunden auch den kleinsten Auftrag ausführen, sind wir gezwungen, bei Aufträgen unter DM 20,—, eine Bearbeitungsgebühr von DM 2,— in Rechnung zu stellen, wofür Sie sicher Verständnis haben.

Die Preise sind netto, ohne jeden Abzug.

Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei haben die Listenpreise keine Gültigkeit.

Mengenrabatte ersehen Sie aus der Preisliste.

Die Gärtnerei ist geöffnet Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.30 Uhr. Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Samstags nachmittags und sonntags können Sie die Gärtnerei besichtigen und **nur vorher bestellte** Pflanzen abholen.

Erfüllungsort Laufen, Gerichtsstand Müllheim/Baden.

Gesellschaft der Staudenfreunde e. V.

früher „Deutsche Iris- und Liliengesellschaft“

Geschäftsstelle: 725 Leonberg, Justinus-Kerner-Straße 11, Telefon (07152) 7464

Werden Sie Mitglied der Staudenfreunde!

Jeder Blumenfreund kann Mitglied dieser Pflanzenliebhaber-Gesellschaft werden, wo er viele Freunde seiner eigenen Liebhaberei findet, sei es auf dem Gebiet Iris, Lilien, der Wasser- und Sumpfpflanzen, Schmuckstauden, Gräser und Farne, der Blumenzwiebeln oder der alpinen Pflanzen usw.

- Erfahrungs- und Pflanzenaustausch
 - Anregung bei Tagungen, Regionaltreffen, Gartenbesichtigungen
 - Wertvolle Informationen durch die vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift „Der Staudengarten“
 - Eine Fülle kostbarer Samenschätze durch unsere alljährliche Samentauschaktion. Eine Fundgrube für jeden Gartenfreund!
-



Ein lang gehegter Wunsch vieler Blumenfreunde ging in Erfüllung. Die Deutsche Iris- und Lilien-Gesellschaft hat sich im Juni 1973 in die GESELLSCHAFT DER STAUDENFREUNDE erweitert.

Jahresbeitrag 25,— DM - Konten: Postscheckkonto Stuttgart 125371-700, Kreissparkasse Leonberg 101923.

Zeichenerklärung für die Abteilung Iris

D = Domblätter

H = Hängeblätter

Land des Züchters

C = Canada

D = Deutschland

E = Spanien

F = Frankreich

GB = England

I = Italien

NL = Holland

NZ = Neuseeland

Oe = Österreich

USA = Vereinigte Staaten von
Nordamerika

Züchter **G & K** = Goos & Koenemann

BLUTEZEIT-GRUPPEN

I = sehr früh, intermedia

Ende April — Anfang Mai

II = früh, Anfang bis Mitte Mai

III = mittel, Mitte Mai

IV = spät, Ende Mai

V = sehr spät, Ende Mai — An-
fang Juni

In der alphabetischen Liste bezieht sich die erste römische Zahl auf die Blütezeit-Gruppe und die zweite römische Zahl auf die Farbgruppeneinteilung in der zweiten Hälfte des Kataloges.

Inhalt

Allgemeine Staudenliste
von Seite 5 bis Seite 51

Winterharte Gräser
von Seite 53 bis Seite 55

Winterharte Farne
Seite 56

Winterharte Küchen- und Heilkräuter
Seite 57

Hemerocallis-Sortiment (Taglilien)
von Seite 58 bis Seite 62

Hemerocallis (Farbeinteilung)
von Seite 63 bis Seite 64

Hemerocallis-Kollektionen
Seite 65

Iris germanica-Gruppen
von Seite 67 bis Seite 78

Iris Barbata Intermedia- und
Iris Barbata Elatior-Gruppe (Farbeinteilung)
von Seite 79 bis Seite 82

Iris-Kollektionen 1974
Seite 83

Zusammenstellung nach
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten
von Seite 85 bis Seite 88

Deutsche Pflanzennamen
von Seite 89 bis Seite 90

Neuaufnahmen und Neuheiten
von Seite 91 bis Seite 96

Zeichenerklärung

○ = für sonnigen Standort

◐ = für Halbschatten

● = für Schatten

△ = Steingartenpflanze


✂ = Schnittstauden

🏠 = wird mit Topfballen geliefert

B = Blätter

Bl = Blüten

I—XII = Blütezeit in Monaten



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer